

حل اسئلة الاحصاء التحليلي لعام 1434هـ

س 1/ اذا كان متوسط انتاجية العامل في احد المصانع هي 80 وحدة في اليوم: جرب نظاما للحوافز المادية على عينة من 1000 عامل لمدة معينة تبين بعدها ان متوسط انتاجية العامل في العينة اصبح 77 وحدة بانحراف معياري 4 وحدات. اريد اختبار اثر الحوافز المادية على انتاجية العامل. في ضوء هذا الاختبار يكون شكل الفرض الصافي (العدمي) والفرض البديل هو:

ا) الفرض الصافي $\mu = 7$ ، الفرض البديل $\mu \neq 77$

ب) الفرض الصافي $\mu = 77$ ، الفرض البديل $\mu < 77$

ج) الفرض الصافي $\mu = 80$ ، الفرض البديل $\mu > 80$

د) الفرض الصافي $\mu = 80$ ، الفرض البديل $\mu \neq 80$

إذا قالك في السؤال تدني او خساره يعني اقل من

واذا قالك تحسن وتطور يعني اكبر من

تحتم خط في السؤال لو تلاحظ

واذا ما ذكر لك لا تدني ولا تحسن اختر لتساوي

<http://www.ckfu.org/vb/t323192.html#post6298506> (lql3enk) مقتبس

المحاضرة 13 الشريحة 24

اراد باحث أن يعرف اثر استخدام نظم مساندة القرارات التي تتخذها الادارة بمساعدة تلك النظم، فوزع 50 مديراً لمنشآت صناعية عشوائية في مجموعتين، ثم عين أحدهما بطريقة عشوائية لتكون مجموعة تجريبية والآخر ضابطة، وفي نهاية التجربة وزع على المجموعتين استقصاء يقيس درجة فاعلية القرار وكفاءته عندما يتم اتخاذه باستخدام نظم مساندة القرارات بدلاً من الطريقة التقليدية فكانت النتائج كما يلي:

المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية
$25 = n_2$	$25 = n_1$
$6,0 = \bar{X}_2$	$7,6 = \bar{X}_1$
$1,78 = S_2^2$	$2,27 = S_1^2$

س 2/ من خلال الجدول السابق ، هل تدل البيانات على ان اداء المجموعة التجريبية كان افضل من اداء المجموعة الضابطة عند مستوى $a = 0.05$ ؟

ا) المجموعة الضابطة اداوهم افضل في عملية اتخاذ القرار من المجموعة التجريبية

ب) المجموعة التجريبية اداوهم افضل في عملية اتخاذ القرار من المجموعة الضابطة

ج) كلا المجموعتين اداوهم متساوي

د) البيانات المتوفرة ليست كافية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص

الحل:

سيتم اختبار الفرضيات التالية :

الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة ($\mu_1 = \mu_2$).

الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ($\mu_1 > \mu_2$).

مستوى الدلالة: $\alpha = 0.05$.

منطقة الرفض: قيمة مستوى الدلالة $\alpha = 0.05$ والاختبار بذيل واحد ، ودرجات الحرية = $25 + 25 - 2 = 48$ ، بذلك تكون قيمة (ت) الجدولية = 1.68.

المختبر الإحصائي:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

ولتطبيق هذه العلاقة يلزمنا حساب قيمة الانحراف المعياري (S) من خلال العلاقة التالية:

$$S^2 = \frac{[(n_1 - 1)(S_1^2)] + [(n_2 - 1)(S_2^2)]}{(n_1 + n_2) - 2}$$

إذا التباين يساوي:

$$S^2 = \frac{[(25 - 1)(2.27)^2] + [(25 - 1)(1.78)^2]}{(25 + 25) - 2} = 4.16$$

إذن الانحراف المعياري يساوي : $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{4.16} = 2.04$

ثم نحسب قيمة (ت) من خلال تطبيق العلاقة التالية :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{7.60 - 6.0}{2.04 \sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{25}}} = 2.77$$

القرار:

.. قيمة (t) المحسوبة (2.77) أكبر من قيمة (ت) المجدولة (1.68) عند مستوى دلالة $\alpha = 0.05$.

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة أي أن المجموعة التي خضعت للتجربة يصبح أداءهم أفضل في عملية اتخاذ القرار من الذين لم يخضعون للتجربة وذلك عند مستوى دلالة 0.05α .

المحاضرة 2-11 الشريحة 13

س 3/3 تعني: $A = \{a, b, c, d\}$

(أ) أن المجموعة A تتكون من العناصر b و c و d

ب) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و b و c و d

ج) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و c و d

د) أن المجموعة A تتكون من العناصر a و b و c

المحاضرة 1-1 الشريحة 5

س 4/ المجموعات المتساوية هما المجموعات اللتان:

أ) تساویان فی عدد عناصرها أی عدد عناصر A يساوى B

ب) يكون كل عنصر من المجموعة A ينتمي ويتساوى العنصر في المجموعة B والعكس

ج) يكون كل عنصر من المجموعة A ينتمي ولايساوى العنصر في المجموعة B والعكس

د) تكون عناصرها غير محددة

المحاضرة 1-1 الشرحية 15

اذا اجريت دراسة بين عدد من المتغيرات وكانت مخرجات هذه الدراسة بعد تحليل بياناتها من خلال برنامج SPSS كالتالي:

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
الراتب	Equal variances assumed	4.880	.040	.709	18	.488	4.700	6.633	-9.23471 18.63471
	Equal variances not assumed			.709	15.05	.489	4.700	6.633	-9.43323 18.83323

مصدر الجدول: امتحان الجامعة الإسلامية بغزة كلية التجارة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية

س 5/ من خلال البيانات السابقة، فإن القرار النهائي باختبار الفروق بين متغيري عينتين

مستقلتين هو:

الاختبار عينتين مستقلتين: Independent Samples t-test

ا) رفض الفرضية الصفرية

الجدول يحتوى على اختباري التجانس واختبار T

ب) قبول الفرضية البديلة

ج) قبول الفرضية الصفرية

د) عدم القدرة على اتخاذ أي قرار

العمود الأول يحتوى اسم المتغير الراتب

العمود الثاني والثالث يسارا لإجراء اختبار التجانس وحيث أن قيمة

Sig. = 0.040 فهي أقل من 0.05

متتجانسه سوف نهتم بالصف الأول ومن العمود السادس Sig. = 0.488 وهي

أكبر من 0.025 لذا سوف نقبل فرض العدم وهو أن وسطي المجتمعين

متساوي أي لا يوجد فرق بين مستوى الطلاب في المجموعتين.

المحاضرة 1-11 الشرحية 33

س6/يرغب احد مدراء احدى المصانع في تقدير متوسط عدد الدقائق التي يأخذها العمال لانجاز عملية صناعية معينة بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير متوسط الاداء في حدود دقة $\pm 90\%$ ويعلم المدير خبرته الماضية ان الانحراف المعياري هو 65 دقيقة فان حجم العينة الذي يحتاجه المدير لتقدير عدد الدقائق بشكل دقيق مقارباً لأقرب عدد صحيح هو:

الحل:

في هذا المثال نجد أن:

درجة الثقة 90% أي أن: $Z = 1.65$

أقصى خطأ مسموح به هو 3 دقائق، أي أن: $e = 3$

والانحراف المعياري للمجتمع: $\sigma = 15$

(a) 62

(b) 64

(c) 66

(d) 68

وبالت遇وض بهذه القيم في المعادلة التي تحدد حجم العينة وهي:

فإن حجم العينة مقارباً لأقرب عدد صحيح هو:

$$n = \frac{Z^2 \cdot \sigma^2}{(e)^2}$$

$$= \frac{(1.65)^2 (15)^2}{(3)^2}$$

$$= \frac{(2.72)(225)}{9}$$

$$= \frac{612}{9} = 68$$

أي أنه يجب على المدير أن يأخذ عينة لا يقل حجمها عن 68 فرداً حتى يكون لديه تقديرًا دقيقاً لعدد الدقائق التي يأخذها العمال لإنجاز عملية صناعية معينة بحيث لا يتعدى الخطأ في تقديره لمتوسط الإنجاز عن ثلات دقائق، وذلك بدرجة ثقة 90%.

أشهر وأهم درجات ومعاملات الثقة (لتوزيع الطبيعي) في الجدول التالي
(مع ملاحظة أن 95%, 99% هي أشهرها على الإطلاق):

Z هو معامل
الثقة (أو الدرجة)
المعيارية
المقابل لدرجة
الثقة المطلوبة،
ونحصل عليه من
جدول التوزيع
ال الطبيعي المعياري

معامل الثقة Z	درجة الثقة
1	68.26%
1.65	90%
1.96	95 %
2	95.44%
2.58	99%
3	99.72%

المحاضرة 8 الشريحة 42

تعبر عن الحادثة نفسها
بطريقة الصفة المميزة
وهي كتابة مميزات
العناصر بين القوسين {}
عوضاً عن كتابة العناصر

س7/الحادثة $A = \{(x, y) : x + y = 7\}$ تعني:

(a) $A = \{(1,6), (3,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

(b) $A = \{(1,6), (2,5), (4,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

(c) $A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,3), (6,1)\}$

(d) $A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

المحاضرة 1-1 الشريحة 8

س 8/ اذ كان من المعلوم ان عدد الوحدات التي تستهلكها الاسرة من سلعة معينة خلال الشهر تتبع توزيع بواسون بمتوسط 3 وحدات شهرياً واذا عرف المتغير العشوائي X بانه عدد الوحدات التي تستهلكها الاسرة خلال الشهر من هذه السلعة، ما احتمال أن اسرة ما تستهلك 3 وحدات على الاقل خلال الشهر:

حساب الاحتمالات:

احتمال أن اسرة ما تستهلك 3 وحدات على الاقل خلال الشهر هو:

$$P(X \leq 3) = p(3) + p(2) + p(1) + p(0) \quad 0.3474 \quad (a)$$

$$= \left[\frac{3^3}{3!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^1}{1!} + \frac{3^0}{0!} \right] \frac{0.0498}{1} \quad 0.4685 \quad (b)$$

$$= [0.0498] \left[\frac{27}{6} + \frac{9}{2} + \frac{3}{1} + \frac{1}{1} \right] = 0.0498(13) = 0.6474 \quad 0.5447 \quad (c)$$

د) **دانما توزيع بواسون موجب الانحراف** **0.6474**

المحاضرة 4 الشريحة 21

س 9/ افترض ان إدارة المرور بالإحساء وضعت جهازاً للردار على طريق الدمام عند مدخل المدينة وذلك لضبط السيارات المسرعة في فترة معينة من اليوم، افترض ان X تمثل السرعة في الساعة للسيارات التي تمر بمدخل المدينة في فترة عمل الرadar، اذا كانت X تتوزع توزيعاً معتدلاً وسطه الحسابي 60 ميلاً وتباعي 25 ميلاً فان نسبة السيارات التي تزيد سرعتها عن 65 ميلاً في الساعة تساوي:

الحل:

٢- نسبة السيارات التي تزيد سرعتها عن 65 ميلاً في الساعة: **0.0228**

$$P(X < 50) = P\left(\frac{x-\mu}{\sigma} < \frac{50-60}{\sqrt{25}}\right) = P(Z < -2) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \quad 0.1587 \quad (b)$$

0.2898 **(ج)**

0.4998 (د)

المحاضرة 5 الشريحة 40

الحل: نحسب أولأ نسبة المؤيدین للمرشح في العينة \hat{P} التي نحصل عليها بقسمة عدد المؤيدین له على العدد الكلي للعينة (حجم العينة) أي أن: وحيث ان درجة الثقة المطلوبة هي 95% فلن معامل الثقة المناسب هو: $Z = 1.96$ وفترة تقدیر نسبة المؤيدین لهذا المرشح في المدينة تأخذ الشكل التالي:

$$\hat{P} = \frac{60}{144} = 0.42$$

$$P = \hat{P} \pm z \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}} \quad n = 144 \quad Z = 1.96$$

والتقريب عن حجم العينة والنسبة في العينة ومعامل الثقة

$1 - \hat{P} = 1 - 0.42 = 0.58$, $\hat{P} = 0.42$ نحصل بعدها على :

$$P = 0.42 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.42 \times 0.58}{144}}$$

$$= 0.42 \pm (1.96)(0.0411)$$

$$= 0.42 \pm 0.08$$

نسبة المؤيدین للمرشح في المدينة تتراوح بين 0.34 ، 0.50 وذلك بدرجة ثقة 95%



$$\therefore P \begin{cases} 0.34 \\ 0.50 \end{cases}$$

س 10/ عينة عشوائية حجمها 144 ناخبا سحبت من احدى المدن فوجد ان عدد المؤيدین في العينة لمرشح معين هو 60 ناخبا، فان فترة تقدیر نسبة المؤيدین لهذا المرشح في المدينة كلها بدرجة ثقة 95% تساوي:

(ا) **0.60 ± 0.40**

(ب) **0.07 ± 0.41**

(ج) **0.08 ± 0.42**

(د) **0.09 ± 0.43**

الجواب غير موجود ... الجواب الصحيح 0.034 ± 0.50

المحاضرة 9 الشريحة 33

$$A = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT)\}$$

$$B = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT), (THH), (THT), (TTH)\}$$

$$C = \{(THH), (TTH)\}$$

س 11/ قذفت قطعة نقود معدنية ثلاث مرات. فان فراغ هذه العينة Ω يساوي:

$$\Omega = \{(HHH), (THT), (HTH), (HTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\} \quad (ا)$$

$$\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (TTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\} \quad (ب)$$

$$\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT), (THH), (HHT), (TTH), (TTT)\} \quad (ج)$$

$$\Omega = \{(HHH), (HHT), (HTH), (HTT), (THH), (THT), (TTH), (TTT)\} \quad (د)$$

ويمكن من خلال استخدام الرسم الشجري معرفة فراغ العينة للمثال السابق (في تجربة رمي عملة معدنية ثلاثة مرات) كالتالي:



المحاضرة 1-2 الشريحة 19.

س 12/ إذا كانت قيمة معامل الارتباط تساوي 0.90 فان معامل التحديد يساوي:

$$(ا) 0.45$$

$$(ب) 0.81$$

$$(ج) 0.90$$

$$(د) 1.8$$

معامل التحديد يساوي مربع معامل الارتباط

س 13/ X عدد صحيح ، 0 ≤ x ≤ 12 من عناصر هذه المجموعة مايلي:

(اقتباس)الأعداد الصحيحة (Integer): هي الأعداد التي لا تحتوي على كسور وعلى فاصلة مثل: (15.2 أو 4.5 أو 86.8 الخ)، وتعبر عن أعداد مكتملة بحيث لو تم تقسيم العدد الصحيح على واحد، يكون الجواب أيضاً عدداً صحيحاً، فمجموعه الأعداد الصحيحة تكون على النحو التالي: (..... 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ، -2 ، -3).

ويشار إلى مجموعة الأعداد الصحيحة لدى الرياضيين بـ "ص"، وهو الحرف الأول من الكلمة (صحيحة).

أما في الترميز الإنكليزي فيرمز لها بالحرف Z وهو الحرف الأول من الكلمة الألمانية (Zahlen) والتي تعني عدد

طريقة
القاعدة
(الصفة)
(المميزة)

$$(ا) 18.16.14.12.10.8.6.4.2$$

$$(ب) 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1$$

$$(ج) 13.12.11.10.9.8.7.6.5$$

$$(د) 175.15.125.10.75.5.25$$

المحاضرة 1-1 الشريحة 8

س 14/ أي من المجموعات التالية تعبّر عن المجموعات المتكافئة؟:

المجموعات المتكافئات فهما المجموعات اللتان تتتساقيان في عدد عناصرهما وتكتب على الصورة

$$A \equiv B$$

$$A = \{0,1,2\}, B = \{a,b,c\}$$

$$(ا) A = \{1,3,5,7\}, B = \{1,5,7\}$$

$$(ب) A = \{0,1,2\}, B = \{a,b,c\}$$

$$(ج) A = \{0,1,2,3\}, B = \{a,b,c\}$$

$$(د) A = \{5,7\}, B = \{1,5,7\}$$

المحاضرة 1-1 الشريحة 16

س 15/ يستخدم اختبار Bonferroni لإجراء المقارنات المتعددة للأوساط الحسابية في حالة:

(Bonferroni) : يستخدم للمقارنة بين المتوسطات الحسابية في حالة تساوي أو عدم تساوي جموع العينات
 (Scheffe) : يستخدم للمقارنة بين المتوسطات الحسابية في حالة تساوي جموع العينات فقط

أ) تساوي أو عدم تساوي جموم العينات

- ب) كون جموم العينات صغيرة جدا
- ج) تساوي جموم العينات فقط
- د) عدم تساوي جموم العينات فقط

د. سمير خالد صافي

دورة في البرنامج الإحصائي SPSS

حيث أن شرط تجانس تباين مستويات أساليب التدريس متحقق فيمكن اختيار اختبار بونفرونبي (Bonferroni) أو شيفيه (Scheffe) وذلك في حالة تساوي أو عدم تساوي جموم العينات.

المحاضرة 1-12 الشرحة 12

س 16/ لو كانت لدينا عينة عشوائية تتكون من 250 طالب وجد أن الوسط الحسابي لأطوال طلاب العينة 155.95 سم والانحراف المعياري = 2.94 سم علما بأن الوسط الحسابي لأطوال طلاب الجامعة يبلغ 158 سم فأن قيمة المختبر الاحصائي t والمستخدمة لاختبار اهمية الفرق

الحل:
 سيتم اختيار الفرضيات التالية:
الفرضية الصفرية: لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط أطوال الطلاب في العينة ومتوسط أطوال الطلاب في الجامعة
 $\mu = \mu_0$
الفرضية البديلة: توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط أطوال الطلاب في العينة ومتوسط أطوال الطلاب في الجامعة
تساوي:
 مستوى الدلالة: $\alpha = 0.05$

منطقة الرفض: قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دلالة $\alpha = 0.05$ ودرجات حرية 249 = 1.990

11.006

المختبر الاحصائي:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{155.95 - 158}{\frac{2.94}{\sqrt{250}}} = -11.006$$

12.006


13.006

14.006

القرار:
 قيمة ت المحسوبة (-11.006) أكبر من قيمة ت المجدولة (1.99) عند مستوى دلالة $\alpha = 0.05$

المحاضرة 1-11 الشرحة 36

س 17/ يستخدم هذا التوزيع في الحالات التي يكون للظاهرة محل الدراسة نتيجتان فقط ومتنافيتان:



- أ) التوزيع الطبيعي
- ب) توزيع ذو الحدين
- ج) توزيع بواسون
- د) توزيع ت

المحاضرة 4 الشرحة 4

Ranks			
	VAR00003	N	Mean Rank
VAR00001	1.00 2.00 3.00 Total	10 10 10 30	16.90 12.20 17.40

Test Statistics ^{a,b}	
	VAR00001
Chi-Square	2.140
df	2
Asymp. Sig.	.343

- a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: VAR00003

مصدر الجدول: امتحان الجامعة الإسلامية بغزة كلية التجارة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية
س 18/ من خلال البيانات السابقة، نجد ان القرار الاحصائي هو:

يلاحظ من نتائج هذا الاختبار: أن قيمة Sig تساوى 0.343 وهي أكبر من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فأننا نقبل الفرض العدلي لأن الفروق غير معنوية.

(ا) قبول الفرض البديل

ب) قبول الفرض الصافي

ج) رفض الفرض الصافي


د) عدم القدرة على اتخاذ أي قرار

المحاضرة 1-13 الشرحة 28

س 19/ في فترة الثقة 95% فإن قيمة الدرجة المعيارية Z هي:

إذا كانت درجة الثقة 95% فإن مستوى المعنوية يساوي .5%


1.96



انظر للجدول المرفق في السؤال السادس

المحاضرة 8 الشرحة 25


س 20/إذا كانت نسبة مبيعات أحد المراكز التجارية من البان المراعي 0.60 بينما يكون نسبة مبيعةة من الانواع الأخرى للبان 0.40 اشتري أحد العملاء عبوتين، فإذا اعتبر ان المتغير العشوائي للعبوات المشتراء من لين المراعي، لذا تكون القيم الممكنة للمتغير العشوائي هي:



من المعلوم أن العميل اشتري عبوتين، وأن المتغير العشوائي هو عدد العبوات المشتراء من لين المراعي ، لذا تكون القيم الممكنة للمتغير العشوائي هي:
 $x=0$ إذا كانت العبوتين من النوع الآخر، أي إذا كانت نتيجة التجربة (آخر، آخر)
 $x=1$ إذا كان أحد العبوتين من لين المراعي ، أي إذا كانت نتيجة التجربة (آخر، لين المراعي) أو (لين المراعي، آخر)
 $x=2$ إذا كان العبوتين من النوع لين المراعي ، أي إذا كانت نتيجة التجربة (لين المراعي، لين المراعي)
 ومن ثم يأخذ المتغير القيم: $X:\{x=0,1,2\}$


المحاضرة 3 الشريحة 10

س 21/إذا كان متوسط استهلاك الفرد السعودي من الدجاج حسب تقارير وزارة الصحة هو (12) كيلو جرام بانحراف معياري (6) كيلو جرامات لفترة السبعينات الميلادية ، اجرى احد الباحثين دراسة في عام 2003 من عينة قوامها (49) فردا ووجد ان متوسط الاستهلاك لفرد هو (14) كيلوجرام. هل تشير الدراسة الحالية ان متوسط الاستهلاك ارتفع عما عليه في السبعينات:



المحاضرة 11 الشريحة 26

س 22/إذا كان متوسط الدرجات في اختبار الإحصاء 70 درجة بانحراف معياري 10 درجات، وعلى فرض أن الدرجات متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي، اختر أحد الطلبة عشوائياً، ما هو احتمال أن يكون حاصلاً على أكثـر من 80 درجة؟ (استخدم جدول التوزيع الطبيعي) :



http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution


$$1 \approx 0.9998 = 0.0013 + 0.0214 + 0.1359 + 0.3413 + 0.3413 + 0.1359 + 0.0214 + 0.0013$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{80 - 70}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

الوسط الحسابي $70 = \mu$
والانحراف المعياري $10 = \sigma$
المتغير العشوائي $80 = X$
 $1 - p = 1 - 0.5 = 0.5$
 $0.5 - 0.34 = 0.16$

الجواب غير موجود.....والجواب الصحيح 0.16

2- أن يزيد الإيداع النقدي عن 700 د.ك.




$$\begin{aligned} P(X > 700) &= P(Z > 2) \\ &= 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0.9772 \\ &= 0.0228 \end{aligned}$$

إذا ذكر في السؤال أكثـر نطرح

إذا ذكر في السؤال أقل نجمع

1- يقل الإيداع النقدي عن 700 د.ك.



$$\begin{aligned} P(X \leq 700) &= P(Z \leq 2) \\ Z &= \frac{700 - 500}{100} = 2 \\ P(Z \leq Z) &= 0.5 + 0.4772 = 0.9772 \end{aligned}$$

http://www.arab-api.org/course7/c7_4_2_1_e.htm

(استخراج قيم Z)

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633

جدول 1.79 يبيّنها القيمة 0.9633 تحت العود الأول 1.7 العود الأول .09 في الصد الأول وهو قيمة الاحتمال المطلوب

<http://www.jmasi.com/elsha/normald/normaldis.html>

المحاضرة 5 الشريحة 27

س 23/ اذا كان مستوى المعيارية في مشكلة معينة يساوي 0.05 وان حجم العينة يساوي 20 فان

قيمة T الحرجة التي تنتظر اختبار ذو طرفين تساوي م
المنطقة الحرجة هي مجموعة القيم التي إذا وقعت فيها الإحصائية ضمنها أدى ذلك إلى رفض صحة الفرضية ، وتستخرج عادة من الجداول الإحصائية

1.729)

إذا كان الاختبار ذو طرفين فإن قيمة t هي قيمة Q الموجودة في الصد العلوي الثاني من جدول t ، وبالنظر إلى الجدول نجد أن القيمة الحرجة $L_t = 2.093$ وهي القيمة الموجودة أمام الصد 19 وتحت العود 0.05 في صد Q العلوي الثاني، وبين الجدول التالي جزء مستقطع من جدول t :

2.093)

2.539)

2.845)

df	cum. prob.	$t_{.10}$	$t_{.05}$	$t_{.025}$
1	0.000	1.000	1.379	1.983
2	0.050	1.325	1.671	2.306
3	0.000	0.765	0.978	1.638
4	0.000	0.741	0.941	1.533
5	0.000	0.727	0.906	1.476
6	0.000	0.718	0.896	1.440
7	0.000	0.711	0.895	1.415
8	0.000	0.705	0.890	1.397
9	0.000	0.703	0.883	1.383
10	0.000	0.700	0.879	1.372
11	0.000	0.695	0.875	1.368
12	0.000	0.690	0.873	1.363
13	0.000	0.684	0.870	1.359
14	0.000	0.679	0.868	1.354
15	0.000	0.671	0.866	1.341
16	0.000	0.669	0.865	1.337
17	0.000	0.667	0.863	1.330
18	0.000	0.668	0.862	1.330
19	0.000	0.668	0.861	1.328
20	0.000	0.667	0.860	1.325

المحاضرة 11 الشريحة 12

التعبير بالكلمات عن الحوادث		الحادية
$G=\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$		الحادية G
تعني الحصول على نفس العدد في الرمية الأولى والرمية الثانية		
$H=\{(1,1), (2,1), (1,2), (3,1), (2,2), (1,3)\}$		الحادية H
تعني الحصول على مجموع رميتين أقل من (٥)		
$I=\{(5,1), (1,5), (6,2), (2,6)\}$		الحادية I
تعني الحصول على فرق بين الرميتين يساوي (٤)		
$J=\{(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4)\}$		الحادية J
تعني الحصول على (٤) في الرمية الثانية		
$K=\{(2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6)\}$		الحادية K
تعني الحصول على عدد زوجي في كل الرميتين		

س 24/ الحادية التالية (H) والمماثلة بالمجموعة
الجنبية من نقاط العينة

$H=\{(1,1), (2,1), (3,1), (2,2), (1,3)\}$
 تعني بالكلمات ما يلي :

ا) الحصول على عدد زوجي في كل الرميتين

ب) الحصول على نفس العدد في الرمية الاولى والرمية الثانية

ج) الحصول على مجموع رميتين أقل من (5)

د) الحصول على فرق بين الرميتين يساوي (4)

المحاضرة 1-2 الشريحة 34

س 25/ اختبار one sample t test من ضمن الاختبارات المعلمية واحد استخداماته لمعرفة وسط مجتمع يساوي قيمة ثابتة أم لا ، اما الاختبار البديل في الاختبارات الغير معلمية هو:

(ا) اختبار t للعينات المستقلة Independent sample T test

الاختبارات الاحصائية اللامعنية:

١. اختبار مان ونتي (بالفرق بين متوسطي مجتمعين)
٢. اختبار ويلكوكسون (فرق بين عينتين مرتبتين)
٣. اختبار كروسكال واليس (تحليل التباين في اتجاه واحد)

ب) اختبار الاشارة Sign Test

ج) مان ونتي Mann Whitney

د) كروسكال والز Kruskal Wallis

المحاضرة 13 الشرحة 22

س 26/ التجربة العشوائية Random Experiment

ا) التجربة التي تكون جميع نتائجها معلومة مسبقا ولا يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة

ب) التجربة التي تكون جميع نتائجها غير معلومة مسبقا ولا يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة

ج) التجربة التي تكون جميع نتائجها معلومة مسبقا و يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة

د) التجربة التي تكون جميع نتائجها غير معلومة مسبقا و يمكن التنبؤ بحدوث أي من هذه النتائج بصفة مؤكدة

المحاضرة 2-1 الشرحة 5

س 27/ يتكون مجلس ادارة احدى الشركات من 5 محاسبين ، 7 مهندسين ، 3 اقتصاديين .
اختر احدهم بطريقة عشوائية ، ما هو احتمال ان يكون من تم اختيارهم محاسب او اقتصادي؟:

Classical Probability Definition التعريف التقليدي للاحتمالات

$$P(A) = \frac{N_A}{N_\Omega}$$

$$P(A) = \frac{\text{عدد المحاسبين والاقتصاديين}}{\text{عدد مجلس الإدارة الكلي}} = \frac{8}{15} = 0.533$$

ا) 0.533

ب) 0.466

ج) 0.333

د) 0.200

المحاضرة 2-2 الشرحة 14

اذا اجريت دراسة لحساب العلاقة بين عدد المتغيرات وكانت مخرجات هذه الدراسة بعد تحليل بياناتها من خلال برنامج SPSS كالتالي:

حساب معامل ارتباط بيرسون
من خلال برنامج SPSS

Correlations

	الطول	الوزن	العمر
الطول	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.850** .002 10	-.003 .993 10
الوزن	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.850** .002 10	.066 .856 10
العمر	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.003 .993 10	.066 .856 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level

مصدر الجدول: امتحان الجامعة الإسلامية بغزة كلية التجارة قسم الاقتصاد والعلوم السياسية س 28/ من خلال البيانات السابقة ، قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين (الطول والعمر):

- معامل الارتباط: المقياس الإحصائي الذي يدل على مقدار العلاقة بين المتغيرات سلبية كانت أم إيجابية، وتتراوح قيمته بين الارتباط الموجب التام (+1) وبين الارتباط السالب التام (-1).
- (+) +0.993
(-) -0.066

Correlations			
	ساعة عمل	ساعة عمل	إنماطة
ساعة عمل	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .000 10	.910* 10 10
إنماطة	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.910** .000 10	1 10 10

**) Correlation is significant at the 0.01 level.

(ج) +0.002

(د) -0.003

المحاضرة 2-12 الشريحة 63

س 29/ باستخدام توزيع ذي الحدين فان احتمال الحصول على 4 صور في 6 رميات لعملة متوازنة كالاتى:

$$P(4) = \frac{6!}{4!(6-4)!} (1/2)^4 (1/2)^2 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} (1/16)(1/4) = 15(1/64) = \frac{15}{64} \approx 0.23 \quad (0.194)$$

(ب) 0.214

ان عدد الصور المتوقع في ست رميات هو: $\mu = np = (6)(1/2) = 3$

(ج) 0.234

(د) 0.254


المحاضرة 4 الشريحة 13

س 30/ من خلال جدول التوزيع الطبيعي، احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من 2 هو:

حيث أن احتمال أن تكون Z أقل من صفر = 0.5000 ومن الجدول احتمال Z في (2,0) = 0.47725 اذن احتمال أن تكون قيمة Z أكبر من 2 هي :

$$0.02275 = 0.47725 - 0.5000 \quad \text{ج}$$

0.02275



0.02365

0.02285

المحاضرة 5 الشريحة 23

إذا كان لدينا ثلاثة منتجات لإحدى الشركات الصناعية ، وتم تقييمها من قبل مجموعة من المستهلكين وحصلنا على النتائج التالية:

المنتج (3) X ₃	المنتج (2) X ₂	المنتج (1) X ₁
2	4	7
2	6	10
3	7	10
7	9	11
6	9	12
20	35	50

ولكون لدينا ثلاثة متغيرات فترية، ولرغبة الشركة معرفة الفروق بين هذه المتغيرات موضع الدراسة، فإن انساب اسلوب احصائي هنا هو تحليل التباين الاحادي One Way ANOVA

س 31/ من خلال البيانات السابقة، قيمة (مجموع المربعات بين المجموعات Between Sum) تساوي:

المنتج (3) X ₃	المنتج (2) X ₂	المنتج (1) X ₁	
٢	٤	٧	20 ()
٢	٦	١٠	
٣	٧	١٠	50 ()
٧	٩	١١	
٦	٩	١٢	
٢٠	٣٥	٥٠	85 (ج)

حيث **K** تعني عدد الأفراد أو الاستجابات في المجموعة g موضع الدراسة، و **K** تعني عدد المجموعات

90 (ج)

$$\text{Between..SS} = \sum \frac{(\sum X_g)^2}{n_g} - \frac{(\sum X)^2}{(n_g)(k)} = \frac{(50)^2}{5} + \frac{(35)^2}{5} + \frac{(20)^2}{5} = \frac{(105)^2}{15} = 90$$

المحاضرة 1-12 الشريحة 39

س 32/الاساليب الاحصائية التي تستوجب توافر بعض الافتراضات حول التوزيع الاحتمالي
لتوزيع البيانات تسمى:::

الاختبارات الإحصائية قد تدور حول معالم المجتمع المجهولة
مثل الفروض المتعلقة بالوسط الحسابي، النسبة، التباين،
معامل الارتباط،... وفي هذه الحالة يطلق على هذه الاختبارات
اسم الاختبارات المعلميمية Parametric Tests

(ا) الاساليب الاحصائية المعلميمية

ب) الاساليب الاحصائية اللامعلميمية

ج) الاساليب الكمية

د) الاساليب النوعية

المحاضرة 10 الشريحة 10

س 33/ يعرف مستوى المعنوية α على النحو التالي :

مستوى المعنوية Level of Significance (الفأ:

هذه القيمة يمكن القول بأنها تمثل احتمال الواقع في خطأ في الاختبار يسمى الخطأ من النوع الأول وهو رفض فرض العدم H_0 مع أنه صحيح

(ا) رفض الفرض العدمي وهو صحيح ويجب قبوله

ب) قبول الفرض البديل وهو خاطئ ويجب رفضه

ج) رفض الفرض البديل وهو صحيح ويجب قبوله

د) قبول الفرض البديل وهو خاطئ ويجب رفضه

المحاضرة 14 الشريحة 44

س 34/ اختبار العينات المستقلة Mann Whitney – Two Independent Samples Test يستخدم


(ا) لاختبار فرضية تتعلق بالفرق بين متواسطين للعينات المستقلة في حالة الاختبارات المعلميمية

ب) لاختبار فرضية تتعلق بالفرق بين اكثر من متواسطين للعينات المستقلة في حالة الاختبارات المعلميمية

ج) لاختبار فرضية تتعلق بالفرق بين متواسطين للعينات المستقلة في حالة الاختبارات اللامعلميمية

د) لاختبار فرضية تتعلق بالفرق بين اكثر من متواسطين للعينات المستقلة في حالة الاختبارات اللامعلميمية

المحاضرة 14 الشريحة 22



(وتنراوح قيمته بين الارتباط الموجب التام (+) وبين الارتباط السالب التام (-) .

س 35/ عندما يكون معامل الارتباط = **1.016** فان العلاقة تفسر:

(ا) علاقة عكسية قوية

ب) علاقة طردية ضعيفة

ج) لا توجد علاقة على الاطلاق

د) قيمة غير صحيحة لمعامل الارتباط

المحاضرة 12-2 الشريحة 4

س36/إذا كانت لدينا البيانات التالية
 $U=\{1,2,3,4,5,w,x,y,z\}$ و كانت المجموعة الكلية $A=\{1,2,3,x,y\}$
 $B=\{3,4,5,x,w\}$ من خلال البيانات السابقة فان قيمة $(A \cup B)$ تساوي:

(ا) $(A \cup B) = \{1,2,3,4,5, x, y, w, z\}$

(ب) $(A \cup B) = \{1,2,3,4,5\}$

(ج) $(A \cup B) = \{1,2,3,4,5, x, y, w\}$

(د) $(A \cup B) = \{3,4,5, x, y, w\}$

* الاتحاد

الاتحاد المجموعتين A ، B ($A \cup B$) هو مجموعة كل العناصر الموجودة في A أو في B أو في كليهما

المحاضرة 1-1 الشريحة 22

س37/من خلال البيانات السابقة فان قيمة $A \cap B$ تساوي:::

(ا) $A \cap B = \{3, x\}$

(ب) $A \cap B = \{4, x\}$

(ج) $A \cap B = \{3, y\}$

(د) $A \cap B = \{4, w\}$


* التقاطع

تقاطع المجموعتين A ، B ($A \cap B$) هو مجموعة كل العناصر الموجودة في A و في B معاً. أي العناصر المشتركة بين A و B

المحاضرة 1-1 الشريحة 22

س38/نفترض انه عندما تكون الاشارة خضراء نرمز لها بالرمز G وعندما تكون حمراء نرمز لها بالرمز R ، فإذا كان في طريقك الى الجامعة توجد اشارات المرور، فيكون وبالتالي فضاء العينة لتجربة ذهابك الى الجامعة كالتالي:

الرسم الشجري



(ا) $\Omega = \{GR, GR, RG, RR\}$

(ب) $\Omega = \{GG, RR, RG, RR\}$

(ج) $\Omega = \{GG, GR, RG, RR\}$

(د) $\Omega = \{GG, GR, GG, RR\}$

المحاضرة 2-1 الشريحة 24

س 39/ اذا رغبت احدى الشركات ان تعرف بدرجة ثقة 95% ما اذا كان يمكنها الادعاء بأن صناديق الصابون المسحوق الذي تتبعها تحتوي على اكثرب من 500 جرام. وتعرف الشركة من الخبرة الماضية أن أوزان الصابون بالصناديق تتبع التوزيع الطبيعي. وقد أخذت الشركة عينة عشوائية حجمها $n = 25$ ووجدت أن $X = 520$ جرام و $s = 75$ جرام. فان قيمة الاحصائية المناسبة للتحقق من هذه الدعوة 500 > متساوي:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} = \frac{520 - 500}{75 / \sqrt{25}} = \frac{20}{15} = 1.33$$

1.26(ا)
ب) 1.28
ج) 1.30

1.33 (د)

المحاضرة 10 الشريحة 72

س 40/ رمى حجر نرد مرد واحدة، فان احتمال الحصول على رقم $P(A>2)$ يساوي:

فراغ العينة لهذه التجربة هو : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ احتمال الحصول على رقم أكبر من 2

1/6 (ا)

الاحتمالات ::::Events:::الأحداث

الحدث البسيط: Simple event () وهو الحدث المكون من عنصر واحد مثل { 1 } في تجربة إلقاء حجر النرد.

3/6 (ب)

الحدث المركب: Compound event () الحدث المكون من أكثر من عنصر واحد مثل { 2, 4, 6 } حدث العدد زوجي في تجربة إلقاء حجر النرد.

4/6 (ج)

$$P(A) = \frac{\text{عدد الحالات المواتية}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

6/6 (د)

<http://www.jmasi.com/ehsa/prob/prob.htm>

المحاضرة 2-1 الشريحة 11

س 41/ اختبار احصائي يستخدم لقياس مدى الفارق والتباين بين اكثرب من متواسطين:

T Tests

اختبار ت لعينة واحدة One-Sample T Test معرفة ماذا كان متوسط متغير ما يختلف عن متوسط ثابت معين (متوقع أو مفترض)?

(ا) اختبار t

اختبار للعينات المستقلة Independent-Samples T Test يقارن هذا الاختبار متوسطي مجموعتين من أجل هذا تقسم المجموعات إلى مجموعتين عشوائيتين، وأي فرق بينهما يرجع للتغيير التجاريبي

(ب) اختبار Jama

اختبار للعينات الزوجية Paired-Samples T Test قارن بين متوسطي "متغيرين" في مجموعة واحدة

(ج) اختبار ANOVA


(د) تحليل الانحدار

الانحدار Regression دراسة العلاقة بين متغير تابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة

<http://uqu.edu.sa/page/ar/77113>

المحاضرة 12-1 الشريحة 12

س 42/ عند رمي عملة متوازنة مرتين فإن النواتج الممكنة هي TT, TH, HT, HH واذن قيمة



$$P(1H)$$

$$P(1H) = \frac{1}{4} \quad (ا)$$

$$P(1H) = \frac{1}{2} \quad (ب)$$

$$P(1H) = \frac{1}{3} \quad (ج)$$

$$P(1H) = \frac{2}{3} \quad (د)$$

المحاضرة 4 الشريحة 10

س 43/ اراد باحث دراسة ملكية السيارات في مدينة ما، واختار (2%) أقصى خطأ مسموح به، وثقة احصائية قدرها (95%) فان حجم العينة التي تحتاجها لضمان الدقة المرجوة في تمثيل:

ويتوقع أن يمتلك نصف السكان وواسط نقل خاصة

^{^ ^}
الدكتور لم يذكرها في السؤال

24 (ا)

$$S^2 = \sqrt{(P(100 - P))} \quad (ب)$$

$$S^2 = \sqrt{(50(100 - 50))} = 50$$

$$n = \left[\frac{(Z)(S^2)}{e} \right]^2 \quad (ج)$$

$$n = \left[\frac{(1.96)(50)}{.02} \right]^2 = 24.01 \quad (د)$$

بحاجة إلى حينة بحجم ϵ لضمان الدقة المرجوة في تمثيل خصائص المجتمع

Z = هو معامل الثقة 1.96 (درجة الثقة 95%)

e = هو أقصى خطأ مسموح به

S = قيمة التباين

P = النسبة المئوية للخاصية موضوع الدراسة

المحاضرة 7 الشريحة 30

س 44/ قام أحد الباحثين في مجال الزراعة بدراسة مائة مزرعة، فوجد أن متوسط مساحة المزرعة الواحدة (53) هكتارا، وبانحراف معياري عن المتوسط بقيمة (26) هكتارا من هذه البيانات فإن حدود الثقة في تقدير متوسط مساحة المزرعة في منطقة الدراسة وبثقة احصائية مقدارها %95 تساوي:

$$\hat{\mu} = \bar{X} \pm Z\sigma_x \quad (ا)$$

$$= 53 \pm (1.96) \frac{26}{\sqrt{100}} \quad (ب)$$

$$= 53 \pm 5.1 \quad (ج)$$

$$= 53 \pm 6.7 \quad (د)$$

المحاضرة 7 الشريحة 24

س 45/ اذا كان احتمال نجاح احمد في المحاسبة هو 0.8 و احتمال نجاح خالد في المحاسبة هو 0.6 فان احتمال نجاح احمد و خالد معا في المحاسبة يساوي:

الحدثان المستقلان (Independent events): اللذان لا يتاثر أي منهما بالآخر (وقد أحدهم لا يؤثر أو يتاثر بوقوع أو عدم وقوع الآخر). <u>قاعدة الضرب للاحتمالات للإحداث المستقلة</u> $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	١) 0.20 ب) <u>0.48</u> ج) 1.33 د) 1.4
<u>اما الاحتمالات المشروطة : بنقسم للأسف لم اجد في المحاضرة سوى مثال مختلف</u>	

<http://www.jmasi.com/ehsa/prob/prob.htm>

المحاضرة 2-2 الشريحة 31

س 46/ عينة عشوائية حجمها 49 شخصا اختيرت من افراد دولة ما، فاذا كان الوسط الحسابي لدخول الافراد الاسبوعية في العينة هو 75 دولارا مقابل الفرض البديل أنه لا يساوي 72 وذلك بمستوى معنوية 5% اذا علمت ان الانحراف المعياري لدخول الافراد يساوي 14 دولارا، قيمة الاحصائية في هذه الدراسة تساوي:

$Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ $Z_{\bar{X}} = \frac{75 - 72}{14 / \sqrt{49}}$ $Z_{\bar{X}} = \frac{3}{4} = \frac{3}{2} = 1.5$	١) 1.3 ب) <u>1.5</u> ج) 1.7 د) 1.9
--	---

المحاضرة 10 الشريحة 58

س 47/ في جامعة الملك فيصل اختيرت عينة من 200 طالب، كان عدد المنتسبين بها 50 طالب، قدر نسبة الطلاب المنتسبين في الجامعة بدرجة ثقة 95% فان نسبة المنتسبين في الجامعة

الحل: نحسب أولًا نسبة المنتسبين في الجامعة من العينة \hat{P} التي تحصل عليها بقسمة عدد الطلاب المنتسبين على العدد الكلي للعينة (حجم العينة) أي أن :

$$\hat{P} = \frac{50}{200} = 0.25$$

وحيث أن درجة الثقة المطلوبة هي 95% فإن معامل الثقة المناسب هو: $Z = 1.96$ وفتره تقدير نسبة الطلاب

المنتسبين في الجامعة تأخذ الشكل التالي :

$$n = 200 \quad \hat{P} = 0.25 \quad Z = 1.96$$

وبالتعميض عن حجم العينة والنسبة في العينة ومعامل الثقة

$$1 - \hat{P} = 1 - 0.25 = 0.75$$

$$P = 0.25 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{200}}$$

$$= 0.25 \pm (1.96)(0.0306)$$

$$= 0.25 \pm 0.06$$

$$\therefore P = \begin{cases} 0.31 \\ 0.19 \end{cases}$$

١) 0.29 ، 0.37

ب) 0.19 ، 0.31

ج) 0.17 ، 0.27

د) 0.18 ، 0.21

المحاضرة 9 الشريحة 32

س 48/ القيمة الحرجة (نقطة القطع العليا) للمتغير العشوائي t عندما تكون درجات الحرية 20 ومستوى الدلالة 0.95 تساوي:

$$t_a = -t_{1-a}$$

$$t_{(20,0.95)} = -t_{(20,0.05)} = 1.725$$

0.860

t Table

cum. prob	$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10
df						
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725

المحاضرة 5 الشريحة 53

س 49/ اذا كان متوسط انتاجية العامل في احد المصانع هي 30 وحدة في اليوم. جرب نظاماً للحوافز المادية على عينة من 100 عامل لمدة معينة، تبين بعدها ان متوسط انتاجية العامل في العينة اصبح 38 بانحراف معياري 4 وحدات، وفق هذه البيانات تكون القيمة المحسوبة لـ Z هي:

بافتراض أن المجتمع الإحصائي المسحوب منه العينة هو مجتمع طبيعي وانحراف المعياري معروف،
(أو) أن العينة كبيرة بدرجة كافية فإن احصائية الاختبار والتي نرمز لها بالرمز $Z_{\bar{x}}$

10

$$Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

الاحصائية في حالة اختبار الوسط للعينات الكبيرة:

20

$$n = 100$$

$$\sigma = 4$$

40

$$\bar{X} = 38$$

$$\mu = 30$$

$$Z_{\bar{x}} = \frac{38 - 30}{4} = \frac{8}{4} = 2.0$$

0.4 ← 10

بالذين

المحاضرة 10 الشريحة 60

س 50/ يتناسب حجم العينة مع تباين المفردات في المجتمع (σ^2) تناسبياً:

(مقتبس) تقسم القيم في معظم المجتمعات بالتباعد أو التشتت، ويقاس التباين أو التشتت كمياً بعدة مقاييس أشهرها الانحراف المعياري ، لكن عندما يستخدم المراجع المعاينة الحكمية فإنه يقيس التباين أو التشتت على أساس حكمي مثل كبير ، متوسط ، صغير ، ويعتمد المراجع في ذلك على خبرته الشخصية ومعرفته بالمجتمع المختص أو يسحب عينة مبنية من المجتمع ويقوم بفحصها ومن واقع نتائج الفحص يستطيع تغيير تباين المجتمع. وبصفة عامة توجد علاقة طردية بين تباين المجتمع وحجم العينة. ولذلك فقد يلجأ المراجع إلى تقسيم المجتمع إلى مجموعات متباينة وتحدد عينة لكل مجموعة بغرض تقليل حجم العينة

ا) طرديا

ب) عكسيًا

ج) فترية

د) نوعيا

المحاضرة 11-2 الشريحة 7

وإذا أردنا اختيار عينة حجمها (ن) من هذا المجتمع فإننا نختار من كل طبقة عدداً من المفردات يتاسب طردياً مع حجم هذه الطبقة ثم نقوم بعد ذلك بسحب مفردات العينة المخصصة لكل طبقة من الطبقة المناظرة لها بطريقة عشوائية باستخدام جدول الأرقام العشوائية .

انتهت الأسئلة والله الحمد بعد كتابتها واخذ جهد ووقت طويلا
دعواتكم لي ولأولادي بالهداية
أخوكم



نقطة: أولاً نسبة المترشحين في الجامعة من العينة \hat{P} التي تحصل عليها بقسمة عدد الطلاب المترشحين على العدد الكلي للعينة (حجم العينة) أي أن:

$$\hat{P} = \frac{50}{200} = 0.25$$

وحيث أن درجة النسبة المطلوبة هي 99% فإن معامل النسبة المناسب هو: $Z = 1.96$ وفترة تدبر نسبة الطلاب المترشحين في الجامعة تأخذ التشكيل التالي:

$$P = \hat{P} \pm z \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}}$$

$$1 - \hat{P} = 1 - 0.25 = 0.75 \quad \hat{P} = 0.25$$

$$n = 200$$

$$Z = 1.96$$

$$P = 0.25 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{200}}$$

$$= 0.25 \pm 1.96(0.0306)$$

$$= 0.25 \pm 0.08$$

$$= 0.42 \pm 0.08$$

وبالتالي يحصل على حجم العينة والنسبة في العينة ومعامل النسبة

Equation Editor - Equation in 9 [Compatibility Mode]

$$\sqrt{200}$$

$$= 0.25 \pm (1.96)(0.0306)$$

$$= 0.42 \pm 0.08$$