

أجب على الأسئلة التالية من خلال اختيار أفضل وأصح إجابة من الإجابات المتاحة

إذا كانت أسعار الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في مساعدة ذوي الإعاقة السمعية والمنتجة بواسطة أحد المصنعين توزع طبيعياً، ويدعي صاحب المصنع أن متوسط أسعار هذه الأجهزة الإلكترونية هو 36 شهراً. ولاختبار صحة هذا الادعاء اختبرت عينة عشوائية حجمها عشر أجهزة إلكترونية وقيست أسعارها بالشهور فكان متوسط أسعارها هو 30.33 شهراً بتحرارة معياري 4.01 شهراً. فهل تدل هذه البيانات على أن متوسط أسعار هذه الأجهزة الإلكترونية أقل من 36 شهراً (استخدم مستوى معنوية $\alpha = 0.01$) ؟

(1) من خلال البيانات السابقة، درجات الحرية لبيانات الدراسة السابقة هي:

- (أ) 9
(ب) 10
(ج) 30
(د) 36

(2) من خلال الدراسة السابقة، هذا الاختبار احصائي للتحقق من فرض الدراسة السابق هو:

- (أ) اختبار "ت" لعينة واحدة
(ب) اختبار "ت" لعينتين مستقلتين
(ج) اختبار "ت" لعينتين مترابطتين
(د) اختبار "ت" لأكثر من عينتين

(3) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المجدولة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 1.96-
(ب) 2.76-
(ج) 2.528-
(د) 2.821-

(4) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المحسوبة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 3.58-
(ب) 4.46-
(ج) 4.79-
(د) 5.24-

(5) من خلال البيانات السابقة، نجد أن القرار الإحصائي الذي سيتم التوصل إليه هو:

- (أ) قبول الفرض الصفري
(ب) قبول الفرض البديل
(ج) رفض الفرض الصفري
(د) عدم القدرة على اتخاذ قرار

(6) عندما يكون معامل الارتباط = - 1.16 فإن العلاقة تفسر:

- (أ) علاقة عكسية قوية
(ب) علاقة طردية ضعيفة
(ج) لا توجد علاقة على الإطلاق
(د) قيمة غير صحيحة لمعامل الارتباط

(7) حوادث السيارات على الطرق السريعة، هي ظاهرة خاضعة لتوزيع:

- (أ) توزيع ذو الحدين
(ب) توزيع طبيعي
(ج) توزيع بواسون
(د) توزيع ستودنت

(8) إذا كان: $P(xy) = P(x)P\left(\frac{y}{x}\right)$ ، فإن x ، y تسمى حوادث :

- (أ) غير مستقلة
(ب) مستقلة
(ج) متحدة
(د) متقاطعة

(9) إذا كان كل من المتغيرين من المستوى الرتبى فالأسلوب المناسب لدراسة الارتباط بين المتغيرين :

- (أ) اختبار بيرسون
(ب) اختبار سبيرمان
(ج) اختبار Z
(د) اختبار t

(10) يعرف مستوى المعنوية α على النحو التالي:

- (أ) قبول الفرض البديل وهو خاطئ ويجب رفضه
(ب) قبول الفرض العدمي وهو خاطئ ويجب رفضه
(ج) رفض الفرض العدمي وهو صحيح ويجب قبوله
(د) رفض الفرض البديل وهو صحيح ويجب قبوله

(11) عندلقاء قطعة عملة سليمة 5 مرات، فإن فراغ العينة يساوي :

- (أ) 10 حالات
(ب) 15 حالة
(ج) 20 حالة
(د) 32 حالة

(12) إذا كان احتمال نجاح احمد في المحاسبة هو 8 . . واحتمال نجاح خالد في المحاسبة هو 6 . . فما هو

احتمال نجاح احمد وخالد معا في المحاسبة ؟ (x : احمد ، y : خالد)

- (أ) $20 = (.6) - (.8) = P(y) - P(x) = P(xy)$
(ب) $.48 = (.6) \times (.8) = P(y) \times P(x) = P(xy)$
(ج) $1.4 = (.6) + (.8) = P(y) + P(x) = P(xy)$
(د) $1.33 = (.6) \div (.8) = P(y) \div P(x) = P(xy)$

(13) بصفة عامة، إذا كانت القيمة المعسوبة للمختبر الإحصائي أكبر من القيمة الجدولية، فهذا يعني:

- (أ) قبول الفرض العدمي
(ب) رفض الفرض العدمي
(ج) رفض الفرض البديل
(د) رفض الدراسة بأكملها

(14) الحوادث المتنافية هي تلك الحوادث التي:

- (أ) مجموعة النتائج التي تحقق الحدث
(ب) يمكن أن تقع معا في وقت واحد
(ج) لا يمكن أن تقع معا في وقت واحد
(د) تحتوي على جميع النتائج الممكنة للتجربة

(15) صندوق يدخله 20 ورقة متعائلة في الشكل واللون مرقمة من 1 إلى 20 اختيرت من الصندوق ورقة

واحدة عشوائيا، ما هو احتمال أن يكون عليها رقم زوجي؟

- (أ) $20 - 20 =$ ح (رقم زوجي)
(ب) $10 - 2 =$ ح (رقم زوجي)
(ج) $20 - 1 =$ ح (رقم زوجي)
(د) $20 - 10 =$ ح (رقم زوجي)

(16) يتناسب حجم العينة مع تباين المفردات في المجتمع (σ^2) تناسباً:

(أ) تقريباً

(ب) عكسياً

(ج) طردياً

(د) نوعياً

(17) إذا كانت $\mu = 100$ ، $\sigma = 10$ ، فإن القيمة المعيارية Z المقابلة للقيمة الأصلية $X = 80$ هي :

(أ) $1 - Z$

(ب) $1.5 - Z$

(ج) $2 - Z$

(د) $2 + Z$

(18) إذا كان متوسط الدرجات في اختبار الإحصاء 70 درجة بارتفاع معياري 10 درجات، وعلى فرض أن

الدرجات متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي، اختير أحد الطلبة عشوائياً، ما هو احتمال أن يكون

حاصلاً على أكثر من 80 درجة؟ (استخدم جدول التوزيع الطبيعي).

(أ) $0.46 = P(80 > X)$

(ب) $0.48 = P(80 > X)$

(ج) $0.64 = P(80 > X)$

(د) $0.84 = P(80 > X)$

مالقبت الحل على كلمة أكثر وخليتها أقل وطلعت ٠.٨٤.

(19) عند إلغاء قطعة نرد سليمة مرة واحدة، فإن فراغ العينة يساوي :

(أ) حالة واحدة

(ب) 6 حالات

(ج) 12 حالة

(د) 24 حالة

(20) إذا كان x ، y حدثان غير متنافيان، فإن: $P(x + y) =$

(أ) $P(x) + P(y) - P(xy)$ (الإجابة الصحيحة)

(ب) $P(x) + P(y) + P(xy)$

(ج) $P(x) + P(y) - P(x)$

(د) $P(x) + P(y) - P(y)$

(21) صندوق بداخله 20 ورقة متماثلة في الشكل واللون مرقمة من 1 إلى 20، اختيرت من الصندوق ورقة واحدة،

هو احتمال أن يكون عليها رقم يقبل القسمة على 3؟

(أ) $3 = \frac{20}{3}$ (رقم يقبل القسمة على 3)

(ب) $6 = \frac{20}{3}$ (رقم يقبل القسمة على 3)

(ج) $1 = \frac{20}{3}$ (رقم يقبل القسمة على 3)

(د) $9 = \frac{20}{3}$ (رقم يقبل القسمة على 3)

(22) في فترة الثقة 95% ، فإن قيمة الدرجة المعيارية Z هي :

(أ) 1,65

(ب) 1,96

(ج) 2,58

(د) 2,96

(23) في إحدى الشركات، سحبت عينة من 100 موظف، وكان متوسط العمر = 32 سنة بارتفاع معياري 5 سنة

عمر الموظف في هذه الشركة بدرجة ثقة 95%.

(أ) متوسط عمر الموظف في الشركة μ يقع بين : 30,02 ، 32,98 سنة

(ب) متوسط عمر الموظف في الشركة μ يقع بين : 30,02 ، 33,98 سنة

(ج) متوسط عمر الموظف في الشركة μ يقع بين : 31,02 ، 33,98 سنة

(د) متوسط عمر الموظف في الشركة μ يقع بين : 31,02 ، 32,98 سنة

ابتكرت طريقة حديثة لتدريس مادة مدخل الإحصاء هذه الطريقة تتضمن استخدام وسائل سمعية و بصرية لشرح المفاهيم المستخدمة في مدخل علم الإحصاء، تم اختبار 10 طلاب لهذه التجربة و أجري اختبار قبل إجراء التجربة و رصدت الدرجات، ثم أجري الاختبار لهم بعد إجراء التجربة و رصدت درجاتها فكانت كالآتي :

| الطلاب | الدرجة (x) قبل التجربة | الدرجة (y) بعد التجربة |
|--------|------------------------|------------------------|
| 1 | 68 | 72 |
| 2 | 69 | 71 |
| 3 | 73 | 74 |
| 4 | 81 | 85 |
| 5 | 76 | 79 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 84 | 86 |
| 8 | 55 | 60 |
| 9 | 63 | 64 |
| 10 | 75 | 80 |

هل يمكن أن نقرر أن درجات الطلاب تحسنت بفضل استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تدريس المادة؟ بافتراض درجات الطلاب قبل وبعد إجراء التجربة تتبع توزيعاً طبيعياً ($\alpha = 0.01$)

(24) من خلال الدراسة السابقة، أفضل اختبار احصائي للتحقق من فرض الدراسة السابق هو:

- (أ) اختبار "ت" لعينة واحدة
 (ب) اختبار "ت" لعينتين مستقلتين
 (ج) اختبار "ت" لعينتين مترابعتين
 (د) اختبار "ت" لأكثر من عينتين

(25) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المجدولة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 2.236-
 (ب) 2.345-
 (ج) 2.567-
 (د) 2.821-

(26) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المحسوبة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 4.2-
 (ب) 5.9-
 (ج) 6.5-
 (د) 7.1-

(27) يتناسب حجم العينة مع تباين المفردات في المجتمع (σ^2) تناسباً:

- (أ) عكسياً
 (ب) طردياً
 (ج) عكسياً
 (د) نوعياً

(28) اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى الفارق بين متوسطين لعينتين توزيعهما الإحصائي غير طبيعي:

- (أ) اختبار t
 (ب) اختبار جاما
 (ج) اختبار مان ويلي
 (د) اختبار الأسره

عشوائية، ما

نظر متوسط

دراسة أحد الظواهر الاجتماعية والمتمثلة في العنف الأسري لأحد المدن تبين أن تطور أعداد الأسر التي يوجد بها

| السنة | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| عدد الأسرى | 17 | 25 | 33 | 41 | 39 | 48 | 53 |

فإذا كان مجموع قيم $y = 256$ ، ومجموع قيم $x = 28$ ، ومجموع قيم $xy = 1184$ ،
ومجموع $x^2 = 140$ فإن

(29) من خلال البيانات السابقة فإن قيمة r تساوي:

- (أ) 13.72
(ب) 12.72
(ج) 11.72
(د) 10.72

(30) من خلال البيانات السابقة، عدد الأسرى المتوقع تعرضهم لظاهرة العنف الأسرى في عام 2013:

- (أ) 61
(ب) 71
(ج) 81
(د) 91

(31) من خلال البيانات السابقة، معدل التزايد السنوي في الأسرى المعرضة للعنف الأسرى يساوي:

- (أ) 2.71
(ب) 3.71
(ج) 4.71
(د) 5.71

(32) صندوق يدخله 20 ورقة متماثلة في الشكل واللون مرقمة من 1 إلى 20 اختيرت من الصندوق ورقة واحدة عشوائياً - ما احتمال أن يكون عليها رقم يقبل القسمة على 3 أو 7؟

- (أ) $(20 + 8) = (x + y) C$
(ب) $(20 + 7) = (x + y) C$
(ج) $(20 + 10) = (x + y) C$
(د) $(20 + 3) = (x + y) C$

(33) يستخدم الاختبار Bonferroni لإجراء المقارنات المتعددة للأوساط الحسابية في حالة:

- (أ) تساوي أحجام العينات
(ب) عدم تساوي أحجام العينات
(ج) تساوي أو عدم تساوي أحجام العينات
(د) عندما تكون أحجام العينات صغيرة جداً

(34) إذا كانت $H_1: \mu < 10$ فإن قيم الاختبار الإحصائي المحسوبة والتي لا تؤيد فرض العدم تقع في:

- (أ) منطقة الرفض
(ب) منطقة القبول
(ج) خارج منطقة الرفض ومنطقة القبول
(د) منطقة الإنواء

البيانات التالية تمثل أعداد الساعات التي ذكرها عشرة طلاب والدرجات التي حصلوا عليها في امتحان أحد المقررات:

| عدد الساعات X | 10 | 6 | 12 | 14 | 11 | 6 | 19 | 16 | 3 | 9 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| الدرجات y | 60 | 48 | 83 | 76 | 74 | 58 | 98 | 89 | 37 | 69 |

(35) من خلال البيانات السابقة، قيمة معامل ارتباط سبيرمان لارتباط الرتب "rs" يساوي:

- (أ) 0.678
(ب) 0.702
(ج) 0.815
(د) 0.973

- (36) من خواص معامل بيرسون للارتباط الخطي أنه:
- (أ) يتأثر بعمليات الجمع والفرح فقط والتي تحوي على المتغيرين X و Y .
 - (ب) يتأثر بعمليات الضرب والقسمة فقط والتي تحوي على المتغيرين X و Y .
 - (ج) يتأثر بالعمليات الحسابية جميعاً من جمع وفرح وضرب وقسمة والتي تحوي على المتغيرين X و Y .
 - (د) لا يتأثر بالعمليات الحسابية من جمع وفرح وضرب وقسمة مطلقاً والتي تحوي على المتغيرين X و Y .
- (37) يتكون مجلس إدارة إحدى الشركات من 5 محاسبين، 7 مهندسين، 3 اقتصاديين. انظر التوزيع التوافقي ما هو احتمال أن يكون من تم اختيارهم محاسب أو اقتصادي؟
- (أ) $H = 7 - 15 =$ (محاسب أو اقتصادي)
 - (ب) $H = 5 - 15 =$ (محاسب أو اقتصادي)
 - (ج) $H = 8 - 15 =$ (محاسب أو اقتصادي)
 - (د) $H = 3 - 15 =$ (محاسب أو اقتصادي)

لمقارنة اتجاهات عينة من الذكور والإناث فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو الإلتحاق على السلع الكمالية. أُعطيوا درجات معينة بحيث كانت أعلى درجات تشير إلى الرغبة في اقتناء الأشياء الكمالية وأدنى الدرجات تشير إلى الرغبة في شرائها. اختيرت عينة عشوائية من 10 رجال و 15 امرأة وبدأ الاختبار مع كل متوسط درجة الذكور 125 بالتحرف معياري قدره 14 بينما متوسط درجات الإناث 125 بالتحرف معياري قدره 19. وانطلاقاً من معرفة أن الإلتحاق ميلاً من الذكور في الإلتحاق على الكماليات على اعتبار أن قيمة $D = 0.7$.

- (38) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المجدولة (القيمة الحرجة لـ t) التي كانت السابقة تساوي:
- (أ) 1.962-
 - (ب) 1.415-
 - (ج) 1.319-
 - (د) 1.203-
- (39) من خلال البيانات السابقة، قيمة "ت" المحسوبة للبيانات السابقة تساوي:
- (أ) 2.18-
 - (ب) 2.47-
 - (ج) 2.56-
 - (د) 2.88-

- (40) إذا كانت $H_1: \rho < 1$ فإن المخطبر الإحصائي يسمى:
- (أ) اختبار من جانبين
 - (ب) اختبار من جانب واحد (طرف أيسر)
 - (ج) اختبار من جانب واحد (طرف أيمن)
 - (د) اختبار غير متحد الاتجاه

- (41) إذا وقعت القيمة المشاهدة للمختبر الإحصائي والمصنوية من بيانات العينة في منطقة الرفض لقر الفرض:
- (أ) نرفض الفرض البديل H_1 عند مستوى المعنوية α ونقبل الفرض الصفري H_0
 - (ب) نرفض الفرض الصفري H_0 عند مستوى المعنوية α ونقبل الفرض البديل H_1
 - (ج) نرفض الفرض البديل H_1 عند مستوى المعنوية α ونرفض الفرض الصفري H_0
 - (د) نقبل الفرض البديل H_1 عند مستوى المعنوية α ونقبل الفرض الصفري H_0

البيانات التالية تمثل إجابات عينة من سبعة أشخاص حول برامج الضمان الاجتماعي، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم:

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|--------|--------|
| السؤال الأول | جيدة | مقبولة | ممتازة | جيدة | جيدة جداً | مقبولة | جيدة |
| السؤال الثاني | جيدة جداً | مقبولة | جيدة جداً | جيدة | جيدة | مقبولة | ممتازة |

- (42) من خلال البيانات السابقة، قيمة معامل ارتباط بيرسون للارتباط الرتب بين هذين السؤالين يساوي:
- (أ) 0.42
 - (ب) 0.54
 - (ج) 0.67
 - (د) 0.78

التحليل

(47) اختار أحد الباحثين عينة حجمها $n=800$ معلما من أحد المدن، وأجرى لهم اختبارا تقييميا للكفايات التعليمية وكان توزيعهم حسب التقدير الذي حصلوا عليه كالتالي:

| التقدير المتحصل عليه | A | B | C | D |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| عدد المعلمين (التكرار المشاهد) | 200 | 150 | 100 | 350 |

(48)

هل يتفق هذا التوزيع مع توزيع معلمى إدارة تعليم مدينة أخرى كان توزيع لتقديراتهم فى الاختبار التقييمى لكفاياتهم التعليمية حسب النسب التالية:

| التقدير المتحصل عليه | A | B | C | D |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| النسب المئوية للمعلمين | 25% | 15% | 15% | 45% |

(49)

هنا جانبي شلل في تفكيرى ومادري ايش حليت

استخدم مستوى معنوية $\alpha = 0.05$

- (43) من خلال الدراسة السابقة، أفضل اختبار احصائي للتحقق من فرض الدراسة السابق هو:
- (أ) اختبار " مربع كاي² " لاختبار تباين المجتمع
 (ب) اختبار " مربع كاي² " لجودة التوفيق
 (ج) اختبار " مربع كاي² " للاستقلالية
 (د) اختبار " مربع كاي² " لارتباط المتغيرات

(44) من خلال البيانات السابقة، قيمة " E1 " التكرار المتوقع المناظر للتقدير " C " يساوي:

- (أ) 120
 (ب) 200
 (ج) 220
 (د) 360

(45) من خلال البيانات السابقة، قيمة " كاي² " المحسوبة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 11.11
 (ب) 12.15
 (ج) 12.93
 (د) 13.13

إذا كان لدينا ثلاث مصانع نسيج ، وتم تقييمها من قبل مجموعة من المتخصصين فى الجودة والكفاءة الإنتاج بالتالى على النتائج التالية :

| المصنع (1) X_1 | المصنع (2) X_2 | المصنع (3) X_3 |
|------------------|------------------|------------------|
| 7 | 4 | 2 |
| 10 | 6 | 2 |
| 10 | 7 | 3 |
| 11 | 9 | 7 |
| 12 | 9 | 6 |
| 50 | 35 | 20 |

ولكون لدينا ثلاث متغيرات فترية، ولرغبة مجلس الإدارة لهذه المصانع الثلاثة معرفة الفروق بين جودة وكفاءة الإنتاج للمصانع الثلاثة، فقد تم تحديد أن أنسب أسلوب إحصائي لتحليل هذه البيانات هو تحليل التباين الأحادي *One Way ANOVA* ، مع استخدام مستوى معنوية $\alpha = 0.05$

(46) من خلال البيانات السابقة، مجموع المربعات داخل المجموعات *Within Sum of Squares* يساوي:

- (أ) 54
 (ب) 22
 (ج) 18

(47) من خلال البيانات السابقة، متوسط المربعات بين المجموعات Between mean square يساوي:

- (أ) 25
(ب) 35
(ج) 45
(د) 55

(48) من خلال البيانات السابقة، قيمة " F " المحسوبة للبيانات السابقة تساوي:

- (أ) 6
(ب) 8
(ج) 10
(د) 12

(49) في طريقك إلى الجامعة توجد إشارة مرور، ما هو فضاء العينة لتجربة ذهابك إلى الجامعة؟

- (أ) $\Omega = \{GG, GR, RG, RR\}$
(ب) $\Omega = \{GG, GG, RR, RR\}$
(ج) $\Omega = \{GG, GG, RG, RR\}$
(د) $\Omega = \{GG, GR, RR, RR\}$

البيانات التالية تمثل أعمار ثمانية من رجال الأعمال ودخولهم الشهرية بالآلاف :

الأعمار x : 25 32 29 43 38 51 47 35
الدخول y : 10 18 15 35 40 62 100 50

(50) من خلال البيانات السابقة، معامل بيرسون للارتباط الخطي بين الأعمار والدخول يساوي:

- (أ) 0.75
(ب) 0.81
(ج) 0.86
(د) 0.93

مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق