

## المحاضرة الاولى : مقدمة + نظرية الاحتمالات

الإحصاء الاستنتاجي مقدمه:

يقسم علم الإحصاء بشكل عام الى قسمين

- 1- الإحصاء الوصفي : وهو ذلك العلم الذي يجمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها وعرضها عن طريق جداول او رسوم بيانية .
  - 2- الإحصاء الاستنتاجي : وهو العلم الذي يعنى بتحليل البيانات للتوصل الى تنبؤ او الاستقراء واتخاذ القرارات .
- علاقة علم الإحصاء بمجموعة العلوم الادارية ؟ يرتبط علم الإحصاء ارتباطا قويا بمجموعة العلوم الإدارية وذلك على اساس ان وظائف علوم الإدارة تستند في القيام بها بطريقة موضوعية على العديد من الطرق والنظريات الإحصائية .

\* فاتخاذ القرار ضروري وهام في علم الإدارة ويجب ان يؤخذ على اساس علمي غير متحيز حيث تقدم لنا نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي الاساس القياسي لهذا القرار كما ان عمليات الشراء او البيع وادارة الانتاج الصناعي وسياسات التسويق وغيرها الكثير يحتاج من المختصين الامام بالطرق الإحصائية من تفسيرات وتحديد العلاقات بين متغيرات هذه العلوم وقدرة كبيرة على وضع الفروض واختبارها والتأكد من مدى صحتها

### الفصل الاول: نظرية الاحتمالات

التجربة الإحصائية والفضاء العيني والحوادث:

**تعريف ١ "التجربة الإحصائية"** : هي أي عملية او مجموعة عمليات لا تعرف نتائجها المسبقة بشكل حتمي فمثلا رمي زهرة نرد او القاء قطعة نقد يمثلان تجربة إحصائية ويسمى هذا النوع من التجارب بالتجارب العشوائية حيث نلاحظ ان النتائج تتغير في كل مره يتم اجراء التجربة فيها ولكل تجربه إحصائية نتائج .

وتعرف النتيجة للتجربة على انها النتيجة البسيطة ، التي لا يمكن تحليلها الى نتيجتين او اكثر وتسمى جميع النتائج البسيطة الممكنة الحدوث بالفضاء العيني للتجربة

**تعريف ٢ "الفضاء العيني sample space"** : لتجربه إحصائية هي مجموعة جميع النتائج الممكنة لتلك التجربة وسنعتبر عن الفضاء العيني بالرمز S.

**تعريف ٣: "الحادث event"** : هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بأحد الاحرف التالية .. a,b,c ويقسم الى قسمين :

1- الحادث البسيط : وهو الحادث الذي يحتوي على نتيجة واحدة فقط

2- الحادث المركب : وهو الحادث الذي يحتوي على نتيجتين او اكثر

كما يمكن تعريف بعض من الحوادث التالية:

1- الحادث المستحيل : وهو الحادث الذي لا يحتوي على أي عنصر ورمزه  $\emptyset$

2- الحادث الاكيد : وهو الحادث الذي يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني S

**تعريف ٤ "فضاء العينة المنفصل"** : يسمى الفضاء العيني فضاء منفصلاً اذا كان محدودا او لانهايا معدودا ، أي اذا امكن ربط عناصره واحدا

الى واحد مع الاعداد الصحيحة الموجبة كأن نقول اربط العنصر الاول مع العدد ١ والعنصر الثاني مع العدد ٢ وهكذا الى مالا نهاية

مثال: في تجربة القاء قطعة نقد مرتين ، اوجد الفضاء العيني لهذه التجربة ثم اعط مثال على حادث بسيط ، حادث مركب وحادث اكيد ؟

ملاحظه: سيتم الرمز بالحرف H للصورة، والحرف T للكتابة

**الحل:**  $S = \{(H,H), (H,T), (T,H), (T,T)\}$


$A = \{(H,H)\}$  حادث بسيط

$B = \{(T,H), (T,T)\}$  حادث مركب

$C = S$  حادث اكيد

لاحظ أن الحادث الأكيد هو الحادث الذي يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني .

شجرة الاحتمال :



تمارين :

تمرين ١ : في تجربة القاء قطعة نقد وحجر نرد اوجد الفضاء العيني لهذه التجربة ثم اعط مثال على حادث بسيط وحادث مركب ؟

تمرين ٢ : في تجربة القاء حجري نرد مرة واحدة، أوجد الفضاء العيني لهذه التجربة واعط مثال على حادث بسيط، حادث مركب وحادث أكيد ؟

الحوادث المتنافية : نقول بأن الحادثين A,B حادثين متنافيين إذا تحقق الشرط التالي :  $A \cap B = \emptyset$

العمليات الجبرية على الحوادث:

$$A \cup B = \{ x : x \in A \text{ and } x \in B \}$$

$$A \cap B = \{ x : x \in A \text{ or } x \in B \}$$

$$A = \{ x : x \in S \text{ and } x \in A \}$$

$$A - B = \{ x : x \in A \text{ and } x \notin B \}$$

المخلص اسئلة المحاضرة الاولى المادة الاحصاء للادارة.  
بسم الله الرحمن الرحيم.

1- تعريف الاحصاء الوصفي:

- أ- وهو ذلك العلم الذي يعنى بجمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها وعرضها عن طريق جداول او رسوم بيانية.  
ب - وهو ذلك العلم الذي يعنى بجمع والتحليل البيانات وتنظيمها وعرضها وتصنيفها عن طريق جداول او رسوم بيانية.  
ج - وهو العلم الذي يعنى بتحليل البيانات للتوصل الى تنبؤ او الاستقراء واتخاذ القرارات.

2- تعريف الاحصاء الاستنتاجي:

- أ- وهو ذلك العلم الذي يعنى بجمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها وعرضها عن طريق جداول او رسوم بيانية.  
ب - وهو ذلك العلم الذي يعنى بتحليل البيانات للتوصل الى تنبؤ او الاستقراء واتخاذ القرارات.  
ج - وهو ذلك العلم الذي يعنى بجمع والتحليل البيانات وتنظيمها وتصنيفها وعرضها عن طريق جداول او رسوم بيانية.

3- يرتبط علم الاحصاء ارتباطاً قوياً بمجموعة:

- أ- العلوم الادارية . ب - العلوم الطبيعية. ج - العلوم الانسانية.  
4- اتخاذ القرار ضروري وهام في علم الادارة ويجب ان يؤخذ على اساس علمي غير متحيز حيث تقدم لنا نظرية الاحتمالات والتوقع الرياضي:

أ - نعم . ب - لا .

5- وظائف علوم الادارة تستند في القيام بها بطريقة موضوعية على العديد من الطرق والنظريات الاحصائية:

أ - نعم . ب - لا .

6- ينقسم نظرية الاحتمالات الى:

- أ- التجربة الاحصائية . ب - الفضاء العيني والحوادث . ج - التجربة الاحصائية والفضاء العيني والحوادث.

7- التجربة الحصائية:

- أ - هي أي عملية او مجموعة عمليات لاتعرف نتائجها المسبقة بشكل حتمي.  
ب - هي اي عملية او مجموعة عمليات لاتعرف نتائجها المسبقة بشكل غير حتمي  
ج - لتجربة احصائية هي مجموعة جميع النتائج الممكنة لتلك التجربة.

8- ويسمى التجربة الحصائية:

- أ - التجارب العشوائية . ب - التجارب الكيميائية. ج - التجارب النووية.

9- ماهي النتيجة التجربة الاحصائية:

أ - نتيجة بسيطة ، التي لايمكن تحليلها الى نتيجتين او اكثر وتسمى جميع النتائج البسيطة الممكنة الحدوث بالفضاء العيني للتجربة.

ب - نتيجة المعقدة ، التي لايمكن تحليلها الى نتيجتين او اكثر وتسمى جميع النتائج المعقدة الممكنة الحدوث في الفضاء العيني للتجربة.

ب - لا يوجد لها نتيجة محددة.

10- تعريف الفضاء العيني :

- أ - هي مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بأحد الاحرف التالية (a,b,s)  
ب - لتجربة أحصائية هي مجموعة جميع النتائج الممكنة لتلك التجربة وسنعبّر عن الفضاء العيني بالرمز (s).  
ج - لتجربة احصائية هي مجموعة جميع النتائج الممكنة لتلك التجربة وسنعبّر عن الفضاء العيني بالرمز (y).

11- تعريف الحادث:

- أ - هي مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بأحد الاحرف التالية (a,b,c) ..  
ب - هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بأحد الاحرف التالية (a,d,b) ..  
ج - هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بأحد الاحرف التالية (s) ..

12- ينقسم الحادث الى قسمين:

- أ - الحادث البسيط والحادث المركب.  
ب - الحادث البسيط والحادث غير المركب.  
ب - لا يوجد اجابة.

13- تعريف الحادث البسيط : وهو الحادث الذي يحتوي على نتيجتين او اكثر.

أ - نعم ب - لا

14- تعريف الحادث المركب : وهو الحادث الذي يحتوي على نتيجة واحدة فقط.

أ - نعم ب - لا

15- تعريف الحادث المستحيل : وهو الحادث الذي لا يحتوي على اي عنصر ورمزه (∅).

أ - نعم ب - لا

16- تعريف الحادث الاكيد : وهو الحادث الذي يحتوي على جميع عناصر الفضاء العيني. (s)

أ - نعم ب - لا

17- تعريف فضاء العينة المنفصل : يسمى الفضاء العيني فضاء منفصلاً اذا كان محدودا او لانهايتا معدودا ، اي اذا امكن ربط عناصره واحدا الى واحد مع الاعداد الصحيحة السالبة لربط العنصر الاول مع العدد 1. والعنصر الثاني مع العدد 2. حتى النهاية.

أ - نعم ب - لا

18- (مثال) في تجربة القاء قطعة نقد مرتين ، اوجد الفضاء العيني لهذه التجربة ثم اعط مثال على حادث بسيط حادث مركب وحادث أكيد؟ يوجد المثال وحلها على المذكورة . يجب مراجعة ( المحتوى )

الملخص اسئلة المحاضرة الاولى المادة الاحصاء للادارة.  
بسم الله الرحمن الرحيم.

مجهود الطالب / عبدالله سعد محمد العيسى.

التخصص / ادارة الاعمال.

## المحاضرة الثانية .. طرق العد

**مقدمة:** قبل البدء بدراسة مفهوم الاحتمال النسب ولاعتماده بشكل اساسي على عدد عناصر الفضاء العيني لتجربة عشوائية ، فلا بد من معرفة الطرق التي تساعدنا على ذلك . وهناك اربعة طرق للعد سنتعرف عليها على النحو الاتي :

**أولاً: قاعدة الضرب :** إذا كانت التجربة E1 تحدث في n1 الطرق وكانت التجربة E2 تحدث في n2 من الطرق، فإن التجريبتين معا تحدثان في n1n2 من الطرق.

**مثال:** إذا أراد طالب أن يسجل في مقررين احدهما في قسم الاحصاء والآخر من قسم المحاسبة، فإذا كان عدد المقررات لقسم الاحصاء هو ٤ وعدد المقررات من قسم المحاسبة هو ٥، فما عدد الطرق التي يمكن أن يسجل الطالب فيها؟

**الحل :** عدد الطرق =  $4 \times 5 = 20$  طريقة

**ملاحظة:** يمكن تعميم القاعدة لتشمل k من التجارب.

**مثال:** كم هاتفاً يمكن تركيبه في مدينة الدمام إذا تألف رقم الهاتف من أربعة أرقام بشرط أن يكون الرقم الأول من اليسار أوله العددين ٨ أو ٩ ؟

**الحل:** عدد الهواتف =  $2 \times 10 \times 10 \times 10 = 2000$  طريقة.

( لاحظ أن العدد الأول له طريقتان فقط لاختياره أما باقي المنازل فله ١٠ طرق لاختيارهم هي عبارته عن الأعداد من ٠ إلى ٩ ).

**ثانياً: قاعدة الجمع :** إذا كانت تجربة ما تحدث ف n2 من الطرق وكانت تجربة أخرى تحدث ف n2 من الطرق بحيث كان من المعلوم أن التجريبتين لا تحدثان معا ( مانعتان لبعضهما البعض ) فإن واحدة منهما أو الأخرى تحدث في n1+n2 من الطرق.

**مثال:** أراد طالب أن يسجل مقرر واحد إما من قسم الاحصاء أو قسم المحاسبة، بحيث كان عدد المقررات في قسم الاحصاء ٣ وفي قسم المحاسبة ٤ ، فما عدد الاختيارات لديه؟

**الحل:** عدد الطرق =  $3 + 4 = 7$  طرق .

**ملاحظة:** يمكن تعميم قاعدة الجمع لتشمل k من التجارب.

**ثالثاً: التباديل Permutations :** التباديل هي طرق ترتيب جميع أو بعض عناصر مجموعة ما.

**مثال:** ما عدد طرق ترتيب جمع الحروف a, b, c ؟

**الحل:** لاحظ أنه لدينا ثلاثة اماكن لنملأها من الحروف الثلاثة حيث يمكن اختيار ثلاثة احرف للمكان الأول أما المكان الثاني فيتبقى لدينا حرفان لملء المكان واخيراً يبقى حرف واحد لملء المكان الأخير وبتطبيق قاعدة الضرب نحصل على :

عدد الطرق =  $3 \times 2 \times 1 = 6$  طرق

وبشكل عام، لدينا الحالات الثلاث التالية:

١- يمكن ترتيب n من العناصر المختلفة بطرق عددها  $3 \times 2 \times 1 \dots nPn = n!$

وهذا هو عدد تباديل n من العناصر المميزة.

( ملاحظة : تسمى العملية "n1" بمضروب العدد n وهو عبارة عن  $3 \times 2 \times 1 \dots n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots$  ومثال عليها  $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$  )

**مثال:** بكم طريقة يمكن ترتيب احرف كلمة "تقوى" ؟

**الحل:** عدد الطرق يساوي  $4P4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

٢- في حالة وجود لدينا n من العناصر فيها n1 من العناصر المتماثلة و n2 من العناصر المتماثلة والمختلفة عن الاولى وهكذا لغاية

k من العناصر المتماثلة ، فإن عدد التباديل في هذه الحالة يصبح على النحو الآتي :  $n! / (n1!n2! \dots nk!)$

**مثال:** ما عدد تباديل احرف كلمة "سلسبيل"؟

**الحل:** عدد الطرق يساوي  $6P6 = \frac{6!}{2! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 2 \times 1} = 180$

لاحظ أن حرف "س" تكرر مرتين وكذلك حرف "ل" أما بقية الحروف فتكررت مرة واحدة.

٣- في هذه الحالة كان لدينا n من العناصر المميزة و اردنا ترتيب جزء من هذه العناصر وليكن r ، ففي هذه الحالة يكتب قانون التباديل

على الصورة التالية :  $nPr = \frac{n!}{(n-r)!}$

**مثال :** ما عدد تباديل حرفين من كلمة " تاريخ" ؟

**الحل :** لاحظ أن عدد احرف كلمة "تاريخ" هو ٥ وبذلك تصبح قيمة  $n=5$  أما  $r=2$  كما هو مطلوب في السؤال وبذلك تصبح عدد الطرق

تساوي  $5P2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = 20$

**رابعاً: التوافيق Combinations :** التوافيق هي الطرق التي نختار بها عدداً معيناً من عناصر مجموعة معينة دون النظر الى الترتيب.

**مثال :** ما عدد الطرق التي نختار بها حرفين من الحروف A,B,C دون الاهتمام بالترتيب ؟

**الحل :** الاختيارات هي  $\{A,B\}$  ,  $\{A,C\}$  ,  $\{B,C\}$  وبذلك يكون لدينا ٣ طرق .

وبشكل عام، عدد الطرق التي نختار بها r عنصر من مجموعة فيها n من العناصر بغض النظر عن الترتيب هو عدد توافيق n من العناصر

مأخوذة منها r في كل مرة ويعطى بالصيغة التالية :  $nCr = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

**مثال:** صف فيه ١٠ طلاب، بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من ٣ طلاب دون النظر الى الترتيب؟

**الحل:**  $10C3 = \frac{10!}{(10-3)!3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 120$

**مثال:** صندوق فيه ٥ كرات حمراء و ٧ كرات بيضاء.

أ- بكم طريقة نختار ٤ كرات من الصندوق؟

ب- بكم طريقة نختار الكرات الأربع بحيث تكون فيها واحدة حمراء وثلاث كرات بيضاء؟

(أ) من قاعدة التوافيق، عدد طرق اختيار ٤ كرات من الصندوق يساوي

$${}_{12}C_4 = \frac{12!}{(12-4)!4!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8!}{8! \times 4!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 495$$

الحل: 495

$${}_{5}C_1 = \frac{5!}{4! \times 1!} = \frac{5 \times 4!}{4!} = 5$$

ب) عدد طرق اختيار كرة واحدة من الكرات الحمراء هو 5

$${}_{7}C_3 = \frac{7!}{4! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3 \times 2 \times 1} = 35$$

أما عدد طرق اختيار 3 كرات بيضاء فهو 35

إذن، من قاعدة الضرب، عدد طرق اختيار كرة واحدة وثلاث كرات بيضاء هو  $3 \times 35 = 175$

تمارين:

١- بكم طريقة يمكن ترتيب كلمة "MISSISSIPPI"؟

٢- بكم طريقة يمكن اختيار رقمين من العدد ٣١٥٩

أ- مع الترتيب؟

ب- بدون ترتيب؟

## 1- ينقسم الطرق العد الى :-

أ- قواعد الضرب والتوافق. ب- قواعد الجمع والتبديل. ج- قواعد الجمع والضرب. د- قواعد الضرب والجمع والتوافق والتبديل.

2- اذا كانت التجربة ((E1) تحدث في (n1) الطرق وكانت التجربة (E2) تحدث في (n2) من الطرق، فان التجريبتين معا تحدثان في (n1n2) من الطرق؟

أ- قاعده الضرب. ب- قاعده الجمع. ج- قاعده التبديل. د- قاعده التوافق.

3- اذا أراد طالب ان يسجل في مقررين احدهما في قسم الاحصاء والاخر من قسم المحاسبة ، فاذا كان عدد المقررات لقسم الاحصاء هو4 وعدد المقررات من قسم المحاسبة هو 5 ، فما عدد الطرق التي يمكن أن يسجل الطالب فيها؟

أ- 20 طريقة. ب- 17 طريقة. ج- 22 طريقة. د- 12 طريقة.

4- كم هاتفا يمكن تركيبه في مدينة الدمام اذا تالف رقم الهاتف من أربعة أرقام بشرط أن يكون الرقم الاول من اليسار أولة والعديدين 8 أو 9 ؟

أ- 2110 طريقة. ب- 7 طريقة. ج- 2000 طريقة. د- 50 طريقة.

5- اذا كانت تجربة ما تحدث في ( n2 ) من الطرق وكانت تجربة أخرى تحدث في ( n2 ) من الطرق بحيث كان من المعلوم أن التجريبتين لاثحدثان معا ماتعتان لبعضهما البعض فان واحد منهم أو الاخرى تحدث في ( n1+n2 ) من الطرق ؟:

أ- قاعدة الضرب. ب- قاعدة الجمع. ج- قاعدة التبديل. د- قاعدة التوافق.

6-أراد طالب ان يسجل مقرر واحد اما من قسم الاحصاء او قسم المحاسبة بحيث كان عدد المقررات في قسم الاحصاء 3 وفي قسم المحاسبة4 فما عدداالاختيارات لديه؟

أ- 9. ب- 10. ج- 7. د- 8.

7- هي الطرق ترتيب جميع أو بعض عناصر مجموعة ما؟:

أ- التبديل. ب- الجمع. ج- التوافق. د- الضرب.

8- بكم طريقة يمكن ترتيب احرف كلمة " تقوى"؟

أ- 24. ب- 25. ج- 17. د- 55.

9- ماعدد تبديل احرف كلمة " سلسيل" ؟

أ- 199. ب- 499. ج- 444. د- 180.

10- ماعدد تبديل حرفين من كلمة " تاريخ" ؟

أ- 20. ب- 24. ج- 27. د- 45.

11- هي الطرق التي نختار بها عددا معينا من عناصر مجموعة معينة لون النظر الى الترتيب؟:

أ- التوافق. ب- التبديل. ج- الجمع. د- الضرب.

12- ماعدد الطرق التي نختار بها حرفين من الحروف ( A.b.c ) دون الاهتمام بالترتيب؟

أ- 9 طرق. ب- 7 طرق. ج- 4 طرق. د- 3 طرق.

**13- صف فيه 10 طلاب ، بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من 3 طلاب دون النظر الى الترتيب؟**

أ- 122 . ب- 120 . ج- 110 . د- 600

14- صندوق فيه 5 كرات حمراء و7 كرات بيضاء؟ بكم طريقة نختار 4 كرات من الصندوق؟

أ- 495 . ب- 484 . ج- 474 . د- 420.

15- بكم طريقة تختار الكرات الاربع بحيث تكون فيها واحدة حمراء وثلاث كرات بيضاء؟ (14)^ )

أ- 177 . ب- 158 . ج- 175 . د- 110.

**مجهود الطالب / عبدالله سعد العيسى**

**التخصص / ادارة الاعمال**



## المحاضرة الثالثة نظرية الاحتمالات

مقدمة : مفهوم الاحتمال .. هناك عدة طرق متعددة يمكن من خلالها تقديم مفهوم الاحتمال منها :

١/ طريقة الرأي الشخصي : وهي تعتمد على التقدير الشخصي للفرد والذي يرغب بتعيين احتمال حدوث حدث ما ، و كأن يقول احتمال حصوله على تقدير مرتفع لمقرر الاحصاء للإدارة نظراً للجهد الذي بذله في دراستها .

٢/ طريقة التكرار النسبي : ويعرف بأنه إذا تكرر إجراء تجربة احصائية  $n$  من المرات تحت نفس الظروف وكان عدد المرات التي تؤدي إلى حدوث الحادث  $A$  يساوي  $n(A)$  فإن التكرار النسبي لهذا الحادث هو  $\frac{n(A)}{n}$  ، وإذا كبرت  $n$  بدون حدود وكانت  $n(A)$  تكبر معها بحيث يؤول التكرار النسبي في النهاية إلى عدد ثابت ، وليكن  $p$  فعندئذ نقول أن احتمال الحادث  $A$  هو العدد  $p$ .

مثال : عند رمي قطعة نقد عدد معين من المرات بحيث يتم تسجيل ظهور الصورة فيها ، نلاحظ أن التكرار النسبي يقترب من  $\frac{1}{2}$  عند

رمي قطعة النقد عدد كبير جداً من المرات. ونقول بأن احتمال ظهور الصورة (H) عند رمي قطعة نقد منتظمة =  $\frac{1}{2}$

مثال : إذا كان طلبة إحدى الكليات موزعين على التخصصات المختلفة فيها حسب الجدول التالي:

التخصص	عدد الطلبة
إدارة أعمال	320
محاسبة	480
تسويق	300
علوم مالية ومصرفية	500

إذا قام احد المدرسين بمقابلة أحد الطلبة، فما هو احتمال أن يكون من قسم المحاسبة؟

الحل: التكرار النسبي لطلبة تخصص المحاسبة يساوي  $0.3 = \frac{480}{320+480+300+500}$

أن مفهوم التكرار النسبي يقودنا إلى تقديم التعريف التالي :

فضاء العينة ذو النقط المتساوية إمكانية الحدوث : إذا احتوى الفضاء العيني على عدد من النقاط  $n$  بحيث كانت فرصة الحصول على أي نتيجة بسيطة مساوية على أية نتيجة بسيطة أخرى فإنه يقال أن الفضاء العيني  $S$  فيه  $n$  من النقط إمكانية الحدوث ويكون كل حدث بسيط منفصلاً عن أي حدث آخر بحيث يكون احتمال حدوث كل حدث مساوياً للحدث الآخر . ومن هذا نحصل على النتيجة التالية : إذا

احتوى حادث  $A$  على عدد من النقط  $n(A)$ ، فإن احتمال هذا الحادث هو :  $p(A) = \frac{n(A)}{n} = \frac{\text{عدد عناصر الحادث } A}{\text{عدد عناصر الفضاء العيني}}$

مثال : في تجربة القاء قطعة نقد متزنة ثلاث مرات أوجد احتمال كل من الحوادث التالية :

١/ إذا كان الحادث  $A$  يمثل ظهور الصورة (H) مرتين على الأقل ؟

٢/ إذا كان الحادث  $B$  يمثل ظهور الواجهة الثلاث متشابهة ؟

الحل : لاحظ أن عناصر الفضاء العيني لهذه التجربة تكتب كما يلي :

$S = \{(H,H,H), (H,H,T), (H,T,H), (H,T,T), (T,T,T), (T,T,H), (T,H,T), (T,H,H)\}$

لاحظ أن عدد عناصر الفضاء العيني يساوي  $8 = 2 \times 2 \times 2$  (من قاعدة الضرب).

$$1- p(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

احظ أن الحوادث التي ظهرت الصورة فيها مرتين على الأقل هي  $(H,H,H), (H,H,T), (T,H,H), (H,T,H)$

$$2- p(B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

لاحظ ظهور الواجهة الثلاث متشابهة في حادثين .

قوانين الاحتمالات: في هذا البند سنورد القوانين الأولية في الاحتمال وهي :

نظرية (1) :

١- إذا كان لدينا المجموعة الخالية ورمزها  $\emptyset$  فإن احتمال هذه المجموعة يساوي صفر . بالرموز  $p(\emptyset) = 0$

٢- إذا كان لدينا المجموعة الكلية ورمزها  $S$  فإن احتمال هذه المجموعة يساوي 1 . بالرموز  $p(S) = 1$

٣- احتمال أي حادث  $E$  من الفضاء العيني  $S$  يكون محصور بين الصفر والواحد . بالرموز  $0 \leq p(s) \leq 1$

نظرية (2) : إذا كان  $A$  حادثاً في  $S$  ، وكان  $\bar{A}$  هو متممة ذلك الحادث فإن  $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$

مثال : إذا كان احتمال نجاح طال في مادة الحاسبة ما هو 80% ، فما احتمال عدم نجاحه في تلك المادة ؟

الحل : بفرض اننا رمزنا لنجاح الطالب في مادة المحاسبة بالرمز  $A$  ، فإن احتمال عدم نجاحه يساوي  $p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0.80 = 0.20$

$$0.08 = 0.20$$

مثال : إذا كان احتمال وصول طالب إلى محاضراته في الوقت المحدد هو 0.75 فما احتمال وصول الطالب المتأخر ؟

الحل : نفرض أن  $A =$  وصول الطالب على الموعد المحدد

$\bar{A} =$  وصول الطالب متأخراً

$$P(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0.75 = 0.25$$

**نظرية (3) :** إذا كان A, B أي حدثين في الفضاء العيني S فإن  $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$  مثال : إذا كان احتمال غياب طالب عن المحاضرة الأولى هو 0.30 وغيابه عن المحاضرة الثانية هو 0.15 واحتمال غيابه عن المحاضرة الأولى والثانية يساوي 0.20، أجب عن الاسئلة التالية :

(أ) ما احتمال غياب الطالب عن أحد المحاضرتين على الأقل ؟

(ب) ما احتمال عد غياب الطالب عن أي من المحاضرتين ؟

(ج) ما احتمال حضور الطالب للمحاضرة الأولى ؟

**الحل :** نفرض أن A تمثل غياب طالب عن المحاضرة الأولى ونفرض أن B تمثل الغياب عن المحاضرة الثانية . وبذلك فإن  $A \cap B$  يمثل الغياب عن كلا المحاضرتين

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0.30 + 0.15 - 0.20 = 0.25 \quad (أ)$$

(ب) عدم غياب الطالب عن أي محاضرتين يعني أنه حضر المحاضرتين، وهذا يعني متممة الحادث "غياب الطالب عن إحدى المحاضرتين على الأقل" أي أنه متممة  $(A \cup B)$  ومن قانون المتممة

$$p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0.25 = 0.75$$

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0.30 = 0.70 \quad (ج)$$

**مثال :** إذا كان  $p(A) = 0.5$  ,  $p(B) = 0.8$  ,  $p(A \cup B) = 0.9$  . أوجد

$$p(A \cap B) \quad (أ)$$

$$p(\bar{A}) \quad (ب)$$

$$p(\overline{A \cap B}) \quad (ج)$$

$$\begin{array}{l} \text{الحل :} \\ p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) \\ 0.9 = 0.5 + 0.8 - p(A \cap B) \end{array} \quad (١)$$



$$p(A \cap B) = 1.3 - 0.9 = 0.4 \quad (٢)$$

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0.5 = 0.5 \quad (٢)$$

$$p(\overline{A \cap B}) = 1 - p(A \cap B) = 1 - 0.4 = 0.6 \quad (٣)$$

**ملاحظة :** في حال كان الحدثين A, B حدثين منفصلين ، فإن تقاطعهما  $\emptyset$  وبذلك تصبح النظرية (3) على الصورة

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

**مثال :** إذا كان  $p(A) = 0.3$  ،  $p(B) = 0.4$  بحيث كان الحدثين A, B حدثين منفصلين ، فأوجد احتمال حدوث الحادث A أو حدوث الحادث B ؟

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

لاحظ أن احتمال حدوث الحادث A أو الحادث B أو حدوث احدهما على الأقل تعني  $p(A \cup B)$  أما في حال السؤال عن احتمال حدوث

الحادث A والحادث B أو حدوث كليهما معاً فهذا يعني  $p(A \cap B)$

**نظرية (4) :** إذا كان A, B أي حدثين في الفضاء العيني S فإن

$$p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B) \quad (أ)$$

$$p(B \cap \bar{A}) = p(B) - p(A \cap B) \quad (ب)$$

**مثال :** إذا كان احتمال حضور مدير شركة معينة في يوم ما يساوي 0.9 واحتمال حضور مساعد في ذلك اليوم هو 0.95 واحتمال حضور واحد منهما على الأقل يساوي أو أوجد احتمال

1- حضور المدير ومساعدته؟

2- حضور المدير وحده؟

3- حضور المساعد وحده؟

**الحل :** نعبر عن حضور المدير بالحادث A وحضور المساعد بالرمز ، وحضور احدهما على الأقل بالرمز  $A \cup B$

١- من نظرية رقم ثلاث نجد أن :

$$\begin{array}{l} \text{الحل :} \\ p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) \\ 0.97 = 0.90 + 0.95 - p(A \cap B) \end{array}$$



$$p(A \cap B) = 1.85 - 0.97 = 0.88$$

٢- حضور المدير وحده تعني أن المدير حضور وغيابك مساعد ، وهذا يعني حدوث الحادث A وعدم حدوث الحادث

$$p(A \cap B) = p(\bar{A}) - p(A \cap B) \quad 0.90 - 0.88 = 0.02$$

٣- حضور المساعد وحده تعني أن المساعد حضر والمدير غاب حدوث B وعدم حدوث A .

$$p(B \cap \bar{A}) = p(B) - p(A \cap B) = 0.95 - 0.88 = 0.07$$

تمارين : في تجربة القاء حجر نرد منتظم مرتين اوجد احتمال ما يلي :

1- ظهور عددين متشابهين

2- ظهور عددين مختلفين

3- ظهور عددين مجموعهما أكبر من 12 ؟

4- ظهور عددين بحيث يكون الأول عدد فردي؟

المحاضرة الرابعة  
تابع نظرية الاحتمالات

قوانين ديمورغان :

وهي :

$$\begin{aligned} \overline{(A \cup B)} &= \bar{A} \cap \bar{B} \\ \overline{(A \cap B)} &= \bar{A} \cup \bar{B} \end{aligned}$$

ومنها نستنتج :

$$\begin{aligned} P(\overline{A \cup B}) &= P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\ P(\overline{A \cap B}) &= P(\bar{A} \cup \bar{B}) \end{aligned}$$

+ مثال : إذا كان :

$$P(A \cup B) = 0.5 \quad - \quad P(B) = 0.4 \quad - \quad P(A) = 0.3 \quad -$$

أوجد ما يلي :

١- احتمال حدوث الحادئين معاً .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.5 = 0.3 + 0.4 - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = 0.7 - 0.5$$

$$= 0.2$$

٢- عدم حدوث الحادئين .

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B})$$

$$1 - 0.5$$

$$= 0.5$$

٣- عدم حدوث الحادث A أو الحادث B .

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$1 - 0.2$$

$$= 0.8$$

٤- حدوث الحادث A وعدم حدوث الحادث B .

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$= 0.3 - 0.2$$

$$= 0.1$$

٥- حدوث الحادث **B** وعدم حدوث الحادث **A**.

$$\begin{aligned} P(B \cap \bar{A}) &= P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.4 - 0.2 \\ &= 0.2 \end{aligned}$$

٦- احتمال حدوث الحادث **A** أو الحادث **B** إذا كانا حادثين منفصلين .

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= 0.3 + 0.4 \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

الاحتمال الشرطي :

يعرف على أنه احتمال وقوع الحادث **A** مشروطاً بحدوث الحادث **B** .. ويرمز له بالرمز  $P(A/B)$  ويعرف :

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

وكذلك يمكن تعريف احتمال حدوث الحادث **B** مشروطاً بحدوث الحادث **A** .. ويعرف :  $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

+ مثال : رميت قطعة نقد ٣ مرات ، فإذا رمزنا لظهور الصورة بحرف **H** وظهور الكتابة بحرف **T** ، إذا علم أن الوجه الأول في الرمية الأولى **H** ، فما احتمال أن يكون الوجهان الآخران **H, H** ؟

الحل :

- الفضاء العيني  $S =$

$$\{(H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (H, T, T), (T, T, T), (T, T, H), (T, H, T), (T, H, H)\}$$

- نفرض أن **A** يمثل الحادث \*ظهور الوجه الأول\* .. - نفرض أن **B** يمثل \*ظهور الوجهان الآخران\*

- المطلوب  $P(A/B)$  .

- قانون الاحتمال :  $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

- بالنظر لفضاء العينة :

$$P(A) = \frac{4}{8}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

- بالتعويض في قانون الاحتمال :

$$P(B/A) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{4}{8}} = \frac{1}{4}$$

### قاعدة الضرب :

من خلال تعريف الاحتمال الشرطي نجد أن :

$$\bullet P(A \cap B) = P(B) P(A/B) \quad \bullet P(A \cap B) = P(A) P(B/A)$$

+ مثال : إذا كان :  $P(A) = 0.6$      $P(B) = 0.3$      $P(A/B) = 0.4$

أوجد :

$$- P(B/A)$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$
$$= \frac{0.3 + 0.4}{0.6} = \frac{0.12}{0.6} = 0.2$$

$$- P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) P(B/A)$$

$$= 0.6 \times 0.4 = 0.12$$

### الحوادث المستقلة :

يقال بأن الحادثان  $A, B$  حادثان مستقلان إذا كان حصول أحدهما لا يؤثر على الآخر.

$$P(A/B) = P(A)$$

$$P(B/A) = P(B)$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

+ مثال : إذا كان  $A, B$  حادثين مستقلين ، وكان  $P(A) = 0.4$  و  $P(B) = 0.6$

أوجد :

$$- P(\overline{A \cap B})$$

$$P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$= 1 - 0.24$$

$$= 0.76$$

$$- P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= 0.4 \times 0.5$$

$$= 0.24$$

+ مثال : إذا كان  $-P(A) = 0.6$   $-P(A/B) = 0.6$   $-P(B/A) = 0.5$  هل الحادثان A,B مستقلان ؟

الحل :

بما أن  $P(A/B) = P(A) = 0.6$  فإن الحادثان A,B مستقلان .

مع ذلك نجد أن  $P(B) = P(B/A) = 0.5$

تمارين : إذا كان  $-P(B) = 0.8$   $-P(A) = 0.7$

أوجد ما يلي :

١-  $P(A \cup B)$  إذا كانا حادثين مستقلين .

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0.8 + 0.7 - (0.8 \times 0.7) \\ &= 0.94 \end{aligned}$$

٢-  $P(A \cup B)$  إذا كانا حادثين منفصلين .

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) \\ &= 0.8 + 0.7 \\ &= 1.5 \end{aligned}$$

٣-  $P(\overline{A \cap B})$  إذا كانا حادثين مستقلين .

$$\begin{aligned} P(\overline{A \cap B}) &= 1 - P(A \cap B) \\ &= 1 - (0.8 \times 0.7) \\ &= 0.44 \end{aligned}$$

٤-  $P(A/B)$  إذا كانا حادثين مستقلين .

$$\begin{aligned} P(A/B) &= P(A) \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

٥-  $P(B/A)$  إذا كانا حادثين منفصلين .

$$\begin{aligned} P(B/A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{0}{0.7} = .44 \end{aligned}$$





## : المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية المنفصلة

في كثير من الأحيان تكون نتائج تجربة ما قياسات وصفية أو نوعية، مثل الفضاء العيني لتجربة إلقاء قطعة نقط مرة واحدة إما H و T وهي قياسات نوعية أما في تجربة إلقاء حجر نرد فتكون النتائج الأعداد من 1 إلى 6 وتكون النتائج في هذا الفضاء العيني نتائج قياسية (كميات عددية). وفي جميع هذه الأنواع من التجارب التي تكون النتائج فيها قياسات نوعية أو قياسات كمية فإننا سنقوم بربط كل نتيجة من نتائج الفضاء العيني لتجربة إحصائية بقيمة عددية من خلال تعريف اقترانات حقيقية على نقاط فضاء العينة وبالتالي إعطاءنا المجال.

### - المتغير العشوائي Random Variable:

**تعريف:** المتغير العشوائي X هو اقتران حقيقي يعرف على فضاء العينة بحيث يعين قيمة عددية لكل نتيجة بسيطة فيه، ويرمز له بحرف لاتيني كبير X, Y, ... ولأي قيمة لذلك المتغير بحرف صغير x, y, ...

عرف المتغير العشوائي X والذي يمثل عدد مرات ظهور الصورة H

قيمة X	النتيجة
3	{HHH}
2	{THH, HTH, HHT}
1	{THT, TTH, HTT}
0	{TTT}

نلاحظ أن كل نتيجة بسيطة من عناصر الفضاء العيني تأخذ قيمة واحدة معينة حيث البعض منها يتشابه في ذلك العدد وبذلك نستطيع إعادة تنظيم النتائج السابقة على الصورة التالية:

عناصر الفضاء العيني	قيمة X
HHH	3
HHT	2
HTH	2
HTT	1
TTT	0
TTH	1
THT	1
THH	2

X والمجموعات الجزئية لهذا الفضاء تسمى حوادث تعبر عنها بدلالة X.

إن مجموعة القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X

$$\{X=0\}, \{X=2\}, \{X=3\}$$

اعتماداً على المثال السابق عرف المتغيرات العشوائية التالية:

( المتغير العشوائي Y يمثل الفرق المطلق بين عدد H و T

( المتغير العشوائي Z يمثل عدد H و T

قيمة Z	
-3	{TTT}
-1	{HTT, THT, TTH}
1	{HHT, HTH, THH}
3	{HHH}

قيمة Y	
1	{TTH, THT, THH, HTH, HTT, HHT}
3	{TTT, HHH}

### - أنواع المتغيرات العشوائية:

ينقسم المتغير العشوائي إلى قسمين:

1- المتغير العشوائي المنفصل (Discrete): وهو المتغير الذي يأخذ قيماً إما محدودة أو لا نهائية محدودة بمعنى أنه يمكن ربط قيمة

واحد لواحد مع مجموعة الأعداد الصحيحة. ومن الأمثلة عليه عدد أفراد الأسرة، عدد المواليد...

2- المتغير العشوائي المتصل (Continuous): وهو المتغير الذي يأخذ جميع القيم في فترة ما

...

نلاحظ أن كل قيمة من قيم المتغير العشوائي X يقابله حادث أو مجموعة من الحوادث من فضاء العينة S وبالتالي يمكن تعيين احتمالاً لهذا الحادث بدلالة المتغير العشوائي مساوياً لاحتمال الحادث في فضاء العينة S. ل التالي يوضح ذلك.

في تجربة إلقاء قطعة نقد ثلاث مرات حيث X يمثل عدد مرات ظهور الصورة H :

$$P\{X=2\} \quad -2 \quad P\{X=3\} \quad -1$$

$$P(X=3) = \frac{1}{8} \quad \text{لي} \quad X=3 \text{ يقابل الحادث HHH} \quad -1$$

$$X=2 \text{ فنلاحظ أن الحوادث التي تقابل هذه القيمة هي } \{HHT, HTH, THH\} \quad -2$$

$$P(X=2) = \frac{3}{8}$$

قيمة X	P(X=X)
3	
2	
1	
0	

ويمكننا وضع جدول يعطينا قيم X والاحتمالات المقابلة لها كما في الجدول التالي:

**تمرين:** في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرتين، إذا كان المتغير العشوائي X يمثل مجموعة العددين الظاهرين، عرف ذل كالمتغير واحتمال كل منهما؟

الجدول السابق يقودنا إلى التعريف التالي:

- التوزيع الاحتمالي المنفصل **Discrete Probability Distribution**:

**تعريف:** كل جدول أو معادلة يعطي جميع القيم التي يمكن أن يأخذها متغير عشوائي منفصل مع احتمال كل قيمة منها يسمى توزيعاً احتمالياً بحيث يحقق الشرطين التاليين:

1- احتمال كل قيمة من قيم X عدد غير سالب.

2- مجموع الاحتمالات للقيم التي يأخذها X .1

$f(x)$  فان الشرطين السابقين يصبحان على الصورة:

لجميع قيم  $x$  ,  $f(x) \geq 0$

لجميع قيم  $x$  ,  $\sum f(x) = 1$

\_\_\_: هل تمثل المعادلة  $f(x) = \frac{x}{15}; x = 1, 2, 3, 4, 5$  لغير ذلك:  $f(x) = 0$  توزيعاً احتمالياً منفصلاً؟

\_\_\_: لاحظ أن الشرط الأول متحقق لجميع قيم X. أما مجموع قيم  $f(x)$  فهي:

f(x) توزيع احتمالي حقق الشرطين الأول والثاني.

يمكن وضع المعادلة على شكل جدول على الصورة:

X	1	2	3	4	5

والتي تجعل ذلك الجدول يمثل توزيعاً احتمالياً واحسب احتمال X

\_\_\_: أوجد قيمة a

4

x	1	2	3	4	5	6
	a					

\_\_\_:  $\sum f(x) = 1$

$$a + \frac{1}{10} + \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 1$$

وبتوحيد المقامات نجد أن:

$$a = 1 - \frac{14}{20} = \frac{20}{20} - \frac{14}{20} = \frac{5}{20} = \frac{3}{10}$$

ولإيجاد احتمال X

4:

أما لإيجاد احتمال X أقل من أو يساوي 4:

## التوزيعات الاحتمالية المتصلة :

**تعريف:** إذا كان  $X$  متغير عشوائي متصل وكان  $f(x)$  اقتران حقيقي يتحقق الشرطان التاليين:


$$f(x) \geq 0, -\infty < X < \infty \quad -1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad -2$$

( )  $f(x)$  وتسمى الكثافة الاحتمالية أي التوزيع الاحتمالي المتصل للمتغير  $X$ .

ويكون احتمال وقوع  $X$  بين قيمتين  $a = x$  ،  $b = x$  يساوي المساحة تحت منحنى  $f(x)$  وفوق المحور الأفقي والمحصور بين  $a$  ،  $b$  التالي يوضح ذلك

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx$$




ومن أنواع التوزيعات الاحتمالية المتصلة التي سنتعرف عليها في هذا الفصل:

**-1 التوزيع الطبيعي (The normal Distribution):** ويعتبر من أهم التوزيعات الاحتمالية المتصلة حيث يوصل التوزيع الطبيعي من خلال معادلة رياضية تحدد منحناه وتعين تماماً وبمعرفة كل من المعدل  $\mu$  والتباين  $\sigma^2$  والتي يمكن كتابتها على الصورة التالية:

$X$  هو الذي يقع بين النقطتين  $a$  و  $b$  هو:

حيث  $\mu$ : معدل التوزيع ،  $\sigma^2$ : التباين ،  $e \approx 2.718$  ،  $\pi = 3.14$

$$X: N(M, \sigma^2)$$



وسنعتبر عن المتغير العشوائي  $X$  والذي يخضع للتوزيع الطبيعي الذي معدله  $\mu$  وتباينه  $\sigma^2$

\* خواص التوزيع الطبيعي:

**-1**  $M$  بحيث يشبه شكله شكل الجرس.

**-2** له قيمة واحدة، وبذلك له منوال واحد ينطبق على الوسط الحسابي  $M$ .

**-3** تقارب طرفا منحنى التوزيع الطبيعي من الصفر عند  $X \rightarrow -\infty$  و  $X \rightarrow \infty$ .

**-4** المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي تساوي 1.

**-2 التوزيع الطبيعي المعياري (Standard Normal Distribution):** هو التوزيع الطبيعي الذي معدله ( ) يساوي

صفر وتباينه يساوي 1، وسنعتبر عن التوزيع بالرمز  $Z: N(0, 1)$ .

**نظرية:** إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي  $X$  هو التوزيع الطبيعي ذو المعدل  $\mu$  والتباين  $\sigma^2$  فإن توزيعه المتغير العشوائي:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \text{ هو التوزيع الطبيعي المعياري.}$$

كل قيمة من  $X$  تقابلها قيمة من قيم  $Z$  حسب التحويل السابق وتسمى قيم  $Z$  القيم المعيارية المقابلة لقيم  $X$ .

:  $X: N(70, 25)$  ، أوجد القيم المعيارية المقابلة لكل من القيم التالية:

$$X_1 = 62 \quad -1$$

$$X_2 = 13 \quad -2$$

: لتحويل قيم  $X$  إلى قيم  $Z$  ، نستخدم التحويل التالي:  $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$  ( = ..... المعياري)

$$1- Z_1 = \frac{65 - 70}{5} = \frac{-5}{5} = -1$$

$$2- Z_2 = \frac{13 - 70}{5} = \frac{-57}{5}$$

وزيع الطبيعي المعياري لإيجاد المساحة المحصورة بين متغيرين عشوائيين حيث

$$P(Z < z)$$


\* المساحات تحت التوزيع الطبيعي:

تعطي هذه الجداول المساحة إلى يسار ثم  $Z$

ذات خانة عشرية واحدة والصف العلوي يعطي الخانة العشرية الثانية، وتقاطع الصف  $Z$  لاحظوا أن العمود الأيسر في الجدول يعطي قيم

العمود يعطي المساحة المطلوبة.

المساحة تحت منحنى التوزيع الطبيعي المعياري.



( قيم Z ) ( قيم Z )  
< نستخدم القيم <  
الإحصائية لقيم الإحصائية لقيم  
Z Z

[ داخل جسم الجدول هي عبارة عن المساحات التي تقع على يسار قيمة معيات معينة ]  
أمثلة على المساحة التي تقع على يسار قيم معيارية مختلفة:

القيمة المعيارية Z  
المقابلة لقيمة X

Z 3.4	= 1
Z 0.52	= 0.6982
Z 3.48	= 0.0003
Z 0.11	0.4562

هي عبارة عن المساحات على يسار  
قيمة معيارية معينة

)"

## المحاضرة التاسعة - الاسبوع الخامس

### الفصل الثالث : التوزيعات الاحتمالية المتصلة

↓

متغير عشوائي ينتمي للتوزيع الطبيعي الذي  
معدلة  $M$  و تباينه  $\sigma^2$ .

↓

قيم معيارية مثاليه للمتغير العشوائي  $X$   
حيث تنتمي الى التوزيع الطبيعي المعياري  
الذي وسطه صفر وتباينه 1.

• هناك تحويل بين قيم المتغيرات العشوائية  $X$  الى قيم معيارية مقابلة لها تعطى بالصيغة :

$$Z = \frac{X - H}{\sigma}$$

مثال : اذا كان لدينا  $Z: N(0,1)$  ، اوجد مايلي :

(١)  $P(Z < 1)$

(٢)  $P(Z < -1.96)$

(٣)  $P(Z > 2.57)$

(٤)  $P(-1.23 < Z < -0.68)$


الحل :

(١)  $P(Z < 1)$  مباشرة من الجداول

$= 0.5413$

(٢)  $P(Z < -1.96)$  مباشرة من الجداول


$= 0.0250$



$Z = -1.96$   $Z$


$P(Z < -1.96) =$

(٣)  $P(Z > 2.57) = 1 - P(Z < 2.57)$



$$P(-1.23 < Z < -0.68) \quad (٤)$$

من الجداول الاحصائية



مثال : اذا كان  $X:N(65, 36)$  اوجد :


$$P(X > 55) \quad (١)$$

$$P(X < 68) \quad (٢)$$

$$P(50 < X < 70) \quad (٣)$$

الحل : لابد من عملية تحويل المتغير العشوائي الذي يتبع التوزيع الطبيعي الى قيمة معيارية Z لإيجاد المساحات .

$$Z = \frac{X-M}{\sigma} = \frac{55-65}{6} = \frac{-10}{6} = -1.67 \quad (١)$$



$$P(X < 68) = P(Z < 0.5) \quad (٢)$$

$$P(50 < X < 70) = P(-2.5 < Z < +0.83) \quad (3)$$

$Z_1 =$

$Z_2 =$

• تطبيقات على التوزيع الطبيعي :  
في هذا البند سنقوم بإعطاء بعض الامثلة كتطبيقات على استعمال التوزيع الطبيعي .

مثال : تخضع اوزان عبوات احدى انواع الحلويات لتوزيع طبيعي وسطه 85 غم وانحرافه المعياري 25 غم  
(أ) ما هو احتمال ان وزن احدى العبوات التي اخذت بشكل عشوائي تزيد على 90 غم ؟  
(ب) ما هو احتمال ان وزن احد العبوات والتي اخذت بشكل عشوائي تقل عن 82 غم ؟

الحل :

نفرض ان وزن العبوات =  $X$  ،

$$X:N(85, 2.5^2)$$

المطلوب :

$$P(X > 90) \quad (أ)$$

$$P(X < 82) \quad (ب)$$

الحل : لابد من القيام بعملية تحويل قيم  $X$  الى قيم  $Z$  المعيارية المقابلة لها .

$$Z = \frac{90-85}{2.5} = \frac{5}{2.5} = 2 \quad (أ)$$

$$P(X < 82) = P(Z < -1.2) \quad (ب)$$

$$Z = \frac{82-85}{2.5} = \frac{-3}{2.5} = -1.2 = \text{مباشرة من الجدول}$$

مثال : تخضع تكاليف الولادة الطبيعية في المستشفيات في ما لتوزيع طبيعي وسطه 115 دولار و تباين 49 دولار .  
ما احتمال ان تكوين تكاليف احدى الولادات الطبيعية ما بين 104 ، 122 دولار ؟

$$X:N(115, 49) \quad \text{الحل :}$$

$$\text{المطلوب : } P(104 < X < 122) ?$$

## المحاضرة العاشرة – الأسبوع السادس

### الفصل الثالث : التوزيعات الاحتمالية المتصلة

#### ١٢ توزيع t :

ان احد التوزيعات الاحتمالية المتصلة الهامة لمتغير عشوائي متصل هو توزيع t .


تعريف : اذا كان توزيع الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي t

معطى بالمعادلة :

فان هذا التوزيع يسمى توزيع t حيث  $v$  درجات الحرية و  $c$  ثابت يعتمد على  $v$  ليجعل المساحة تحت المنحنى تساوي 1 .

#### خواص منحنى توزيع t :

- 1- يشبه منحنى توزيع t شكل الجرس ، وهو احادي المنوال له قيمة تقابل  $t=0$  ، بحيث يتماثل منحنى الشكل حول العمود المقام على t .
- 2- شكله يشبه شكل التوزيع الطبيعي المعياري إلا انه اكثر انخفاضاً منه ، بالاضافة الى ان تقارب طرفيه من الصفر عندما  $t \rightarrow -\infty, t \rightarrow \infty$  ابطأ من تقارب منحنى التوزيع الطبيعي المعياري و الشكل التالي يوضح منحنى التوزيع الطبيعي مع منحنى توزيع t :



ملاحظة : يعتمد منحنى توزيع t على معلمة هامة تحدد شكل ذلك المنحنى وهي درجات الحرية فعندما تزداد درجات الحرية يقترب منحنى توزيع t من التوزيع الطبيعي المعياري .

#### • حساب الاحتمالات تحت توزيع t :

تحسب الاحتمالات تحت توزيع t من خلال حساب المساحات المختلفة التي تقع على يسار قيم t بدرجات حرية مختلفة ، ويوجد جداول خاصة لهذه المساحات ويكون استعمال هذه الجداول كالتالي :

- 1- تسجل درجات الحرية  $v$  في العمود الايسر ، وعلى الخط الأفقي تسجل مساحات معينة
- 2- ان جدول t يعطي قيم  $t [v; \sqrt{v}]$  القريبة من 1 ، لهذا عندما تكون  $\sqrt{v}$  صغيرة مثل 0.05 ، 0.01 ، وغيرها ، فأنتنا نستعمل القاعدة  $t [v; \sqrt{v}] = -t [1 - \sqrt{v}; v]$  وذلك بسبب تماثل توزيع t حول العمود المقام على الصفر .

مثال : المتغير العشوائي t يتبع لتوزيع t بدرجات حرية 4 ، اوجد

(١) المساحة الواقعة على يسار 1.532 ؟

(٢) ما هي قيمة t التي يقع الى يسارها المساحة 0.01 ؟

(٣) قيمة  $\sqrt{v}$  بحيث  $t [v; \sqrt{v}] = -2.776$  ؟

الحل :



$$t[\sqrt{v}; 4] = 1.531 \quad (١)$$

من جدول توزيع مباشرة

$$\sqrt{v} = 0.90$$

$$t[0.01; 4] = ?? \quad (٢)$$

$$= -3.747$$

$$t[\sqrt{v}; 4] = -2.776 \quad (٣)$$

من الجدول مباشرة ، نجد ان قيمة المساحة التي تحقق الشرط

$$\sqrt{v} = 0.975$$

وبسبب وجود اشارة السالب ، لابد ان اخذ المتمة من العدد 1 ، وبذلك فان قيمة  $\sqrt{v}$  التي تحقق الشرط


هي :-

١٣ توزيع كاي تربيع :

تعريف : اذا كان توزيع الكثافة الاحتمالي للمتغير العشوائي  $\chi^2$  معطى بالمعادلة :

فان هذا التوزيع يسمى توزيع كاي تربيع بدرجات حرية  $v$  حيث تعتمد  $c$  على  $v$  وتحدد تكون المساحة تحت المنحنى تساوي

. 1



لإيجاد المساحات تحت منحنى كاي تربيع أو إيجاد القيم التي تقع الى يسارها او الى يمينها مساحة معينة ، سنستخدم جدول كاي تربيع حيث يسجل عدد درجات الحرية في العمود الأيسر ، وتسجل المساحات التي تقع تاى يسار قيمة  $\chi^2$  على الخط الافقي وتسجل قيم  $\chi^2$  داخل جسم الجدول .

مثال : اذا كان المتغير العشوائي  $\chi^2$  يخضع لتوزيع كاي تربيع على درجات حرية 10 ، اوجد :-

(أ) قيمة  $\chi^2$  التي يكون على يسارها 0.99 من المساحة .

(ب) قيمة  $\chi^2$  التي يكون الى يمينها 0.01 من المساحة .

(ت) قيمة  $\chi^2$  التي يكون الى يسارها 0.975 و القيمة التي يكون الى يسارها 0.025 من المساحة ؟


الحل :

ملاحظة : نعبر عن قيمة المتغير العشوائي  $\chi^2$  التي يقع على يسارها المساحة  $\sqrt{v}$  بدرجة حرية  $v$  تحت منحنى توزيع  $\chi^2$  بالرمز .



$$\chi^2 [0.99 ; 10] = ?? \quad (أ)$$

$$\chi^2 = 23.209 \quad \text{من الجدول مباشرة :}$$

(ب) قيمة  $\chi^2$  التي يكون الى يمينها 0.01 من المساحة  
 لاحظوا ان المساحة التي تقع على يمين  $\sqrt{= 0.01}$  هي المساحة التي تقع على يسار  $\sqrt{= 0.99}$  ،  
 وبذلك فان قيمة  $\chi^2 = 23.209$



(ت) المساحة اليمين  $\chi^2[0.025 ; 10] = \chi^2[0.975 ; 10]$  المساحة من اليسار




### تمرين :

اذا كان المتغير العشوائي  $\chi^2$  يخضع لتوزيع كاي بدرجة حرية  $v = 15$  اوجد :

(١) قيمة  $\chi^2$  التي تقع 0.99 من المساحة على يسارها ؟

(٢) قيمة  $\chi^2$  التي تقع 0.01 من المساحة على يمينها ؟



**4- توزيع F: (The F-Distribution)**


يعتبر توزيع F من التوزيعات الاحتمالية الهامة والتي تستعمل في اختبار الفرضيات ( ) .

**تعريف:** إذا كان توزيع الكثافة الاحتمالية للمتغير العشوائي F

$$f(F) = \frac{cF^{(v_1-2)/2}}{(v_2+v_1F)^{(v_1+v_2)/2}}, F > 0$$

فإن هذا التوزيع يسمى توزيع F ويعبر عنه بالرمز  $F(V_1, V_2)$  حيث  $V_2, V_1$  هي درجات الحرية و C هي ثابت يعتمد على  $V_2, V_1$  ويعين بحيث تصبح المساحة أسفل منحنى التوزيع تساوي 1.

يوجد لدينا في هذا التوزيع عدوان من الدرجة الحرية، وبما أن  $V_2$  يظهر في المقام فقط فإنه يعتبر درجات الحرية، ويعتبر  $V_1$  درجات حرية البسط ويظهر  $V_2, V_1$  في  $F(V_2, V_1)$ .



**خواص منحنى توزيع F:** منحنى توزيع F المنوال ملتو قليلاً إلى اليمين، وكلما زادت درجات الحرية  $V_2, V_1$  يقترب منحنى توزيع F التوزيع الطبيعي وهو موجب لجميع قيم F بين الصفر واللانهاية.

: ما يلي:

1-  $F(0.95 ; 9.7) \leftarrow (3.73 , 3.64)$

$F = 3.68 \leftarrow$

2-  $F(0.99 ; 9.7) \leftarrow (6.84 , 6.62)$

$F = 6.73 \leftarrow$

وفي حال إيجاد قيم F إذا كانت المساحة على يسارها وقيم غير موجودة في الجدول (بمعنى قيم صغيرة)

$$F(\lambda; V_1, V_2) = \frac{1}{F(1-\lambda; V_2, V_1)}$$

مثال: أوجد قيمة ما يلي:

$$1- F(0.05 ; 10 , 7) = \frac{1}{F(1-0.05; 7, 10)} = \frac{1}{F(0.95; 7, 10)} = \frac{1}{3.14}$$

$$2- F(0.01 ; 1 , 15) = \frac{1}{F(0.99; 15, 1)} = \frac{1}{\frac{6056+6209}{2}}$$

تمرين: أوجد المساحة إلى يسار  $F=3$   $V_2 = 20$   $V_1 = 7$

$\lambda$  بحيث  $F(\lambda; 5, 5)$

نهاية الباب الثالث..

**: توزيعات المعانية**

**إحصاءات العينة: "Sample Statistics"**

: يخضع المجتمع الذي تؤخذ منه العينة لتوزيع معين وهو توزيع المجتمع حيث تسعى بالتوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي يمثل كآنة

ينة فهو أي اقتران تتعين قيمة من العينة.

$$\frac{1}{x} = \frac{\sum_{i=0}^n x}{n}$$

هو إحصاء عينة . حيث نلاحظ أن قيمة تتغير من عينه لأخرى. فمثلاً إذا أخذت عينة حجمها n بحيث كان لدينا  $X_1, X_2, \dots, X_n$  فإن هذه العينة تحدد قيمة ما للوسط الحسابي، وإذا أخذت عينة عشوائية أخرى بتقسيم الحجم n فإن الوسط الحساب لهذا العينة ربما يتغير عن الوسط الحسابي للعينة الأولى وهكذا. وهذا يعني أن X فتتغير عشوائي تتغير قيمته بتغير العينة .

**تعريف (1):** (parameter) هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالوسط الحسابي للتوزيع أو الانحراف المعياري له.

**تعريف (2):** إحصاء العينة (Sample Statistic) هو أي متغير تتعين قيمته من جميع العينات ذا حجم معين مأخوذه من مجتمع ما.

وباختصار هو اقتران تتعين قيمته من العينة.

ومثال عليه: لوسط الحسابي للعينة X.

**تعريف (3):** يسمى التوزيع الاحتمالي لإحصاء العينة توزيع المعانية

## المحاضرة الثانية عشر (المباشرة الثانية)

توزيعات المعاينة :

توزيع المعاينة للوسط الحسابي  $\bar{X}$ :

نظرية (1):  $X$  يخضع للتوزيع وسطه (معدله)  $M$  وتباينه  $\sigma^2$   $\bar{X}$  يمثل الوسط الحسابي للعينة ذات الحجم  $n$  هذا المجتمع فان:

1- توزيع  $\bar{X}$  هو:  $M_{\bar{X}} = M$

2- تباين  $\bar{X}$  هو:  $\frac{\sigma^2}{n}$

شرطه أن السحب مع الإرجاع.

: سحبت عينة عشوائية من مجتمع لا نهائي معدله 70 وتباينه 40. إذا كان حجم العينة 10 :  
1- الوسط الحسابي للعينة.

2- تباين العينة.

3- الانحراف المعياري للعينة.

توزيع المعاينة للوسط الحسابي  $\bar{X}$  عند المعاينة من مجتمع طبيعي:

نظرية (2):  $X_1, X_2, \dots, X_n$  إن عينة عشوائية من مجتمع طبيعي وسطه (معدله)  $M$  وتباينه  $\sigma^2$  فإن توزيع  $\bar{X}$  يكون التوزيع الطبيعي

$$Z = \frac{\bar{X} - M}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

يخضع لتوزيع طبيعي معياري.

: تخضع علامات الطلاب في أحد المقررات لتوزيع طبيعي وسطه 65 وانحراف معياري 18. اخذت عينة عشوائية حجمها 36

:

1- احتمال أن يزيد وسط علامات العينة على 74

$$P(\bar{X} > 74) = P(Z > \frac{74 - 65}{18/\sqrt{36}}) = P(Z > 2)$$

$$= P(Z < 3)$$

$$= 1 - P(Z < 3)$$

$$= 1 - 0.9987$$

$$= 0.0013$$

2- احتمال أن يقل وسط علامات العينة على 60

$$P(\bar{X} < 60) = P(Z < \frac{60 - 65}{18/\sqrt{36}}) = P(Z < -1.67)$$

$$= P(Z < \frac{60 - 65}{18/\sqrt{36}})$$

$$= P(Z < -1.67)$$

$$= 0.475$$



### توزيعات المعاينة

نظرية (3): المعاينة من مجتمع طبيعي وسطه  $M$  وتباينه  $s^2$  غير معلوم.

إذا أخذت عينة عشوائية من توزيع طبيعي وسطه  $M$  وتباينه  $s^2$  غير معلوم بحيث كان  $\bar{M}$  (الوسط الحسابي للعينة) لعينة حجمها  $n$  وانحرافها

$$T = \frac{\bar{X} - M}{s/\sqrt{n}}$$

يخضع لتوزيع  $t$  بدرجات حرية  $v = n - 1$

إذا كانت أطوال الطلاب في أحد الصفوف المدرسية تتبع التوزيع الطبيعي المتوسط يساوي 160 سم، إذا سحبت عينة عشوائية من 4 طلاب فما احتمال أن يقل متوسطها الحسابي عن 166 سم، إذا علمت أن الانحراف المعياري للعينة يساوي 10

$$P(\bar{X} < 166) ?$$

$$T = \frac{\bar{X} - M}{s/\sqrt{n}} = \frac{166 - 160}{10/\sqrt{4}} = \frac{6}{5} = 1.2$$

$$P(t[4, 3] = 1.2) = 0.90$$

نظرية (4): توزيع المعاينة للفرق بين وسطي عينين  $(\bar{X} - \bar{Y})$ :

إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n_1$  من مجتمع طبيعي معدله  $M_1$  وتباينه  $s_1^2$ ، ثم أخذت عينة عشوائية أخرى حجمها  $n_2$  من مجتمع طبيعي معدله  $M_2$  وتباينه  $s_2^2$  بحيث كان مستقل عن المجتمع الأول، ورمزنا للوسط الحسابي للعينة الأولى بالرمز  $\bar{X}$  والوسط الحسابي للعينة الثانية  $\bar{Y}$

فإن توزيع الفرق وسطي العينة بين  $(\bar{X} - \bar{Y})$  يكون التوزيع الطبيعي ذا معدل  $(M_1 - M_2)$  والتباين  $\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}$  بحيث:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (M_1 - M_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري

مس: تخضع علامات الناجحين من امتحان الدراسة الثانوية العامة في إحدى المدارس ( ) لتوزيع طبيعي معدله 70 وانحرافه المعياري 12

وفي مدرسة ثانية ( ) تخضع العلامات للتوزيع الطبيعي معدله 74 ه المعياري 16، أخذت عينة عشوائية حجمها 16

(أ) وعينة عشوائية أخرى حجمها 9 ( )، على فرض أن الوسط الحسابي للعينة الأولى  $\bar{X}$ ، وللعينة الثانية  $\bar{Y}$  :

أ-  $P(\bar{Y} - \bar{X}) > 8$  احتمال الفرق بين وسطين عينين

ب-  $P(\bar{X} - \bar{Y}) < 3$

أ-

$$= 1 - P(z < 0.65)$$

$$= 1 - 0.7422$$

$$= 0.2578$$

$$P\left[\frac{Z = (\bar{Y} - \bar{X}) - (M_2 - M_1)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} < \frac{3 - (7 - 74)0}{\sqrt{\frac{(12)^2}{16} + \frac{(16)^2}{9}}}\right] \text{ ب-}$$

$$P\left(Z < \frac{3 - (-4)}{\sqrt{9 + 28.4}}\right) = P\left(Z < \frac{7}{\sqrt{37.4}}\right)$$

$$= P(Z < 1.14)$$

$$= 0.8729$$

تمرين ومسائل:

(1): إذا كان لدينا المتغير العشوائي  $X$  والذي يتبع التوزيع الطبيعي ذا المعدل 25 والتباين 36، أجب عن الأسئلة التالية:

1- أوجد القيمة المعيارية المقابلة للعدد  $X = 10$  ؟

2- أوجد القيمة المعيارية المقابلة للعدد  $\bar{X} = 10$  في حال كان لدينا عينة حجمها 16

3- وسط الحسابي للعينة إذا علمت أن  $n = 25$

4- أوجد التباين الحسابي للعينة إذا علمت أن  $n = 25$

5- أوجد الانحراف المعياري للعينة إذا علمت أن  $n = 16$

تمرين: إذا كان لدينا التوزيع الطبيعي  $X; N(10,25)$  والتوزيع الأخر  $Y; N(15,36)$ ، سحبت عينة من المجتمع الأول حجمها 16 عينة من المجتمع الأخر حجمها 25، أوجد احتمال الفرق بين  $(\bar{Y} - \bar{X})$  يقل عن العدد 3 :  $[P(\bar{Y} - \bar{X}) < 3]$  :



### التقدير Estimation :

: الاستنتاجات الاحصائية هي التعميمات والتوازن التي يمكن اتخاذها بناءً على معلومات او بيانات قمت بجمعها أو كانت متوفرة لديك.

فمثلاً إذا ارادت شركة أدوية أن تسوق دواء ما ، فإنه يجب عليها أن تحصل على تصريح أولاً ويتم ذلك من خلال اثبات أن الدواء المنتج قد جُرب واثبت جدوى استعماله، وهذا يعني ان عينة من المرضى قد استعملوا ذلك الدواء وحصلوا على نتائج ايجابية، وبذلك فإن الشركة بنت قرارها من خلال دراسة تلك العينة.

المثال السابق يوضح أنه من أهم فروع الاحصاء الاستنتاجي هو عمليتي التقاير واختبار الفرضيات. حيث حيث نقوم في الفصل الخامس بدراسة مفهوم التقدير على أن يتم دراسة اختبار الفرضيات في الفصل السادس لاحقاً إن شاء الله.

**مفهوم التقدير:** تتم عملية التقدير من خلال اختبار عينة عشوائية من مجتمع ما ومشاهدة مقررات تلك العينة ومن ثم حساب المقاييس المراد اجراءها وتعميم ذلك على المجتمع.

إن أي توزيع احتمالي يحتوى على معالم تحدد شكله على  $P$  ( )  $n$  ( )

توزيع بواسون فيعتمد شكله على معلمة (معدل النجاحات في فترة زمنية معينة)

ي التوزيع الطبيعي فيعتمد شكل ذلك التوزيع على  $M$  ( ) ( الانحراف المعياري – التباين  $S^2$  )

وعادة ما تكون هذه المعالم مجهولة، وفي هذه الحالة لا بد من تقدير هذه المعالم.

هناك طريقتان اساسيتان لتقدير معالم المجتمع المجهولة هما:

1- التقدير بنقطة. 2- التقدير بفترة.

### التقدير بنقطة:

يمكن ايجاد تقديرات للمعالم الخاصة بالمجتمع من خلال البيانات المأخوذة من عينة عشوائية وذلك بحساب ما يسمى بالإحصاءات، فمثلاً في المجتمع الطبيعي يستخدم متوسط العينة العشوائية  $\bar{X}$  كتقدير لمتوسط المجتمع  $M$  وكذلك الانحراف المعياري للعينة  $S$  يستخدم كتقدير للانحراف المعياري للمجتمع  $S$ .

في توزيع بواسون يستخدم الوسط الحسابي للعينة  $\bar{X}$  كتقدير لمعدل عدد النجاحات في تجربة بواسون  $\lambda$ ، ( $\bar{X} = \lambda$ )

أما في توزيع ذات الحدين فيستخدم الوسط الحسابي للعينة  $\bar{X}$  كتقدير لنسبة النجاح  $P$  ( $P = \bar{X}$ ) ... وهكذا

في هذه التقديرات بالتقدير النقطة حيث أنها قيمة وحيدة محسوبة من العينة.

**أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي  $(M, N)$  فكانت قيمها 6 4 7 3 5 ، أوجد تقديراً لمعدل المجتمع  $M$  وتقدير التباين  $S^2$  مع  $S$**

**الحسابي للمجتمع تقديراً ويساوي الوسط الحسابي للعينة).**  $M = \bar{X} - 1$

الوسط الحسابي للمجتمع تقديراً  $M=5$

$$S^2 = \frac{2}{X} - 2 \quad (\text{تباين المجتمع تقديراً يساوي تباين العينة}).$$

$$= \frac{(6-1)^2 + (4-5)^2 + (7-5)^2 + (3-5)^2 + (5-5)^2}{5}$$

$$= \frac{1+1+4+4}{4} = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$S = \sqrt{2.5} \quad (\text{تباين المجتمع تقديراً يساوي 2.5})$$

$$S = \sqrt{2.5} \quad (\text{الانحراف المعياري للمجتمع تقديراً يساوي 2.5})$$

: في توزيع بواسون، قَدِّر عدد النجاحات في فترة زمنية معينة ( ) بناءً على عينة عشوائية اعطت القيم التالية 7, 7, 7, 7

: عدد النجاحات في فترة زمنية معينة ( ) تقديراً = الوسط الحسابي للعينة.

(أي ذات احدين  $(I, P)$  ) ، أوجد التقدير النقطة للمعلمة

تمرين: إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n=5$   $\sum_{i=1}^5 xi = 30$

## التقدير :

### ثانياً: التقدير بفترة (Interred Estimation):

من الصعب جداً الحصول على تقدير لمعلمة مجتمع ما دون الوقوع في الخطأ مهما كان هذا التقدير جيداً، ولذلك فإنه من المرغوب فيه فترة معينة نتوقع أن تقع معلمة المجتمع بداخلها. إن مثل هذا النوع من التقديرات يسمى تقدير بفترة أو فترة ثقة ومع أن دقة التقدير تزداد بزيادة حجم العينة فإنه ليس هناك سبب يبرر إمكانية الحصول على تقدير يحدد معلمة المجتمع بدون خطأ. هذا البنت على ايج  $\mu$  ( ) ، وفترات الثقة للتباين  $\sigma^2$  .

#### 1- إيجاد فترات الوسط الحسابي $\mu$ :

نظرية (1): أخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من مجتمع طبيعي  $N(\mu, \sigma^2)$  بحيث كانت  $\sigma^2$  س  $100(1-x) \%$

$$\mu \text{ هي: } (\bar{X} - Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

حيث  $\bar{X}$ : الوسط الحسابي للعينة،  $Z_{1-x/2}$ : هي القيمة على محور  $Z$  والتي تقع على يسارها مساحة  $1-x/2$  فترات تفسير الثقة:

القوية التي تعطي معلومات عن المعلمة المجهولة مثل ( $\mu$ ) باستعمال أسلوب العينة. وسيكون لدينا عدة

أنواع دقة فترات الثقة منها 90% 95% 98% وهذا ما نقصده بالرمز  $100(1-x) \%$  حيث أن البقية لها نفس السلوك.

1- مثل دراسة العينة وتسجيل المشاهدات وإيجاد قيمة الوسط الحسابي فإن

$$(\bar{X} - Z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

هي فترة نهايتها متغيران عشوائيان تحاول احتواء المجهولة  $\mu$ .

#### 2- أن تفسير الاحتمال

$$(\bar{X} - Z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 95\%$$

أن التكرار النسبي لمحاولات المعاينة الكثيرة المتكررة يحدد أن 95%  $\mu$  5% منها لا تحويها.

( ) 100 عينة عشوائية ذات الحجم  $n$  ونحسب فترة الثقة لها ، فإننا نتوقع بنسبة 95% (95)

$\mu$  ( )

عينة عشوائية حجمها  $n=25$  ، أخذت من مجتمع طبيعي انحرافه المعياري  $\sigma = 4$  :  $\bar{X} = 60$

$\mu$  98%

قبل البدء بتطبيق نص النظرية يجب أن نقوم بعملية التحويل

$$1 - X = 98\% \rightarrow 1 - X/2 = ??$$

$$1 - X = 2\%$$

$$X/2 = 1\%$$

$$1 - X/2 = 99\%$$

ويتعويض القيم المعد في السؤال نحصل

$$(\bar{X} - Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

$$(60 - Z_{0.99} \frac{4}{\sqrt{25}}, 60 + Z_{0.99} \frac{4}{\sqrt{25}})$$

$$(58.14, 61.86)$$

يمكن تطبيق النظرية السابقة من حال كان السحب من مجتمع غير طبيعي وذلك من خلال استخدام نظرية التقارب بشرط ان

حجم العينة ( $n$ ) سيكون كبيراً ( $n \geq 30$ ) وبذلك سنتعرف على النظرية رقم (2).

نظرية (2): إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من مجتمع وسطه  $\mu$  وتباينه  $\sigma^2$  بحيث كانت  $\sigma^2$  س  $100(1-X) \%$

$$\mu \text{ هي تقريباً: } (\bar{X} - Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{1-x/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

$\mu$

%98

52

: عينة عشوائية حجمها 100 من مجتمع تباينه 25 أعطيت

: المعطيات  $\bar{X}=52$   $25=^2$   $n=100$

$$1-X = 98\% \rightarrow 1-X/2 = 99\%$$

وبتطبيق النظرية (2) نحصل تقريباً على:

$$(52 - Z_{0.99} \times \frac{5}{10}, 52 + Z_{0.99} \times \frac{5}{10})$$

$$(52 - 2.33 \times \frac{1}{2}, 52 + 2.33 \times \frac{1}{2})$$

$$(50.84, 53.16)$$

$\mu$

تمرين: اعتماد على المثال الأخير، أوجد فترة %95

$\mu$

%90

الم  
الف

: التقدير

$\mu$  هي:

نظرية (3): إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من مجتمع طبيعي تباين غير معلوم فإن فترة  $100(1-x)\%$  التقدير  
 $(\bar{X} - t [1 - \frac{x}{2}, n - 1] \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t [1 - \frac{x}{2}, n - 1] \frac{s}{\sqrt{n}})$   
حيث  $S$ : الانحراف المعياري للعينة.

$\mu$

95%

أخذت عينة عشوائية حجمها 15 من مجتمع طبيعي فأعطت  $S = 2.1, \bar{X} = 17.4$ .

نقوم بعملية التحويل  $1 - X = 95\%$

$$X = 5\%$$

$$x/2 = 2.5\%$$

$$1 - X/2 = 97.5\% = 0.965$$

$$(17.4 - 2.145 \times \frac{2.1}{\sqrt{15}}, 17.4 + 2.145 \times \frac{2.1}{\sqrt{15}})$$

95%

فترة ث (16.24, 18.56)

بإمكاننا استخدام الأسلوب السابق في بناء فترات الثقة للوسط الحسابي لأكثر من مجتمع وذلك بالاستعانة بالنظرية التالية:  
نظرية (4): فترات الثقة للفرق بين وسطين

عينة عشوائية أخرى من مجتمع  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$

$N(\mu_1, \sigma_1^2)$  طبيعي  $X_1, X_2, \dots, X_n$  عينة عشوائية من مجتمع طبيعي

طبيعي  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$  مستقل عن الأول، بحيث كانت  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  معلومتين فإن هذه الثقة  $100(1 - X)\%$  للفرق بين الوسطين  $(M_1, M_2)$  هي:

$$[(\bar{X} - \bar{Y}) Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\bar{X} - \bar{Y}) Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}]$$

أخذت عينة عشوائية حجمها 9 من مجتمع طبيعي  $N(M_1, 25)$  ثم أخذت عينة عشوائية حجمها 10 من مجتمع طبيعي  $N(M_2, 40)$  مستقل عن الأول، فإذا أعطيت العينة الأولى وسطاً حسابياً = 32، بينما أعطيت العينة الثانية وسطاً حسابياً = 47:

95% للفرق بين الوسطين  $(M_1 - M_2)$

90% للفرق بين الوسطين  $(M_2 - M_1)$

: المعطيات:

$\bar{Y} = 47$	$\bar{X} = 32$
$\frac{\sigma_2^2}{n_2} = 4$	$\frac{\sigma_1^2}{n_1} = 2.78$
$\bar{Y} = 74$	$\bar{X} = 32$

$M_1 - M_2$  95% - ...

$$1 - X = 95\% \rightarrow 1 - X/2 = 97\%$$

وبتطبيق نص النظرية نجد أن:

$$[(32 - 47) - Z_{0.975} \times \sqrt{\frac{25}{9} + \frac{40}{10}}, (32 - 47) + Z_{0.975} \sqrt{\frac{25}{9} + \frac{40}{10}}]$$

$$(-15 - 1.96 \times \sqrt{\frac{25}{4} + 4}, -15 - 1.96 \times \sqrt{\frac{25}{4} + 4})$$

$$(-20.1, -9.9)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} = 32 - 47$$

$$= -15$$

90% للفرق بين  $M_1 - M_2$

$$1 - X = 90\% \rightarrow 1 - X/2 = 95\%$$

وبتطبيق نص النظرية نجد أن:

$$[(74 - 32) - Z_{0.95} \times \sqrt{\frac{25}{9} + \frac{40}{10}}, (47 - 32) + Z_{0.95} \sqrt{\frac{25}{9} + \frac{40}{10}}]$$

$$(15 - 1.64 \times \sqrt{\frac{25}{4} + 4}, 15 + 1.64 \times \sqrt{\frac{25}{4} + 4})$$

$$(10.73, 19.27)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} = 15$$

وبتطبيق نص النظرية نجد أن:

$$(0.15 - Z_{0.975} \times \sqrt{\frac{0.15(0.85)}{100}}, 0.15 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.15(0.85)}{100}})$$

$$(0.08, 0.22)$$

نظرية (6): كانت  $X_1, X_2, \dots, X_n$  عينة عشوائية من مجتمع برنولي  $b(1, P_2)$  وكانت  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  عينة عشوائية أخرى عن الأولى ، مجتمع برنولي  $b(1, P_1)$  ، فإن فترة ثقة  $100(1 - X)\%$  للفرق بين النسبتين  $(P_1 - P_2)$  هي:

$$[(\bar{P}_1 - \bar{P}_2) - Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\bar{P}_1(1-\bar{P}_1)}{n_1} + \frac{\bar{P}_2(1-\bar{P}_2)}{n_2}}, (\bar{P}_1 - \bar{P}_2) + Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\bar{P}_1(1-\bar{P}_1)}{n_1} + \frac{\bar{P}_2(1-\bar{P}_2)}{n_2}}]$$

2- تقدير النسبة:

إن تقدير النسبة بفترة هو عبارة عن إيجاد تقدير نقطي لنسبة النجاح في المجتمع P إيجاد توزيع المعاينة لذلك المقدر واستعمال هذه المعلومات لإيجاد فترة ثقة ذات معامل ثقة معينة تحصر نسبة النجاح P بداخلها والنظرية التالية توضح ذلك.

نظرية (5): إن  $\bar{P} = X/n$  نسبة النجاح في عينة عشوائية حجمها n كبيراً ، فإن فترة  $100(1 - X)\%$  ثقة التقريبية لنسبة النجاح P هي:

$$(\bar{P} - Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}, (\bar{P} + Z_{1-X/2} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}})$$

لإيجاد فترة 95% ثقة لنسبة عدد طلاب أحد المدارس الأساسية الذين لديهم ضعف في البصر، أخذت عينة عشوائية حجمها 100 ووجد أن من لديهم ضعف في البصر كان 15 .

$$1 - X = 95\% \rightarrow 1 - X/2 = 97.5\%$$

وأيضاً يجب إيجاد  $\bar{P}$ : (التقدير النقطي لنسبة النجاح)

$$\bar{P} = \frac{15}{100} = 0.15$$

ال: أخذت عينة عشوائية حجمها 100 ( )  
27 طالبة لديهم تسوس في الأسنان ، ثم أخذت عينة عشوائية ( )  
21 طالباً لديهم تسوس في الأسنان. ( )  
95% ثقة للفرق بين  $(P_2, P_1)$

$$(P_1, P_2) 1 - X = 95\% \rightarrow 1 - X/2 = 97.5\%$$

$\bar{P}_1 = \frac{27}{100} = 0.27$	$\bar{P}_2 = \frac{12}{80} = 0.15$
-------------------------------------	------------------------------------

حسب النظرية السابقة نجد أن:

$$[(0.27 - 0.15) - Z_{0.975} \times \sqrt{\frac{0.27(0.83)}{100} + \frac{0.15(0.85)}{80}}, (0.27 - 0.15) + Z_{0.975} \times \sqrt{\frac{0.27(0.83)}{100} + \frac{0.15(0.85)}{80}}]$$

(0.003, 0.237)

$$\bar{P}_1 - \bar{P}_2 = 0.27 - 0.15 = 0.12$$

( )

التقدير :

فترات الثقة للتباين.

نظرية (7): إذا كانت  $X_1, X_2, \dots, X_n$  عينة عشوائية من توزيع طبيعي  $N(M, \sigma^2)$  ثقة للتباين  $S^2$  هي:

$$\left( \frac{(n-1)S^2}{\chi^2 [1-\alpha/2; n-1]}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2 [\alpha/2; n-1]} \right)$$

حيث  $S^2$  هو تباين العينة ..  $n$ : حجم العينة

ولإيجاد فترة الثقة للانحراف المعياري ، نأخذ الجذر التربيعي لطرفي فترة الثقة للتباين.

عينة عشوائية حجمها 20 أخذت من مجتمع طبيعي  $N(M, \sigma^2)$  فأعطت التباين  $S^2 = 15$  ثقة للتباين  $S^2$  هي:

$$1 - \alpha = 90\%$$

$$\alpha = 10\%$$

$$\alpha/2 = 5\% = 0.05$$

$$1 - \alpha/2 = 1 - 0.05 = 0.95$$

من جدول توزيع كاي تربيع نجد أن:

$$\chi^2 [0.05, 19] =$$

$$\chi^2 [0.95, 19] =$$

وحسب النظرية السابقة ، فإن فترة الثقة هي:

$$\left[ \frac{19 \times 15}{30.144}, \frac{19 \times 15}{10.117} \right]$$

أما فترة 90% ثقة الانحراف المعياري فهي

$$[\sqrt{9.45}, \sqrt{28.17}]$$

$$= [3.07, 5.31]$$

فترات الثقة للنسبة بين تباينين.

نظرية (8): إذا كانت  $X_1, X_2, \dots, X_n$  عينة عشوائية من  $N(M, \sigma_1^2)$  و  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  عينة عشوائية من  $N(M, \sigma_2^2)$

الأول ، فإن فترة  $100(1 - \alpha)\%$  ثقة النسبة  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$  هي:

$$\left( \frac{S_2^2}{S_1^2} F [\alpha/2; n_1 - 1, n_2 - 1], \frac{S_2^2}{S_1^2} F [1 - \alpha/2; n_1 - 1, n_2 - 1] \right)$$

أخذت عينة عشوائية حجمها  $n_1 = 9$  من  $N(M_1, \sigma_1^2)$  والتباين  $S_1^2 = 65.4$  وأخذت عينة عشوائية أخرى حجمها

عينة  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$

$n_2 = 11$  من مجتمع طبيعي  $N(M_1, \sigma_1^2)$  مستقل عن الأول فأعطت التباين  $S_2^2 = 127.3$  . أوجد قيمة الفترة 90% .

$$1 - \alpha = 90\% :$$

$$\alpha = 10\%$$

$$\alpha/2 = 5\% = 0.05$$

$$1 - \alpha/2 = 1 - 0.05 = 0.95$$

من جدول توزيع F

$$F [0.05; 8, 10] = \frac{1}{F [0.95; 10, 8]}$$

$$= \frac{1}{3.35} = 0.3$$

$$F [0.95; 8, 10] = 3.07$$

ومن صيغة القانون للنظرية السابقة نجد أن:

$$\left[ \frac{127.3}{65.4} \times 0.3, \frac{127.3}{65.4} \times 3.07 \right]$$

$$[0.583, 5.98]$$

1- أخذت عينة عشوائية حجمها 400 من معلمي المرحلة الإعدادية فوجد أن 80 منهم حاصلون على شهادة البكالوريوس:

- قدر نسبة المعلمين في المرحلة الإعدادية الحاصلين على شهادة البكالوريوس.

- 99% ثقة للنسبة الحقيقية للمعلمين في هذه المرحلة الحاصلين على شهادة البكالوريوس؟

: نقدر نسبة المعلمين لهذه المرحلة كما يلي:

$$0.2 = \frac{80}{400} = \text{سبة}$$

( ' ' أم .  $\bar{P} = \frac{X}{n}$  ) . التقدير النقطي لنسبة النجاح P هي  $\bar{P}$

ب- من خلال استخدام النظرية رقم (5) نجد أن :

$$\left( 0.2 - Z_{0.995} \sqrt{\frac{0.2(1-0.2)}{400}}, 0.2 + Z_{0.995} \sqrt{\frac{0.2(1-0.2)}{400}} \right)$$

$$(0.2 - 2.58 \times 0.02, 0.2 + 2.58 \times 0.02)$$

$$(0.148, 0.252)$$

- 2 - نتج احد المصانع مصابيح كهربائية تخضع أعمارها تقريبا لتوزيع طبيعي انحرافه المعياري 35 . أخذت عينه عشوائية حجمها 25 مصباحا فكان الوسط الحسابي لأعمار هذه المصابيح 890 .  
98% ثقة لمعدل أعمار المصابيح !

:

$$890 = \bar{x}, n=25, s=35$$

من نظرية رقم 1, نلاحظ :

$$\left( \bar{X} + Z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + Z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left( 890 - Z_{0.99} \times \frac{35}{\sqrt{25}}, 890 + Z_{0.99} \times \frac{35}{\sqrt{25}} \right)$$

$$(890 - 2.33 \times 7, 890 + 2.33 \times 7)$$

$$(890 - 16.31, 890 + 16.31)$$

$$(873.69, 956.31)$$

- 3- , اذا كان تباين المجتمع غير وكان الانحراف المعياري يساوي 17 للعينة .  
98% ثقة لمعدل أعمار المصابيح !

: نلاحظ ان جميع المعطيات شبيهه بالمثال السابق باستثناء ان الانحراف المعياري قد اصبح معطى للعينة وليس لمجتمع حجم العينة وفي هذه الحالة فإننا بدلا من ان نستخدم جداول التوزيع الطبيعي المعياري , فإننا في هذه الحالة نستخدم جداول توزيع t وبالتالي يصبح الحل على

صو :

من نظرية رقم (3) :

$$\left( \bar{X} - t [1 - \alpha/2, n-1] \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t [1 - \alpha/2, n-1] \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left( 890 - t [0.99, 16] \times \frac{35}{\sqrt{16}}, 890 + t [0.99, 16] \times \frac{35}{\sqrt{16}} \right)$$

$$\left( 890 - 2.602 \times \frac{35}{4}, 890 + 2.602 \times \frac{35}{4} \right)$$

$$(890 - 22.77, 890 + 22.77)$$

:

عند ايجاد فترات التقدير للوسط الحسابي للمجتمع M :

- 1- اذا كان السحب من مجتمع طبيعي تباينه معلوم فإننا نستخدم جداول التوزيع الطبيعي المعياري .
- 2- اذا كان السحب من مجتمع ما تباينه معلوم فإننا نستخدم ايضا جداول التوزيع الطبيعي المعياري بشرط  $n > 30$
- 3- اذا كان السحب من مجتمع تباينه غير معلوم فإننا نستخدم جداول توزيع t
- 4- في حال السؤال عن التقدير للنسبة سواء لمجتمع واحد او مجتمعين فإننا نستخدم جداول التوزيع الطبيعي
- 5- في حال السؤال عن التقدير للتباين :

- , فإننا نستخدم توزيع كاي تربيع

- اذا كان السؤال عن النسبه بين تباين مجتمعين فإننا نستخدم توزيع F

## المحاضرة ١٨ - من الاسبوع الحادي عشر

### الفصل السادس : اختبار الفرضيات

مقدمة :

تصادفنا العديد من المشاكل في حياتنا اليومية و يجب اخذ قرار ملائم بشأن تلك المشاكل ، وبما ان اغلب الدراسات هي مستمدة من العينة المسحوبة من المجتمع ، نبعث التقدير للمعلم المختلفة لذلك المجتمع فانه علينا ان نعطيها المزيد من الثقة ، لذا لا بد من اتخاذ قرار حول صحة فرضية معينة او عدم صحتها . وتسمى هذه الطريقة باختبار الفرضيات ولاتخاذ القرار الاحصائي يجب النظر الى الفروض الاحصائية اولاً وبناءً عليه لا بد من توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بها كالآتي :

#### • الفرضية الاحصائية :

**تعريف :** الفرضية الاحصائية هي كل عبارة عن احدى معالم المجتمع او عدة معالم تكون قابلة للاختبار و بالتالي تكون صحتها او عدم صحتها بحاجة الى قرار . وبصورة عامة تتعلق الفرضيات الاحصائية بعبارة عن احدى معالم المجتمع مثل الوسط الحسابي او نسبة النجاح او التباين او غيرها ، او عدة معالم مثل المقارنة بين معلمين او اكثر .

**في الغالب هناك عنوان من الفرضيات الاحصائية في المسألة الواحدة :**

- 1- **الفرضية الصفرية ( الابتدائية ) :** وهي الفرضية التي تبني على امل ان يتخذ قرار بعدم صحتها ، ونصطلح من الآن على اعتبار أي فرضية نود اختبارها بالفرضية الصفرية ويتم التعبير عنها بالرمز  $H_0$  .
- 2- **الفرضية البديله :** وهي الفرضية البديله للفرضية الصفرية في حال عملية الرفض للفرضية الصفرية يتم قبول الفرضية البديله و يرمز لها بالرمز  $H_1$  .

**مثال :** يدعي احد المصانع في فترة المواصفات للمصابيح الكهربائية التي ينتجها ان معدل عمر المصابيح هو 500 ساعة للمصباح الواحد . اردت اختبار هذا الادعاء ، اكتب الفرضية الصفرية و الفرضية البديله ؟  
**الحل :** نرفض ان معدل عمر المصابيح التي ينتجها ذلك المصنع بالرمز  $H$   
اذن تصبح الفرضية الصفرية على الصورة :

اما الفرضية البديله فتعتمد على الحالة المتوقعة التي تريد اجراء الاختبار من اجلها . فمثلاً اذا كنت تريد اختبار  $H_0$  بغرض الشراء من ذلك المصنع فأنا نصوصغ الفرضية البديله على الشكل :

( لاحظ ان الفرضية البديله لم يعين قيمة محددة للوسط الحسابي  $M$  ، بل سمحت بفترة من القيم جميعها اكبر من العدد 500 ) .

#### الاطء الناتجة عن عملية صياغة الفرضيات :

كل قرار يبني على ناتج عينة ما يكون معرضاً للخطأ ، نعتمد صياغة الفرضية فان طريقة اتخاذ القرار قد تؤدي الى الوقوع في نوعين من الأخطاء هي :

- 1- **الخطأ من النوع الاول :** حيث يحدث هذا النوع في حال تم رفض الفرضية الصفرية وهي في الواقع صحيحة ، ويعبر عنه بالرمز  $\alpha$
  - 2- **الخطأ من النوع الثاني :** ويحدث هذا النوع في حال عدم رفض الفرضية الصفرية وهي في الواقع خاطئة ، ويعبر عن هذا الخطأ بالرمز  $\beta$
- و الجدول التالي يوضح ذلك :

الحالة الحقيقية		
	صحيحة	خطأ من النوع الثاني $\beta$
عدم رفض $H_0$	قرار صائب	خطأ من النوع الاول $\alpha$
رفض $H_0$	خطأ من النوع الاول $\alpha$	قرار صائب

وفي هذا الباب ، سيتم التعامل مع النوع الأول فقط من الاخطاء (  $\alpha$  ) حيث سيتم تسميته بمستوى الدلالة .



## خطوات اختبار الفرضيات :

الخطوى الأولى : تحديد توزيع المجتمع .

يجب أولاً معرفة فيما اذا كان المتغير العشوائي يتوزع توزيعاً طبيعياً ، او يتبع توزيع ذو الحدين او غيره من التوزيعات الاخرى حيث تعتبر هذه نقطة مهمة في عملية اتخاذ القرار الملائم . وبما ان معظم التوزيعات تقترب من التوزيع الطبيعي و خاصة اذا كانت العينات كبيرة فلذلك سنستند في اختبار الفرضيات على التوزيعات الطبيعية في الغالب .

الخطوة الثانية : صياغة الفرضيات .

يتم صياغة الفرضيات الصفرية  $H_0$  و المراد اختبارها والتي تعتمد على تحديد قيمة المعلمة للمجتمع بحيث تكون على الشكل التالي :

حيث  $M_0$  تمثل قيمة معينه لهذا المتوسط

اما الفرضية البديله ، فتأتي على احد الاشكال التالية :

$$H_1: M \neq M_0 \quad (أ)$$

حيث يسمى هذا الاختبار بالاختبار من طرفين .

$$H_1: M > M_0 \quad (ب)$$

ويسمى اختبار من جهة اليمين .


$$H_1: M < M_0 \quad (ت)$$

ويسمى اختبار من جهة اليسار .


الخطوة الثالثة : اختبار مستوى الدلالة  $\alpha$  .

يتم من خلال هذه الخطوة تحديد قيمة  $\alpha$  والتي من خلال سيتم تحديد منطقة القبول ومنطقة الرفض للثلاث الحالات التي تم ذكرها ( الفرضية البديله ) والاشكال التالية توضح ذلك :

اولاً : اختبار الفرضيات من جهتين .



ثانياً : اختبار الفرضيات من الطرف الأيمن :



ثالثاً : اختبار الفرضيات من الطرف الايسر :



**الخطوة الرابعة :** احصاء الاختبار ( دالة الاختبار ) .

وهي الاحصاء المحسوب قيمته من العينة حيث يتم مقارنة هذا الاحصاء الذي تم جمعه من عينه مسحوب من مجتمع ما مع القيمة الجدوليه على مستوى دلالة  $\alpha$  معين لتحديد منطقة القبول او منطقة الرفض .

**الخطوة الخامسة :** اتخاذ القرار .

وهي عملية رفض الفرضية الصفرية او قبولها بناءً على عملية مقارنة بين احصاء الاختبار مع منقطة الرفض ، فإذا وقعت دالة الاختبار في منطقة الرفض فأنا نرفض  $H_0$  وندعم  $H_1$  اما في حال وقوع دالة الاختبار في منطقة القبول فأنا ندعم  $H_0$  ونهمل  $H_1$

## المحاضرة ١٩ - الاسبوع الاحادي عشر

### اختبار الفرضيات

اختبار الفرضيات المنطقة بالوسط الحسابي :

نظرية (١) : اذا اخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من مجتمع طبيعي  $(\sigma^2, H)$  بحيث كان التباين  $(\sigma^2)$  معلوم ، فان احصاء الاختبار ( دالة الاختبار ) للفرضية المبدئية  $H_0: M = M_0$  هو  $Z = \frac{\bar{X} - M_0}{\sigma \sqrt{h}}$  يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري حيث  $\bar{X}$  هو الوسط الحسابي للعينة ، بحيث تتم خطوات الاختبار على النحو الآتي :

(١) اختبر الفرضية  $H_0: M = M_0$

(٢) مقابل الفرضية البديله

(أ)  $H_0: M \neq M_0$

(ب)  $H_0: M > M_0$


(ت)  $H_0: M < M_0$

(٣) مستوى الدلالة  $\alpha$

(٤) دالة الاختبار : تحت فرض ان  $H_0$  صحيحة فان احصاء الاختبار هو  $Z = \frac{\bar{X} - M_0}{\sigma \sqrt{h}}$  يخضع لتوزيع طبيعي معياري

(٥) القيم الحرجة ومنطقة الرفض :

(أ) ارفض الفرضية المبدئية  $H_0$  اذا كان



(ب) ارفض  $H_0$  اذا كان

الجدول من الاحصائية  $Z > Z_{1-\alpha}$  دالة الاختبار من رقم ٤

(ت) ارفض  $H_0$  اذا كان

الجدول من الاحصائية  $Z < Z_{\alpha}$  دالة الاختبار من رقم ٤

مثال : تخضع اوزان عبوات احد مساحيق الغسيل لتوزيع طبيعي انحرافه المعياري 7 غم و معدلة M غم ، على مستوى

الدلالة  $\alpha = 0.05$  اختبر الفرضية :

$H_0: M = 50$

مقابل الفرضية البديله

اذا علمت ان الوسط الحسابي لعينه حجمها ١٢ علبة هو  $\bar{X} = 56$  غم .

الحل : اولاً يجب ايجاد قيمة دالة الاختبار

عملية المقارنة وتحديد المنطقة الحرجة :

؟؟  $Z_{\alpha}$  ،  $Z_{1-\alpha/2}$

لن يتم الاستفادة منها في هذا المثال  $Z_{1-\alpha} = Z_{1-0.05} = Z_{0.95}$

من الجداول الاحصائية نجد ان :

ارفض  $H_0$  اذا كان :

$$Z = 2.97 > Z_{0.975} = 1.96$$

متباينة صحيحة

القرار : نرفض  $H_0$  وندعم  $H_1$

نظرية (٢) : ( اختبار الفرضيات المتعلقة بالوسط الحسابي لمجتمع طبيعي تباينه غير معلوم وحجم العينة صغير )

اذا اخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من مجتمع طبيعي  $N(M, \sigma^2)$  بحيث كان التباين غير معلوم ، فان حالة الاختبار هي

$$. T = \frac{\bar{X} - M_0}{S\sqrt{n}}$$

تخضع توزيع  $t$  بدرجات حرية  $n-1$  ، وتتم خطوات الاختبار على النحو الآتي :

١ .  $H_0: M = M_0$

٢ . مقابل البديله

أ)  $H_1: M \neq M_0$

ب)  $H_1: M > M_0$

ت)  $H_1: M < M_0$

٣ . مستوى الدلالة  $\alpha$

٤ . احصاء الاختبار

$$. T = \frac{\bar{X} - M_0}{S\sqrt{n}}$$

اتخاذ القرار ومناطق الرفض :

أ) ارفض  $H_0$  اذا كان

$$T < -t \left[ 1 - \frac{\alpha}{2}, n - 1 \right] \text{ او } T > t \left[ 1 - \frac{\alpha}{2}, n - 1 \right]$$

ب) ارفض  $H_0$  اذا كان

ت) ارفض  $H_0$  اذا كان

مثال : اظهرت سجلات احدى المدارس ان معدل تحصيل الطلبة في امتحان اللغة الانجليزية الذي يتقدمون له عند الالتحاق

بالجامعات الامريكية هو 410 . بدأت المدرسة بإعطاء دورات تقوية للطلبة . اختبر فرضية ان هذا المعدل قد تحسن اذا

اعطت نتائج 14 طالباً وسطاً حسابياً مقداره  $\bar{X} = 418$  بانحراف معياري  $S = 21$  ؟

( اعتبر مستوى الدلالة  $\alpha = 1\%$  ) .

الحل : ١)  $H_0: M = 410$

٢)  $H_1: M > 410$

٣)  $. T = \frac{\bar{X} - M_0}{S\sqrt{n}}$

٤) عملية المقارنة واتخاذ القرار :

نلاحظ ان المتباينة غير صحيحة ( بمعنى ان دالة الاختبار لم تقع في منطقة الرفض )  
وبذلك فأننا ندعم  $H_0$  ونهمل  $H_1$  ( لانستطيع ان نستنتج ان معدل تحصيل الطلبة قد تحسن بعد اعطاء الدورات )

**المحاضرة العشرون**  
**الفصل السادس : اختبار الفرضيات**

**اختبار الفرضيات المتعلق بالفرق وسطين:**

**نظرية (3):** إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n_1$  من مجتمع  $(M_1, N)$  ، وأخذت عينة عشوائية أخرى حجمها  $n_2$  من مجتمع طبيعي  $(M_2, N)$  بحيث كانت مستقلة عن الأولى ، وكان ، معلومتين ، فإن احصاء الاختبار للفرضية :  $H_0 : M_1 = M_2$  هي:  
 $Z =$

تخضع للتوزيع الطبيعي المعياري ، حيث ، هما وسطا العينتين على التوالي.

( نلاحظ أن خطوات الاختبار في هذه الحالة هي نفس خطوات الاختبار التي تم عرضها في نظرية (1). )

**خطوات الاختبار:**

1-  $H_0 : M_1 = M_2$

2-  $H_1 : M_1 \neq M_2$

ب-  $H_1 : M_1 < M_2$

ج-  $H_1 : M_1 > M_2$

3- دالة الاختبار :  $Z =$

4- على مستوى الدلالة

5- أرفض  $H_0$  إذا كان:

أ-  $Z > Z_{1-\alpha/2}$

$Z < Z_{\alpha/2}$

ب-  $Z < -Z_{1-\alpha/2}$

ج-  $Z > Z_{\alpha/2}$

**مثال:** أخذت عينتان مستقلتان حجمهما 72 ، 27 على التوالي من المجتمعين  $N(M_1, 144)$  ،  $N(M_2, 81)$  فاعطنا الوسطين ،  $= 73$  ،  $= 69$  ، اختبر الفرضية  $H_0 : M_1 = M_2$  على مستوى الدلالة  $= 0.05$

**الحل :**  $Z =$

قيمة اختبار الدلالة

$Z_{1-\alpha} = Z_{1-0.05} = Z_{0.95}$

من جدول التوزيع الطبيعي ، نجد أن:

$Z_{0.95} = 1.645$

$Z_{0.95}$

1.79 1.645

نرفض  $H_0$  وندعم  $H_1$

\*\*\*

اختبار الفرضيات المتعلقة بالنسبة:

إن اختبار الفرضيات المتعلقة بالنسبة يشبه اختبار الفرضيات المتعلقة بالوسط الحسابي لمجتمع حيث يتغير فقط طريقة إيجاد دالة الاختبار في هذه الحالة

**نظرية (4):** إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n$  من توزيع ذات الحدين (مجتمع برنولي  $(I, P)$  )  $b$  (بحيث كان هي نسبة النجاح في العينة فإن دالة الاختبار :  $Z =$

تخضع لتوزيع طبيعي معياري بشرط أن تكون  $n$  كبيرة ،  $(n > 30)$  حيث :  $p_0$  هي نسبة النجاح للمجتمع ، : هي نسبة النجاح للعينة. أما خطوات الاختبار هي كالآتي:

1- الفرضية الصغيرة:  $H_0 : P = P_0$

2- الفرضية الطويلة:  $H_1 : P > P_0$

ب-  $H_1 : P < P_0$

ج-  $H_1 : P = P_0$

3- مستوى الدالة

4- إحصاء الاختبار :  $Z =$

5- نرفض  $H_0$  إذا كان: أ-  $Z > Z_{1-\alpha/2}$

$Z < Z_{\alpha/2}$

ب-  $Z < -Z_{1-\alpha/2}$

ج-  $Z > Z_{\alpha/2}$

**مثال:** من المعلوم أن نسبة مستخدمي حزام الأمان في السيارات (قبل تشريع التزام الاستعمال) هي 0.8 درست عينة عشوائية حجمها 200 سائق بعد صدور التشريع الإلزامي، فوجد أن 170 سائق يستعملون الحزام. اختبر الفرضية ما إذا كان التشريع قد زاد نسبة المستخدمين لحزام الأمان على مستوى الدلالة ؟

**الحل:**  $H_0 : P = 0.8$

$H_1 : P > 0.8$

على مستوى الدلالة ؟

نلاحظ أن

ثم نجد دالة الاختبار  $Z =$

=

$Z_{1-0.05}$

$1.8 Z_{0.90} 1.8 1.28$

النتيجة: المتباينة صحيحة ، نرفض  $H_0$  وندعم  $H_1$  القرار التزام السائقين باستخدام حزام الأمان قد رفع من نسبة السائقين الذين يلتزمون باستخدامه.)

**المحاضرة الواحد والعشرون**  
**الفصل السادس : اختبار الفرضيات**

**اختبار الفرضيات المتعلق بالفرق وسطين:**

**نظرية 5):** (إذا أخذت عينة عشوائية حجمها  $n_1$  من مجتمع برنولي  $(I, P)$  :  $b$  وأخذت عينة عشوائية أخرى حجمها  $n_2$  مستقلة عن الأولى من مجتمع برنولي  $(I, P)$  :  $b$  فإن إحصاء الفرضية  $H_0 : P_1 = P_2$  هو  $Z =$  تخضع للتوزيع الطبيعي المعياري تقريباً بشرط أن تكون  $n_1, n_2$  كبيرتين. حيث... : نسبة النجاح للعينة الأولى.

نسبة النجاح للعينة الثانية.

ولحساب (النسبة المشتركة بين العينتين) ، يمكن استخدام الصيغة :

ولإجراء الاختبار للفرضية المبدئية، فإننا نتبع الخطوات السابقة من النظرية (4) مع أخذ بعين الاعتبار إحصاء الاختبار من نظرية (5).  
**مثال: للمقارنة بين نسبة المدخنين في الفئة العمرية (25) (18) – سنة مع الفئة العمرية (30) (26) – سنة، أخذت عينة عشوائية حجمها 200 شخص من الفئة الأولى ووجد أن 80 شخص منهم يدخنون، أخذت عينة عشوائية حجمها 100 شخص ووجد أن 52 شخص منهم**

**يدخنون. أختبر الفرضية  $H_0 : P_1 = P_2$**

**مقابل  $H_1 : P_1 \neq P_2$  على مستوى الدلالة**

الحل 1-  $H_0 : P_1 = P_2$

2-  $H_1 : P_1 \neq P_2$

3- مستوى الدلالة

4- إحصاء الاختبار  $Z =$

$Z$

..

$= = = 0.44$

$Z = = -1.967$

ولإيجاد قيمة  $Z_{0.05} = -1.645$

$-1.967 -1.645$

صحيحة وبذلك نهمل  $H_0$  وندعم  $H_1$



### السؤال الأول: -

عدد عناصر الفضاء العيني في تجربة إلقاء قطعة نقد ثلاث مرات :-

$$s = 2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ عناصر}$$

السؤال الثاني: إذا كان  $X$  متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين حيث

كان  $n=10$  ،  $P=0.6$  ، فإن احتمال فشل ياد :-

الحل :- لاحظ أن  $P=0.6$  هو احتمال النجاح

$$q = 1 - P = 1 - 0.6 = 0.4 \text{ فإن احتمال فشل ياد}$$

السؤال الثالث: من نتائج الاحتمال

احتمال أي حادث أكبر من أي صفر وانما من أرقام الواحد

السؤال الرابع: إذا كان  $n=5$  ،  $P=0.2$  في توزيع ذات الحدين

فإن تباين  $X$  الذي يتبع هذا التوزيع هو :-

$$\sigma_x^2 = npq = 5(0.2)(0.8) = 0.8$$

السؤال الخامس: إذا عدد طرق اختيار لجنة طلاب من بين

لجنة طلاب للذهاب في رحلة مدرسية هو :-

لاحظ أن لجنة اختيار الطلاب لا يؤثر فيها عملية الترتيب

$${}^5C_5 = \frac{5!}{(5-5)! \times 5!} = 1$$

السؤال السادس: في التوزيع الاحتمالي المنفصل، ان مجموع الاحتمالات لجميع المتغيرات العشوائية لذلك التوزيع يساوي: (1)

وهذا يبرهن من شروط التوزيع الاحتمالي المنفصل (مجموع الاحتمالات = 1)

السؤال السابع: اذا كان نجاح طالب في مقر الامتحان = 0.8 ، ونجاحه في مقر المحاسب = 0.7 ، والفعال نجاحه في كلا المقرين = 0.6 فان احتمال رسوبه في مقر الامتحان هو:

الحل:- نزل نجاح الطالب في مقر الامتحان بالرمز :-

$$P(A) = 0.8 \dots$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.8 = 0.2$$

السؤال الثامن:- ان شقة ليرة لا في التوزيع  $t [1; 5] = 2.015$  :-

الحل:-  $t [2; 5] = 2.015$

بلا  
0.95 من جدول توزيع t

وبسبب وجود الشارة السالبة، نأخذ القيمة من الجداول فنكون الحل هو  $1 - 0.95 = 0.05$

السؤال التاسع: اذا كان  $P(A) = 0.5$ ،  $P(B) = 0.4$ ،  $A$ ،  $B$  حادثين متعلقين فان  $P(A \cup B)$  يساوي :-

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \times P(B) \\ &= 0.5 + 0.4 - (0.5 \times 0.4) \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

السؤال الأول: إذا كان  $P(A) = 0.1$ ،  $P(B) = 0.4$ ،  $A, B$  حادثين مستقلين  
فإن  $P(A \cap B) = ??$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \\ = 0.1 \times 0.4 = 0.04$$

السؤال الثاني: إذا كان معدل الخاطئة في كتاب بواسون هو 10، فإن التوقع الرياضي للتعديلات  $X$  هو:

$$E(X) = \lambda = 10.$$

السؤال الثالث: إذا كان  $S$  هو الفضاء لعين لنتيجة عشوائية  
فإن احتمال  $S$  يساوي:

$$P(S) = 1 \quad \text{دائماً.}$$

السؤال الرابع: إن قيمة الوسط الحسابي في توزيع لطم يساوي

$$\text{دائماً} = \text{متوسط}$$

$$\text{أما التباين} = 1 = \text{الانحراف المعياري}$$

السؤال الخامس: انما قيمة  $F$  في الجدول  $F[0.95, 5, 6]$  هي:

$$\text{من جدول توزيع } F \text{ نجد ان القيمة هي } 4.39$$

السؤال السادس: إذا كان  $Z$  يتبع التوزيع الطبيعي المعياري

$$\text{فإن } P(Z > 2) \text{ يساوي:}$$

$$P(Z > 2) = 1 - P(Z < 2) \\ = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

السؤال السادس عشر :- الصيغة الحيارية لعقيدة للمتغير  $X=5$  والذي ينتمي للتوزيع لطبيع (5, 10)  $X \sim N(5, 10)$  نأوي :

الحل :- نحول  $X$  إلى  $Z$  حسب الصيغة

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{5 - 5}{10} = \frac{0}{10} = 0$$

السؤال السابع عشر : اذا كان الثابت للمتغير العشوائي  $X$  يساوي 4 وكتابه لدينا ، لتحويل الخطر  $Y = -X + 5$  فان الاحتمال الحيارى للمتغير العشوائي  $Y$  يساوي :-

الحل: لاحظ أن الاحتمال الحيارى للمتغير  $X = \sqrt{4} = 2$  .  
حده هنا هو الاحتمال الحيارى كما اني تحول خطر هو :-

$$\sigma_Y = |a| \sigma_X = |-1| \times 2 = 2$$

السؤال الثامن عشر : ان قيمة كاي تربيع التي تقع على يسارها 0.99  
0.99 بدرجة حرية 2 تساوي :-

الحل :- من جدول توزيع كاي تربيع نجد أن قيمة كاي = 9.210

السؤال التاسع عشر : اذا كان  $P(A) = 0.7$  ،  $P(B) = 0.6$  ،  $P(A \cup B) = 0.8$  فان احتمال حدوث  $A$  وعدم حدوث  $B$  هو :-

الحل :-

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$= 0.7 - (P(A) + P(B) - P(A \cup B))$$

معادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد  
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

$$\begin{aligned}
 &= 0.7 - (0.7 + 0.6 - 0.8) \\
 &= 0.7 - 1.3 + 0.8 \\
 &= 0.7 - 0.5 \\
 &= 0.2
 \end{aligned}$$

السؤال العشرون :- إذا كان  $X$  متغير عشوائي تتبع توزيع ذات الحدين  
حيث كان  $n=3$  ،  $p=0.8$  ، فإن احتمال  $X=0$  يساوي :-

الحل :- من خلال استخدام صيغة القانون لتوزيع ذات الحدين نجد أنه :-

$$\begin{aligned}
 P(X=0) &= {}^n C_x * P^x * (1-p)^{n-x} \\
 &= {}^3 C_0 * (0.8)^0 * (0.2)^3 \\
 &= 1 * 1 * 0.008 \\
 &= 0.008
 \end{aligned}$$

السؤال الحادي والعشرون :- إذا كان معدل المواليد في أحد المستشفيات

هو 5 أطفال في اليوم الواحد فإن احتمال ولادة 3 أطفال في أحد الأيام هو :-

$$P(X=3) = \frac{{}^5 C_3 * 5^3}{3!} = 0.14$$

الحل :- توزيع بواسون :-

السؤال الثاني والعشرون :- اكتب تبديل حرفية من كلمة "نجاح" هو

$$4P_2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4 \times 3 \times 2}{2} = 12$$

الواجب الثالث

السؤال الأول: عينة عشوائية حجم 25 تخضع لتوزيع طبيعي وسطه 15 وانحرافه

المعياري = 5، فإن احتمال أن يقع الوسط الحسابي للعينة عن 17 هو:

الحل: لاحظ أن بياض (الانحراف المعياري) للجمع معطر، والمطلوب إيجاد:

$$P(\bar{X} < 17) \leftarrow \text{من توزيع المعاينة}$$

يجب تحويل قيمة  $\bar{X}$  إلى  $Z$  من خلال صيغة القانون

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{17 - 15}{5/\sqrt{25}} = \frac{2}{1} = 2$$

$$P(\bar{X} < 17) = P(Z < 2) = 0.9772 \leftarrow$$

(من جدول التوزيع الطبيعي المعياري)

السؤال الثاني: عينة عشوائية حجم 16 أخذت من مجتمع طبيعي وانحرافه المعياري

12 حيث أعطت المعدل 30، فإن فترة 90% ثقة للوسط الحسابي للجمع هي:

الحل: نلاحظ أن والانحراف المعياري المعطر يعود للعينة، وبذلك فإن

التوزيع المستخدم هو توزيع  $t$ ، ومن النظرية (2)، نجد أن:

$$\left( \bar{X} - t [1 - \alpha/2, n-1] * \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t [1 - \alpha/2, n-1] * \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left( 30 - t [0.95, 15] * \frac{12}{\sqrt{16}}, 30 + t [0.95, 15] * \frac{12}{\sqrt{16}} \right)$$

$$\left( 30 - 1.753 * \frac{12}{4}, 30 + 1.753 * \frac{12}{4} \right)$$

$$( 24.74 , 35.26 )$$

السؤال الثالث: اذا علمت أن عينة حجم 10 موزونة من مجتمع لا نهائي  
سواء 9 وبنائه = 2، فإن لوسط الحسابي ~~للعينة~~ هو:-  
لاحظ أنه لوسط الحسابي للمجتمع = لوسط الحسابي للعينة.

$$E(\bar{X}) = \mu = 10.$$

السؤال الرابع: اخذت عينة عشوائية حجمها 4, 5, 5, 7 من مجتمع طبيعي  
فإن معدل المجتمع تقديراً بـ 5:-

الحل:- من خلال التقدير النظري، نلاحظ أن معدل المجتمع = معدل العينة.  
وبذلك نجد معدل العينة ~~هو~~ للقيم المعطاة :-

$$\bar{X} = \frac{7 + 5 + 5 + 3}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\mu = 5 \quad \text{وبذلك}$$

السؤال الخامس: كتبت عينة عشوائية من مجتمع لا نهائي معدل  
100 وبنائه 40، اذا كان حجم العينة = 10، فإن الاحتراف  
المعيار للعينة بـ 2:-

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{40}{\sqrt{10}} = 4 \quad \text{الحل:-}$$

(الاحتراف المعيار = الجذر التربيعي للعبء)

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{4} = 2.$$

(النظرية الأولى من توزيعات المعاينة).

حلول أسئلة الواجب الرابع

السؤال الأول: إذا كانت لدينا عينة عشوائية حجمها 9 من مجتمع طبيعي  
بمتوسط 5، وعين عشوائية أخرى مستقلة عن الأولى حجمها 11  
ومتوسطها 4، فإن نسبة قدرة 90% ثقة للنسبة  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$  هي:

الحل: لاحظ أنه في حال السؤال عن نسبة  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$  فإننا نستخدم قانون

(نوزيع  $F$  توزيع  $F$ ، ونستخدم صيغة لقانون:

$$\left( \frac{S_2^2}{S_1^2} F[\alpha/2, n_1-1, n_2-1], \frac{S_2^2}{S_1^2} F[1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1] \right)$$

نتبع أنه:

$$\left( \frac{4}{5} \times F[0.05; 8; 10], \frac{4}{5} \times F[0.95; 8; 10] \right)$$

$$\left( \frac{4}{5} \times \frac{1}{3.35}, \frac{4}{5} \times 3.07 \right)$$

$$\left( 0.24, 2.456 \right)$$

السؤال الثاني: إذا أخذت عينة عشوائية حجمها 40 طالب  
من أحد المدارس الابتدائية ووجد أن 10 طلاب يلبسون نظارات  
طبية، فإن نسبة النجاج هي:

الحل: لاحظ أن نسبة النجاج  $P$  تساوي:

$$P = \frac{x}{n} = \frac{\text{عدد النجاج}}{\text{حجم العينة}} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0.25$$



السؤال الثالث :- إذا كان عدد الطلاب الذين يلبون نظارات

طبية من بين 40 طالباً هو عشرة طلاب، فإن فترة 90% ثقة  
نسبة نجاح الطلاب الذين يلبون نظارات هي :-

الحل :- لاحظ أن التقدير هنا هو التقدير بنسبة النجاح، ومنه  
أولاً إيجاد نسبة النجاح للفترة حيث

$$\bar{P} = \frac{X}{n} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0.25 .$$

وبنفسه قانون نظرية الحدس وحدة التقدير :-

$$\left( \bar{P} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} , \bar{P} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} \right)$$

$$\left( 0.25 - z_{0.95} \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{40}} , 0.25 + z_{0.95} \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{40}} \right)$$

$$( 0.14 , 0.36 ) .$$

السؤال الرابع :- إذا أخذت عينة عشوائية حجم 9 من توزيع طبيعي

بمتوسط 8 وخطأ معياري = 2، فإن فترة 90%  
ثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع هي :-

الحل :- لاحظ أن البيانات المجموع أو الأخران المتباركة له غير معلوم  
وبذلك فإننا سنستخدم توزيع t لإيجاد فترة الثقة.  
وبنفسه صيغة القانون من النظرية (٣) فصل على :-

$$\left( \bar{X} - t [1 - \alpha/2, n-1] \frac{S}{\sqrt{n}} , \bar{X} + t [1 - \alpha/2, n-1] \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left( 8 - t [0.95, 8] * \frac{2}{\sqrt{9}} ; 8 + t [0.95, 8] * \frac{2}{\sqrt{9}} \right)$$

$$\left( 8 - 1.86 \times \frac{2}{3} \quad ; \quad 8 + 1.86 \times \frac{2}{3} \right)$$

$$( 6.76 \quad ; \quad 9.24 )$$

السؤال الخامس: عينة عشوائية حجمها 15 اخذت من مجتمع طبيعي حيث اعطت نتائج = 10 ، فان فترة 98% ثقة للبيانات لمجتمع هي :-  
الحل: بتطبيق صيغة العانوف من التوزيع (7) ، والخاصة بفترة ثقة لبيانات مجتمع واحد :-

$$\left( \frac{(n-1) S^2}{\chi^2 [1-\alpha/2; n-1]} \quad ; \quad \frac{(n-1) S^2}{\chi^2 [\alpha/2; n-1]} \right)$$

$$\left( \frac{14 \times 10}{\chi^2 [0.99; 14]} \quad ; \quad \frac{14 \times 10}{\chi^2 [0.01; 14]} \right)$$

$$\left( \frac{140}{29.141} \quad ; \quad \frac{140}{4.66} \right)$$

$$( 4.80 \quad ; \quad 30.04 )$$

تآارين على لفصل السادس

سؤال: تخضع درجات الطلاب في مقرر الإحصاء لتوزيع طبيعي آخران  
المعيارية 10 درجات ووسطه 70. اختبر لفرضية

$$H_0: \mu = 70$$

عكس لفرضية

$$H_1: \mu < 70$$

على مستوى دلالة  $\alpha = 0.05$  إذا كانت أفا الوسط الحسابي لدرجة  
من الطلاب حكي 16 أعطت وسطاً مقداره 65 درجة.

الحل: (أ) نحدد دالة الاختبار:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{65 - 70}{10 / 4} = \frac{-5}{2.5} = -2$$

ب) نجرى عملية المقارنة من خلال الحالة الثالثة

$$Z < Z_{\alpha} = -Z_{1-\alpha}$$

$$-2 < -Z_{0.95}$$

$$-2 < -1.64$$

المقارنة صحيحة

نرفض  $H_0$  ونعتمد  $H_1$

## الواجب الاول

حدثين منفصلين فإن احتمال  $A, B$  وكان  $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$  سؤال ١ : إذا كان

$$P(A \cup B) =$$

1/ **0.9**

2/ 0.4

3/ 0.5

4/ 0.7

يساوي  $Y = -x + 5$  وكان لدينا الخطي  $X$  سؤال ٢ : إذا كان التباين للمتغير العشوائي

يساوي  $Y$  فإن تباين المتغير العشوائي

1/ 3-

2/ 2

3/ 8

4/ **3**

"SUCCESS" سؤال ٣ : ما عدد تبديل احرف كلمة

1/ 5040

2/ 840

3/ **420**

4/ 2520

سؤال ٤ : إذا كان احتمال نجاح طالب في مقرر الاحصاء هو ٠,٨ واحتمال نجاحه في مقرر

المحاسبة هو ٠,٧ واحتمال نجاحه في كلا المقررين هو ٠,٦ فإن احتمال نجاحه في

الاحصاء ورسوبه في المحاسبه هو

1/ 0.1

2/ **0.2**

3/ 0.4

4/ 0.3

سؤال ٥ : إذا كان احتمال نجاح طالب في مقرر الاحصاء هو ٠,٨ واحتمال نجاحه في مقرر

المحاسبة هو ٠,٧ واحتمال نجاحه في كلا المقررين هو ٠,٦ فإن احتمال نجاحه في

المحاسبة ورسوبه في الاحصاء هو

1/ 0.1

2/ 0.2

3/ 0.4

4/ 0.3

برمز لظهور أوجه متشابهة في تجربة إلقاء قطعة X سؤال ٦ : إذا كان المتغير العشوائي يساوي X فإن احتمال نقد متزنة ثلاث مرات

1/ 1/4

2/ 1/2

3/ 1/3

4/ 1/8

ويرمز لظهور أوجه متشابهة في تجربة إلقاء قطعة X سؤال ٧ : إذا كان المتغير العشوائي نقد منتظمة مرتين، فإن احتمال ذلك المتغير يساوي

1/ 1/4

2/ 1/2

3/ 1/3

4/ 1/8

يساوي ٣ وكان لدينا التحويل الخطي X سؤال ٨ : إذا كان التوقع الرياضي للمتغير العشوائي يساوي y فإن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي  $y = -2x + 3$

1/ 6-

2/ 3

3/ 3-

4/ 6

: يساوي  $P(B/A)$  فإن  $P(A) = P(A/B) = 0.5, P(B) = 0.2$  سؤال ٩ : إذا كان

1/ 0.3

2/ 0.5

3/ 0.4

4/ 0.2

فإن احتمال التقاطع  $P(A)=0.4, P(b)=0.6, P(AUB)=1$  سؤال ١٠ : إذا كان يساوي A,B للحادثين

1/ 1

2/ 0.6

3/ 0

4/ 0.4

سؤال ١١ : ان عدد طرق اختيار طالبين من بين خمسة طلاب للذهاب في رحلة مدرسية

: يساوي

1/ 30

2/ 10

3/ 5

4/ 20

سؤال ١٢ : ان عدد طرق اختيار ٣ طلاب من بين خمسة طلاب للذهاب في رحلة مدرسية

: يساوي

1/ 30

2/ 10

3/ 5

4/ 20

:  $p(a/b) =$  فإن  $p(b) = p(b/a) = 0.4$ ,  $p(a) = 0.5$  سؤال ١٣ : إذا كان

1/ 0

2/ 0.2

3/ 0.4

4/ 0.5

## الواجب الثاني

سؤال ١ : إذا كان معدل المواليد في احد المستشفيات هو ٥ اطفال في اليوم الواحد، فإن

احتمال ولادة ٣ اطفال في احد الأيام هو

0

0.28

0.14

0.84

والذي ينتمي للتوزيع  $X=10$  سؤال ٢ : إن القيمة المعيارية المقابلة للمتغير العشوائي  
تساوي  $X:N(5;100)$  الطبيعي

10

0.5

2

1

سؤال ٣ : إن قيمة التباين في التوزيع الطبيعي المعياري يساوي

1

0

10

0.5

يساوي  $t[5; \lambda] = 2.015$  في التوزيع  $\lambda$  سؤال ٤ : إن قيمة المساحة

0.10

0.90

0.05

0.95

$P=0.6, n= 10$  متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين بحيث كان  $X$  سؤال ٥ : إذا كان

يساوي  $X$  فإن التوقع الرياضي للمتغير.

0.6

6

0.24

2.4

تساوي  $F[0.05;5,6]$  في المقدار  $F$  سؤال ٦ : إن قيمة

4.95

0.20

4.39

0.23

$P=0.6, n= 10$  متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين بحيث كان  $X$  سؤال ٧ : إذا كان

يساوي  $X$  فإن تباين

0.6

0.24

6

2.4

## الواجب الثالث

السؤال I : عينة عشوائية حجمها ١٦ اخذت من مجتمع طبيعي انحرافه المعياري ١٢ :  
بحيث اعطت معدل ٣٠، فإن فترة ٩٠% ثقة للوسط الحسابي للمجتمع هي

(24.24, 35.76)

(24.08, 31.92)

(25.24, 30.76)

(25.08, 34.92)

السؤال ٢ : اخذت عينة عشوائية قيمها ٣، ٥، ٥، ٧ من مجتمع طبيعي، فإن معدل  
المجتمع تقديرا يساوي

5

4

7

3

السؤال ٣ : إذا علمت أن عينة حجمها ١٠ مسحوية من مجتمع لانهائي معدله ٩ وتباينها  
التوقع الرياضي) يساوي ٢، فإن الوسط الحسابي للعينة

10

2

3

9

السؤال ٤ : عينة عشوائية حجمها ٢٥ تخضع لتوزيع طبيعي وسطه ١٥ وانحراف معياري :  
فإن احتمال ان يقل الوسط الحسابي للعينة عن ١٧ هو يساوي ٥

0.0225



0.0183

0.9772

0.9817

السؤال ٥ : سحبت عينة عشوائية من مجتمع لانتهائي معدله ١٠٠ وتباينه ٤٠ ، اذا كان حجم العينة يساوي ١٠ فإن الانحراف المعياري للعينة يساوي

10

2

4

الواجب الرابع : الإحصاء للإدارة ..

السؤال ١ : إذا كان عدد الطلاب الذين يلبسون نظارات طبية من بين ٤٠ طالبا هو ١٠ ، فإن فترة ٩٠ % ثقة لنسبة نجاح الطلاب الذين يلبسون نظارات هي:

المعطيات :

$$h = 40 \dots \bar{X} = 10$$

فترة ثقة : ٩٠%

القانون :

$$\bar{P} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{h}}, \bar{P} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{h}}$$

الحل :

$$1 - \alpha = 90 \%$$

$$\alpha = 10 \%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 5\% = 0.05$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 95\% = 0.95$$

$$0.25 - Z_{0.95} \sqrt{\frac{0.25(1-0.25)}{40}}, 0.25 + Z_{0.95} \sqrt{\frac{0.25(1-0.25)}{40}}$$

$$0.25 - 1.65 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{40}}, 0.25 + 1.65 \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{40}}$$

$$0.14, 0.36$$

السؤال ٢ : إذا كان لدينا عينة عشوائية حجمها ٩ من مجتمع طبيعي تباينها = ٥ ، وعينة عشوائية أخرى مستقلة عن الأولى حجمها = ١١ وتباينها = ٤ . فإن فترة ٩٠ % ثقة للنسبة (تباين المجتمع الثاني) / (تباين المجتمع الأول) تساوي

المعطيات :

$$n_1 = 9 \dots \delta^2 = 5$$

$$N_2 = 11 \dots \delta^2 = 4$$

فترة ثقة : ٩٠ % للنسبة (للتباين)

القانون :

$$\frac{S_2^2}{S_1^2} F \left[ \frac{\alpha}{2}; n_1-1, n_2-1 \right], \frac{S_2^2}{S_1^2} F \left[ 1 - \frac{\alpha}{2}; n_1-1, n_2-1 \right]$$

الحل :

$$1 - \alpha = 90 \%$$

$$\alpha = 10 \%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 5\% = 0.05$$
$$1 - \frac{\alpha}{2} = 95\% = 0.95$$

$$\frac{4}{5} F [ 0.05 ; 8 , 10 ] , \frac{4}{5} F [ 0.95 ; 8 , 10 ]$$
$$\frac{4}{5} \times \frac{1}{3.07} , \frac{4}{5} \times 3.07$$
$$0.26 , 2.68$$

السؤال ٣ : إذا اخذت عينة عشوائية حجمها ٩ من توزيع طبيعي بحيث اعطت وسط حسابي = ٨ وانحراف معياري = ٢. فإن فترة ثقة ٩٠% للوسط الحسابي للمجتمع

هي

المعطيات :

$$n = 9 \dots \bar{x} = 8 \dots s = 2$$

فترة ثقة ٩٠% للوسط الحسابي ..

القانون :

$$\bar{x} - t[1 - \frac{\alpha}{2} , n-1] \frac{s}{\sqrt{n}} , \bar{x} + t[1 - \frac{\alpha}{2} , n-1] \frac{s}{\sqrt{n}}$$

الحل :

$$1 - \alpha = 90\%$$

$$\alpha = 10\%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 5\% = 0.05$$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 95\% = 0.95$$

$$8 - t[0.95, 8] \frac{2}{\sqrt{9}}, 8 + t[0.95, 8] \frac{2}{\sqrt{9}}$$

$$8 - 1.86 \times \frac{2}{\sqrt{9}}, 8 + 1.86 \times \frac{2}{\sqrt{9}}$$

$$6.76, 9.24$$

السؤال ٤ : إذا اخذت عينة عشوائية حجمها ٤٠ طالب من احد المدارس الابتدائية ، ووجد أن ١٠ طلاب يلبسون نظارات طبية . فإن نسبة النجاح هي :

المعطيات :

$$n = 40 \text{ .. } x = 10$$

القانون :

$$\frac{x}{n} = \bar{P} \text{ نسبة النجاح}$$

الحل :

$$0.25 = \frac{10}{40} = \bar{P}$$

السؤال ٥ : عينة عشوائية حجمها ١٥ اخذت من مجتمع طبيعي بحيث اعطت تباين

= ١٠ ، فإن فترة ٩٨ % ثقة لتباين المجتمع هي :

المعطيات :

$$n = 15 \text{ .. } \sigma^2 = 10$$

فترة ثقة : 98% لتباين المجتمع ..

القانون :

$$\frac{(n-1)s^2}{x^2 [1 - \frac{\alpha}{2}, n-1]}, \frac{(n-1)s^2}{x^2 [\frac{\alpha}{2}, n-1]}$$

الحل :

$$1-\alpha = 98 \%$$

$$\alpha = 2 \%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 1\% = 0.01$$

$$1-\frac{\alpha}{2} = 99\% = 0.99$$

$$\frac{14 \times 10}{x^2[0.99,14]}, \frac{14 \times 10}{x^2[0.01,14]}$$
$$\frac{140}{29.141}, \frac{140}{4.660}$$
$$4.80, 30.04$$

تنويه هام : الحل ليس نهائي ولا يعتبر نهائياً حتى يتم اعتماده

بالموضوع المثبت للواجبات والاختبارات

السؤال ١ : إذا كان X متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين بحيث كان  $n=10, P=0.6$  فإن

احتمال الفشل يساوي

0.5

0.4

0,24

0.04

السؤال ٢ : إذا كان معدل النجاحات في تجارب بواسون هو ١٠، فإن التوقع الرياضي للمتغير

العشوائي X الذي يتبع هذا التوزيع يساوي

10

1

0

5

السؤال ٣ : إذا كان  $Z$  ينتمي الى التوزيع الطبيعي المعياري فإن  $P(Z > 2)$  يساوي

0.9817

0.0183

0.9772

0.0228

السؤال ٤ : إن القيمة المعيارية المقابلة للمتغير العشوائي  $X=5$  والذي ينتمي للتوزيع

الطبيعي  $(X:N(5;100))$  تساوي

10

2

0

1

السؤال ٥ : من خصائص منحنى التوزيع الطبيعي

شكله يشبه الجرس

المساحة اسفل المنحنى تساوي ١

يتقارب طرفيه من الصفر عندما تقترب  $X$  من موجب وسالب مالانهاية

جميع ما ذكر صحيح

السؤال ٦ : إذا كان  $P(A) = 0.5$ ,  $P(B) = 0.4$  وكان  $A, B$  حادثين مستقلين فإن احتمال

$(P(A \cup B) =$

0.5

0.7

0.9

0.4

السؤال ٧ : إذا كان احتمال نجاح طالب في مقرر الاحصاء هو ٠,٨ واحتمال نجاحه في مقرر

المحاسبة هو ٠,٧ واحتمال نجاحة في كلا المقررين هو ٠,٦ فإن احتمال رسوبه في مقرر الإحصاء هو

0.1

0.4

**0.2**

0.3

السؤال ٨ : إذا كان  $X$  متغير عشوائي يتبع توزيع ذات الحدين بحيث كان  $n=3$ ,  $P=0.8$  فإن احتمال  $X=0$  يساوي

0.8

0.08

0.512

**0.008**

السؤال ٩ : إن قيمة الوسط الحسابي في التوزيع الطبيعي المعياري يساوي

0.5

**0**

1

0.1

السؤال ١٠ : في التوزيع الاحتمالي المنفصل، إن مجموع الاحتمالات لجميع المتغيرات العشوائية التي تنتمي لذلك التوزيع تساوي

0

أكبر من صفر

أقل من واحد

**1**

السؤال ١١ : إذا كان  $n=5$ ,  $P=0.2$  في توزيع ذات الحدين، فإن تباين  $X$  الذي يتبع هذا التوزيع يساوي

1

5

0.8

0.5

سؤال ١٢ : إذا كان  $P(A)=0.1$ ,  $P(B)= 0.4$  وكان  $A$ ,  $B$  حادثين مستقلين فإن احتمال

تقاطعهما يساوي

0.04

0.1

0

0.4

السؤال ١٣ : ان عدد طرق اختيار خمسة طلاب من بين خمسة طلاب للذهاب في رحلة مدرسية

يساوي

2

10

1

5

السؤال ١٤ : إن تبادل حرفين من كلمة "تجاح" هو

1

12

6

24

السؤال ١٥ : من مسلمات الاحتمال

احتمال أي حادث أكبر من صفر

احتمال أي حادث أقل من ١

احتمال اي حادث أكبر من أو يساوي صفر وأقل من أو يساوي ١

احتمال أي حادث = ١

السؤال ١٦ : إذا كان المتغير العشوائي  $X$  برمز لظهور عدد من مختلفين في تجربة القاء ججري

نرد، فإن احتمال  $X$  يساوي

1/6



1/3

1/4

5/6

السؤال ١٧ : إن قيمة كاي تربيع التي تقع على يسارها المساحة ٠,٩٩ بدرجات حرية ٢ تساوي

9.210

7.824

6.635

13.815

السؤال ١٨ : إذا كان  $P(A)=0.7$ ,  $P(B)=0.6$ ,  $P(A \cup B)=0.8$  فإن احتمال حدوث  $A$  وعدم

حدوث  $B$  يساوي

0.2

0.5

0.3

0.4

السؤال ١٩ : السؤال ١٩ : إن قيمة  $F$  في المقدار  $F[0.95;5,6]$  تساوي

0.23

0.20

4.39

4.95

السؤال ٢٠ : إذا كان  $P(A)=0.5$ ,  $P(B) =0.2$  وكان  $A$  و  $B$  حادثين منفصلين فإن احتمال

تقاطعهما يساوي

0.5

صفر

1

0.2

السؤال ٢١ : إذا كان التباين للمتغير العشوائي  $X$  يساوي ٤ وكان لدينا الخطي  $Y = -x + 5$  فإن

الانحراف المعياري للمتغير العشوائي  $Y$  يساوي

4

2

4-

2-

السؤال ٢٢ : إذا كان معدل المواليد في احد المستشفيات هو ٥ اطفال في اليوم الواحد، فإن احتمال ولادة ٣ اطفال في احد الأيام هو

0.28

0.14

0

0.84

السؤال ٢٣ : إذا كان S هو الفضاء العيني لتجربة عشوائية، فإن احتمال S يساوي صفر

اكبر من ٠ واقل من واحد

0.5

1

السؤال ٢٤ : إن قيمة المساحة  $\lambda$  في التوزيع  $t[\lambda; 5] = -2.015$  يساوي

0.05

0.95

0.10

0.90

السؤال ٢٥ : إن عدد عناصر الفضاء العيني في تجربة القاء قطعة نقد ثلاث مرات يساوي

8

6

4

9