

### الأعداد صحيحة :

#### 1- الأعداد الطبيعية الموجبة :

- مثل الأعداد (....., 1, 2, 3, ..... ) وتسماى الأعداد الصحيحة الموجبة
- يمثل الرقم (1) وحدة قياس والرقم (2) هو تكرار وحدة القياس مرتين وهكذا

#### 2- الأعداد الطبيعية السالبة :

- مثل الأعداد (....., -3, -2, -1) وتسماى الأعداد الصحيحة السالبة
- تعبر هذه الأعداد عن بعض الظواهر مثل عمليات السحب من رصيدك بالبنك او من المخزون وهكذا

#### 3- الصفر

- عند اضافة الصفر الى الفتنيين السابقتين تنتج الأعداد الصحيحة


### الأعداد الغير صحيحة :

#### 1- الأعداد القياسية :

- هي النسبة بين عددين صحيحين ويكون المقام لا يساوي صفر مثل ( -2/3 , 1/9 , 3/7 )

#### 2- الأعداد الغير قياسية :

- أي عدد لا يمكن كتابته على الصورة القياسية مثل (  $\sqrt{2}$  ,  $\sqrt{6}$  )



هذا الشكل يوضح الشروط الازمة للقيمة المطلقة


مثال : أوجد القيمة المطلقة للمقادير التالية :

$$\frac{1}{9}, \frac{3}{4}, -11, 5$$

الحل :

$$|\frac{1}{9}| = \frac{1}{9}, |\frac{3}{4}| = \frac{3}{4}, |-11| = 11, |5| = 5$$

# العمليات الجبرية



**قواعد مهمة بالجمع :**

يشترط لجمع أي مقدارين جبريان أن يكونا من نفس النوع

مثال : أوجد ناتج حاصل جمع المقادير التالية :

$$س + 5 \text{ص} + 9 \text{ص} + 8 \text{ص} + 2 \text{ص}$$

**الحل :**

نرتب المقادير المتشابهة ثم نقوم بجمعهما

$$س + 5 \text{ص} + 9 \text{ص}$$

$$+ 8 \text{ص} + 2 \text{ص}$$

---

$$15 \text{س} + 7 \text{ص} + 9 \text{ص}$$

**ارشادات مهمة**

- قمنا بترتيب المقادير المتشابهة
- قمنا بعملية الجمع بشكل عادي

**قواعد مهمة في الطرح :**

**يشترط لطرح أي مقدارين جبريان التالي :**

- أن يكونا من نفس النوع
- بعملية الطرح نضع الفرق بين المقدارين مع اشارة المقدار الأكبر

**مثال (1) : أوجد حاصل جمع المقادير التالية :**

$$س^2 + 7\text{ص} \quad و \quad -2\text{س} \quad - \quad 6\text{ص} \quad و \quad 8\text{س} \quad - \quad 3\text{ص}$$

**الحل :**

$$س^2 + 7\text{ص}$$

$$-2\text{س} - 6\text{ص}$$

$$8\text{س} - 3\text{ص}$$

---

$$8\text{س} - 2\text{ص}$$

**ارشادات مهمة**

- قمنا بترتيب المقادير المتشابهة
- قمنا بعملية الطرح بشكل عادي

**مثال (2) : أوجد حاصل طرح المقدار ( $4\text{س} + 2\text{ص}$ ) من ( $2\text{س} + 5\text{ص}$ )**

**الحل :**

$$(4\text{س} + 2\text{ص}) - (2\text{س} + 5\text{ص})$$

$$4\text{س} + 2\text{ص} - 2\text{س} - 5\text{ص}$$

$$2\text{س} + 2\text{ص}$$


$$-2\text{س} - 5\text{ص}$$

---

$$-3\text{ص}$$

**ارشادات مهمة**

- في حالة المثال رقم (2) فكنا الاقواس اولاً وغيرنا اشارة  $2\text{س}$  الى  $-2\text{س}$  في القوس الثاني لأن القوس كان مسبوقاً باشارة سالب
- قمنا بعد ذلك بترتيب المقادير المتشابهة ثم بعملية الطرح بشكل عادي



### قاعدة الإشارات لضرب المقادير الجبرية

#### قواعد مهمة في الضرب

- يشترط في عملية ضرب المقادير الجبرية أن نراعي قاعدة الإشارات كالتالي :
    - اذا اتحدت الإشارات تكون الإشارة ( موجب )
    - اذا اختلفت الإشارات تكون ( سالب )
  - تجمع الأسس في عملية الضرب
  - اذا كان الأس صفر فإن ناتج المقدار = 1
- عند ضرب الأقواس أو معادلتين :

<p><b>الخطوة الثانية</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math>a^2b^2 - 2ab - 3b^2 =</math> </div>	<p><b>الخطوة الاولى</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math>(a^4 - b^4) (a^2 + b^2)</math> </div>
$2a^6 - 2a^4b^2 - 3a^2b^4 =$	

**الخطوة الاولى :** نضرب العنصر الاول في المعادلة الاولى بعنصر عنصر من المعادلة الثانية وايضاً نضرب العنصر الثاني بالمعادلة الاولى بعنصر عنصر من المعادلة الثانية  
**الخطوة الثانية :** نجمع العناصر المتشابهة

عند وجود معادلة مرفوعة الاس  $(a + b)^2$  :

**نطبق القاعدة التالية :** مربع المقدار الاول +  $\times 2$  الأول  $\times$  الثاني + مربع الثاني

مثال (1) : أوجد ناتج

$$s^5 \times s^3$$

الحل :

$$s^5 + s^3 = s^8$$

ارشادات مهمة

- في حالة المثال رقم (1) تم جمع الأساس لأن العملية ضرب واما الأساسات فتم نقلها مباشرة لأنها متشابه

مثال (2) أوجد ناتج

$$\begin{smallmatrix} 4 & 3 \\ \times & \end{smallmatrix} \quad \begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ 3 \end{smallmatrix} \quad \begin{smallmatrix} 4 & -3 \\ 3 \end{smallmatrix}$$

الحل:

$$\begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ 3 \end{smallmatrix} = \begin{smallmatrix} 4 & 3 \\ \times & \end{smallmatrix} \quad \begin{smallmatrix} 2 & -3 \\ 3 \end{smallmatrix} \quad \begin{smallmatrix} 4 & -3 \\ 3 \end{smallmatrix}$$

ارشادات مهمة

- في حالة المثال رقم (2) تم جمع الأساس لأن العملية ضرب واما الأساسات فتم نقلها مباشرة لأنها متشابه

مثال (3) أوجد قيمة المقدار التالي :

$$3a - 4b + 6j \quad \text{إذا كان } a = 3 \quad \text{و } b = -2 \quad \text{و } j = -1$$

الحل :

$$11 = 6 - 8 + 9 = (1-6) + (2-4) - (3)3$$

ارشادات مهمة :

- في حالة طلب ايجاد القيمة للمقادير الجبرية بالتعويض كالمثال رقم (3) نستخدم عملية الضرب اوأ ثم نقوم بالعملية بشكل عادي

مثال (4) أوجد ناتج المقدار التالي :

$$(3a^2 - b^2 + ab)$$

الحل :

$$12a^2 - 3ab + ab =$$

$$12a^2 - 2ab =$$

مثال (5) أوجد ناتج المقدار التالي :

$$(m^4 + n^2)$$

الحل :

$$16m^2 + mn^2 =$$

مثال (6) أوجد ناتج المقدار التالي :

$$(s^2 - sc + 2sc)^2$$


الحل :

$$s^2 + 4sc + 4c^2 - 4sc = s^2 + 4c^2$$

$$= 5sc^2$$

### ارشادات مهمة :

- رغم أن هنالك اشارة جمع بين المقادير الا اننا سنستخدم قاعدة الضرب لأن المقادير مرفوعين بالأسس فبدانا بتطبيق قاعدة الضرب على المقادير  $(s^2 - sc + 2sc)^2 = (s^2 + 4sc + 4c^2)^2$
- بالخطوة الثانية قمنا بعملية الجمع وفق قواعد جمع المقادير الجبرية



### قاعدة الإشارات لقسمة المقادير الجبرية

#### قواعد مهمة في القسمة

- 1 يشترط في عملية قسمة المقادير الجبرية أن نراعي قاعدة الإشارات كالتالي :
  - اذا اتحدت الإشارات تكون الإشارة ( موجب )
  - اذا اختلفت الإشارات تكون ( سالب )
- 2 تطرح الأسس في عملية القسمة
- 3 عند طرح الأسس نبدأ بالأس الأعلى
- 4 أي عدد او حرف يكون اسنه صفر يساوي واحد

قسمة مقدار جبري  
واحد على مقدار  
جبري واحد :

$$\frac{b^2 j^2}{b^4 j^4} = \frac{1}{b^2 j^2}$$

الناتج

تقسيم الأعداد وطرح الأسس للأساسات المتشابهة

قسمة مقدار جبري كثير الحدود على مقدار جبري واحد :

الخطوة الأولى توزيع المقام على كل حدود البسط

الخطوة الثانية طرح الأسس للأساسات المتشابهة

$$\frac{b^{2-4} + b^{2-6} + b^{2-8}}{b^{2-3} + b^{2-5} + b^{2-7}} = \frac{\frac{4}{2}b^3j^2 + \frac{6}{2}b^5j^10}{\frac{1}{2}b^2j^10} = \frac{4b^3j^2 + 6b^5j^10}{2b^2j^10}$$

الناتج

$$2 + 3b^6j^10$$

تابع لقواعد القسمة :

قسمة مقدار جبري كثير الحدود على مقدار جبري كثير الحدود :

المقسوم عليه

الخطوة الأولى نقسم

المقسوم

نغير اشارات حاصل الضرب ثم نطرح

من ناتج الخطوة الرابعة نكرر الخطوات السابقة

0 0

- 1- نقسم اول عنصر ( $s^2$ ) في المقسوم على اول عنصر (s) من المقسوم عليه
- 2- نضرب الناتج (s) في كل عناصر المقسوم عليه
- 3- نغير اشارات حاصل ضرب ( $s^2 - 10s$ ) - ( $s^2 + 5s$ ) الخطوة الثانية كاملة
- 4- نطرح الناتج بعد تغيير الاشارة (- $2s^2 - 10s$ )
- 5- نكرر الخطوات الاربعة مع ناتج الطرح (s)

ارشادات مهمة :

صفر	أي مقدار	صفر
$\frac{كمية غير معروفة}{صفر} =$	$\infty = \frac{\text{أي مقدار}}{صفر}$	$\frac{صفر}{أي مقدار} =$

لذلك يشترط لإجراء عملية القسمة أن لا يساوي المقام صفر

مثال (1) اختصر المقدار الجبري التالي :

$$\underline{\underline{72 \text{ل}^9 \text{م}^5}}$$

$$5 \text{ل}^3 \text{م}^7$$

الحل :

$$12 \text{ل}^{7-3} \text{م}^{3-5} = 12 \text{ل}^4 \text{م}^5 \quad (\text{لاحظ أن م صفر = واحد})$$

مثال (2) اختصر المقدار الجibriي التالي :

$$\underline{\underline{4 \text{ع}^2 \text{م}^5 + 5 \text{ع}^3 \text{م}^4}}$$

$$2 \text{ع}^2 \text{م}^2$$

الحل :

$$5 \text{ع}^3 \text{م}^4 + 4 \text{ع}^2 \text{م}^5$$

$$\frac{2 \text{ع}^2 \text{م}^5 + 3 \text{ع}^3 \text{م}^7}{\text{ع}^2 \text{م}^2}$$

مثال (3) اذا كان حاصل ضرب مقداران جبريان هو  $2s^2 - 5sc - 9s^2$  و كان احد المقدارين هو  $s - 5c$  اوجد المقدار الآخر ؟

الحل :

يتم اجراء عملية القسمة كما يلي :

$$\begin{array}{r|rr} & s - 5c & 2s^2 - 9sc \\ \hline & s + 2 & 2s^2 + 10sc \\ & & \hline & 5sc - 2sc & \\ & & \hline & 5sc + 2sc & \\ & & \hline 0 & 0 & \end{array}$$

ارشادات مهمة :

- يتم استخدام القسمة المطولة كالتالي يتم تقسيم المقدار الاول ( $2s^2$ ) على المقدار الاول المقسم عليه ( $s$ ) يكون الناتج ( $2s$ ) ونضعها اسفل المقسم عليه ثم نقوم بضرب الناتج السابق ( $2s$ ) بالمقسوم عليه كامل ( $s - 5c$ ) ونضع الناتج مع تغيير الاشارات ( $-2s^2 - 10sc$ ) اسفل المقسم ثم نطرح الناتج نعيد الخطوات السابقة من جديد : (نقسم ثم نضرب ثم نغير الاشارة ثم نطرح)

مثال (4) أوجد قيمة ع التي تجعل المقدار  $s^2 + 8s + \text{ع}$  تقبل القسمة على  $s + 3$  ؟

الحل :


يتم اجراء عملية القسمة كما يلي :

$$\begin{array}{r|l} s + 3 & s^2 + 8s + \text{ع} \\ \hline s + 5 & s^2 - 3s \\ & \hline & 5s + \text{ع} \\ & 15 - 5s \\ \hline 0 & 0 \end{array}$$

ارشادات مهمة :

- نلاحظ حتى يكون المقدار  $s^2 + 8s + \text{ع}$  يقبل القسم على  $s + 3$  فلا بد أن يكون  $\text{ع} - 15 = \text{صفر}$

# تحليل المقادير الجبرية



### **العامل المشترك :**

- يعني العنصر المكرر والرقم المشترك في جميع المقادير الجذرية

### **الفرق بين المربعين :**

- يطلق بين مقدارين بينهما اشارة سالب وقبل البدء بتطبيق القاعدة نقوم باستخراج العامل المشترك ان وجد ثم نطبق القاعدة التالية : ( الجذر الاول - الجذر الثاني ) ( الجذر الاول + الجذر الثاني )

### **الفرق بين مكعبين :**

- يطلق بين مقدارين بينهما اشارة سالب وقبل البدء بتطبيق القاعدة نقوم باستخراج العامل المشترك ان وجد ثم نطبق القاعدة التالية : ( الجذر الاول - الجذر الثاني ) ( مربع الاول + الجذر الاول  $\times$  الجذر الثاني + مربع الثاني )

### **مجموع المكعبين :**

- يطلق على المقادير المكعبين اللذان بينهما اشارة موجب نستخرج العامل المشترك ان وجد وتطبق عليهما القاعدة التالية : ( الجذر الاول + الجذر الثاني ) ( مربع الاول - الجذر الاول  $\times$  الجذر الثاني + مربع الثاني )

### **تحليل المقدار الثلاثي :**

- يتكون من ثلاثة مقادير جبرية يتم تحليلهم الى قوسين ويتوقف على اشارة الحد الثالث اما سالبة او موجبة :

#### **اشارة الحد الثالث موجبة :**

1. حاصل ضربهما = الحد الثالث
2. اشارتهما نفس اشارة الحد الأوسط
3. مجموع حاصل ضرب الطرفين = الحد الأوسط

#### **اشارة الحد الثالث سالبة :**

1. حاصل ضربهما = الحد الثالث
2. اشارتهما مختلفة احدهما موجب والأخر سالب و اشاره الاكبر نفس اشارة الحد الأوسط
3. مجموع حاصل ضرب الطرفين = الحد الأوسط

مثال (1) حل المقدار  $24s^3 - 15s^3$  ؟

الحل :

$$= 3s(8s^2 - 5s^2)$$

ارشادات مهمة :

- هنا نستخرج العامل المشترك بدأنا في البحث عن الأرقام والعناصر الأقل والمشتركة في المقدارين فأخذنا الأقل من س والأقل من ص واقررنا رقم مشترك في المقدارين لل 24 و 15 فكانت رقم 3 لأن  $(24 = 8 \times 3)$  ولأن  $(15 = 5 \times 3)$  لذا أصبح 3

مثال (2) حل المقدار  $25s^2 - s^2$  ؟

الحل :

$$= (5s - s)(5s + s)$$

ارشادات مهمة :

- بما أن لدينا مقدارين مربعين وبينهما إشارة سالب يعني نستخدم قاعدة الفرق بين مربعين  $(\text{الجزر الأول} - \text{الجزر الثاني}) (\text{الجزر الأول} + \text{الجزر الثاني})$
- في الخطوة الأولى بدأنا مباشرة في تطبيق القاعدة

مثال (3) حل المقدار  $64s^3 - 4s^2$  ؟

الحل :

$$= 4s(16s^2 - s^2)$$

$$= 4s(4s - s)(4s + s)$$

ارشادات مهمة :

- بما أن مقدارين مربعين وبينهما إشارة سالب يعني نستخدم قاعدة الفرق بين مربعين  $(\text{الجزر الأول} - \text{الجزر الثاني}) (\text{الجزر الأول} + \text{الجزر الثاني})$
- هنا بدأنا في استخراج العامل المشترك خطوة أولى ثم بدأنا في تطبيق قاعدة الفرق بين مربعين خطوة ثانية

مثال (4) حل المقدار  $27s^3 - 216s^3$  ؟

الحل :

$$= (3s - 6s) (9s^2 + 18s + 36)$$

$$= (s - 2) (s^2 + 2s + 4)$$

$$= (s - 2) (s^2 + 2s + 4)$$

ارشادات مهمة :

- بما ان المقادير بينهما اشارة سالب واسهها مكعب يعني نستخدم قاعدة الفرق بين مكعبين  
 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$
- بعد تطبيق القاعدة في الخطوة الاولى فلما بالبحث عن العامل المشترك في الخطوتين الاخيرتين

مثال (5) حل المقدار  $64a^3 + 125b^3$  ؟

الحل :

$$= (4a + 5b)(16a^2 - 20ab + 25b^2)$$

ارشادات مهمة :

- بما ان هنالك مقدارين مكعبين بينهما اشارة موجب يعني اننا نستخدم قاعدة مجموع المكعبين  
 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$
- $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a + 2\sqrt{ab} + b$

مثال (6) حل المقدار:  $m^2 - 42m + 13$  ؟

الحل :

$$= (m - 7)(m - 6)$$

ارشادات مهمة :

- بما ان هنالك ثلاثة مقادير جبرية يعني اننا سنستخدم قاعدة تحليل المقدار
- نرسم علامة اكس ونوزع العنصر المربيع كـ  $(m^2)$
- نوزع اشارة الحد الاوسط على العدين لأن اشارة الحد الثالث موجب لذا نأخذ اشارة الحد الاوسط
- يوجد عدين حاصل ضربهما يساوي الحد الثالث (42) والفرق يساوي الحد الاوسط فكانت (7)(6)
- لأن ضربهما يساوي 42 وأيضاً بعد عملية ضرب الاطراف ثم طرحهما من بعض يكون الفرق بينهما يساوي 1 ويساوي احد الاوسطين

مثال (7) حل المقدار:  $s^2 + s - 42 = ?$


الحل :

$$\begin{aligned} &= s(s^2 + s - 42) \\ &= s(s + 7)(s - 6) \end{aligned}$$

#### ارشادات مهمة :

- بما ان هنالك ثلاثة مقادير جبرية يعني اننا سنسخدم قاعدة تحليل المقدار
- نستخرج العامل المشترك لتسهيل العملية
- نرسم علامة اكس ونوزع العنصر المربع ك ( $s^2$ )
- نوزع الاشارات احدهما موجب والاخر سالب لأن اشارة الحد الثالث سالبة لذا تكون الاشارات مختلفة
- نوجد عديدين حاصل ضربهما يساوي الحد الثالث (42) والفرق يساوي الحد الأوسط فكانت (7 و 6)
- وياخذ الرقم الافضل 7 اشارة الحد الأوسط يعني موجب ورقم 6 تكون سالبة وللتتأكد من العديدين بعد عملية ضرب الاطراف ثم طرحهما من بعض يكون الفرق بينهما يساوي 1 ويساوي الحد الأوسط

# قواعد الأسس



### قواعد مهمة في الأسس :

- في الضرب اذا اتحدت الأساسات تجمع الأسس مثل ( $s^2 \times s^3 = s^{2+3} = s^5$ )
- في القسمة اذا اتحدت الأساسات تطرح الأسس مثل ( $s^5 / s^2 = s^{5-2} = s^3$ )
- في الجذر تقسم الأساس  $\sqrt{s^9} = s^{9/3} = s^3$
- في الأساس المرفوع بأسين مثل ( $(s^m)^n = s^{m \cdot n}$ ) نضرب الأساس  $m \times n$

مثال (1) : اختصر المقدار التالي =  $s^5 \times s^3$  ؟

الحل :

$$s^{3+5} = s^8$$

مثال (2) : اختصر المقدار التالي =  $s^5 / s^3$  ؟

الحل :

$$s^{5-3} = s^2$$

مثال (3) : اختصر المقدار التالي =  $\sqrt[3]{27s^3}$  ؟

الحل :

$$\sqrt[3]{s^3} = s^1$$

مثال (4) : اختصر المقدار التالي =  $\sqrt{16s^2}$  ؟

$$\sqrt{s^2} = s^1$$

ارشادات مهمة :

- اذا لم يكتب الاس في الجذر يعني انه تربيعي (2)

مثال (2) : اختصر المقدار التالي =  $(s^3)^4$  ؟

الحل :

$$s^{3 \times 4} = s^{12}$$

**قواعد مهمة في اللوغاريتمات :**

- هي قوة الاس المرفوع لأساس معين  $10^3$  لذلك تكون  $\log_{10} 1000 = 3$
- $\log_n n = \log n$
- $\log(s \times c) = \log s + \log c$
- $\log(s / c) = \log s - \log c$
- يكون اللوغاريتم واحد اذا كان الاس واحد مثل ( $\log 1 = 1$ ) او كان متساوياً مع الاس مثل ( $\log 10 = 1$ ) او اذا لم يكتب الاس وكان الاس عشرة مثل ( $\log 10 = 1$ )

مثال (1) : اوجد قيمة المجهول اذا كان  $\log_a 3 = 3$  ؟

**الحل :**

$$a^3 = 5$$

**ارشادات مهمة :**

تعني  $\log_a 5 = 3$  هي الاس و  $5$  هي قوة الاس و  $3$  هي قيمة اللوغاريتم او قوة الاس يكون  $a = 125$

مثال (2) : اوجد قيمة المجهول اذا كان  $\log_s 2 = 64$  ؟

**الحل :**

$$s^2 = 64$$

$$s^2 = 8$$

$$s = 8$$

**ارشادات مهمة :**

تعني  $\log_s 64 = 2$  هي قيمة اللوغاريتم و  $64$  هي قوة الاس و  $s$  هي الاس مجهول

مثال (3) : اوجد قيمة المجهول اذا كان  $3^L = 9$  ؟

الحل :

$$3^L = 9$$

$$3^L = 3^2$$

$$L = 2$$

ارشادات مهمة :

ارشادات مهمة :

9 تعني قوة الاس وقوة الاس تأتي من الاساس مرفوعا بالاس وبما ان الاس مجهول ( $L$ ) والاساس معروف (3) يكون الحل ( $3^L$ ) يساوي (9) ونبدأ بتحليل قوة الاس حتى نصل الى قيمة الاس

مثال (4) : اوجد قيمة المقدار التالي :

$$= 7\log 125 + 7\log 64 - 7\log 20 + 7\log 9$$

الحل :

$$= 7\log 125 + 7\log 64 - 7\log 20 + 7\log 9$$

$$= 7\log 5^3 + 7\log 4^3 - 7\log 5 + 7\log 4$$

$$= 7\log 5 + 7\log 3 + 7\log 4 - 7\log 3 + 7\log 2$$

$$= 2\log 7$$

ارشادات مهمة :

نبدأ بتحليل اللوغاريتم الى اصله مثل ( $\log 125^3$ ) تكون ( $\log 125$ ) وهكذا مع الباقي وفي حالة كان المقدار مثل ( $-3\log 20$ ) فالرقم (20) افضل تحليل له هو تفككه الى مقدارين متلما هو مذكور بقوانين اللوغاريتم فيكون هو نفسه ( $\log 5 + \log 4$ ) ثم بعد التحليل نقسم الاس المرفوع على كل لوغاريتم وهنا لا يوجد رقم نستطيع امام اللوغاريتم وهذا يعني نقسم (3 على 1) فيكون مثلًا ( $3\log 5$ ) وهكذا مع الباقي في النهاية نلغى المتعاكست مثل ( $-\log 3 - \log 5$ ) أي كل مشابه بالرقم و مختلف بالاشارة نلغيه ويتبقى لنا ( $2\log 7$  اي 2) لأن اي لوغاريتم اساسه مثل اسه كما جاء بالقوانين يعني 1 ولو قمنا باكمال الحل يكون ( $2 = 2 \times 1$ )

مثال (5) : أوجد قيمة المقدار التالي :

$$2/1 = 625_{\text{لو}} - 14_{\text{لو}} + 35_{\text{لو}} - 5_{\text{لو}}$$

الحل:

$$2/1 = 4_{\text{لو}}5^4 - 5_{\text{لو}}7 - 5_{\text{لو}}5 + 2_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}7 - 5_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}2$$


$$2 = 5_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}7 - 5_{\text{لو}}5 + 2_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}2$$

$$\text{صفر} = 1 - 1 - 2 =$$

ارشادات مهمة :

نبدأ بتحليل اللوغاريتم الى اصله مثل  $(2/1 = 625_{\text{لو}}5^4)$  ثم تكون  $(2 = 5_{\text{لو}}5)$  لاننا حللنا قيمة  $(625)$  الى  $(5^4)$  ثم قسمنا  $(2/1)$  على  $(4)$  لتكون  $(2)$  وهكذا مع البقية وفي حالة كان المقدار مثل  $(-5_{\text{لو}}5)$  فالرقم  $(35)$  افضل تحليل له هو تفككه الى مقدارين مثلاً هو مذكور بقوانين اللوغاريتم فيكون هو نفسه  $(-5_{\text{لو}}7 - 5_{\text{لو}}5)$  وهذا مع الرقم  $(+5_{\text{لو}}14)$  في النهاية نلغي المتعاكستات مثل  $(-5_{\text{لو}}7 \text{ مع } +5_{\text{لو}}7)$  أي كل متشابه بالرقم و مختلف بالاشارة نلغيه على الجميع فيبقى لنا  $(2 = 7_{\text{لو}}2 - 5_{\text{لو}}5 - 5_{\text{لو}}5)$  ولا ننسى ان اي لوغاريتم اساسه مثل اسه يكون 1 يعني  $(2 = 1 - 1 = \text{صفر})$

# التباديل والتوافق



### قواعد مهمة في التباديل :

التباديل : وهي تشير الى عدد طرق ترتيب الأشياء ويرمز لها  $(L)$  فمثلاً لدينا اشياء  $(n)$  نريد ترتيبها  $(r)$  فان عدد طرق الترتيب (التباديل) تكون :  ${}^n L_r$

$${}^n L_r = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots$$

يعني أننا عندما نريد استخراج طرق الاختيار لشيء ما كـ  $(n)$  فإننا نضرب  $(n)$  بشكل تنازلي بالرقم اللي يليه ثم الذي يليه بشرط ان يكون عدد مرات الضرب يمثل  $(r)$

مثال (1) : أوجد قيمة  $L$  :

$${}_2 L_5 =$$

الحل:

$$20 = 4 \times 5 = {}_2 L_5$$

مثال (2) : اختر الإجابة الصحيحة لقيمة  ${}_2 L_6$  :

- 256(A)      26(B)      36(C)      !6(D)  
الحل:

!6(J)

مثال (3) : بكم طريقة يمكن جلوس 4 اشخاص على 5 كراسي ؟

الحل:

$$\text{عدد الطرق} = {}_4 L_5 = 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120 \text{ طريقة}$$

### قواعد مهمة في التوافق :

تشير الى عدد طرق الاختيار لشيء ما يرمز له (ق) فمثلاً لدينا اشياء (ن) نريد ترتيبها (ر) فان عدد طرق الاختيار (التوافق) تكون :  ${}^n \text{ ق } r$

$${}^n \text{ ق } r = \frac{{}^n \text{ ق } n - 1 \times {}^n \text{ ق } n - 2 \dots \dots \text{ يستمر تناقص } (n) \text{ بعد } (r) \text{ بشكل تناظري}}{r - 1 \times r - 2 \dots \dots \text{ يستمر تناقص } (r) \text{ بعد } (r) \text{ بشكل تناظري}}$$

يعني أنتا عندما نريد استخراج طرق الاختيار لشيء ما كـ (ن) فإننا نبدأ بالمقام و نضرب (ن) بشكل تناظري بالرقم اللي يليه ثم الذي يليه بشرط ان يكون عدد مرات الضرب يمثل (ر) اما بالمقام نضرب (ر) بشكل تناظري بالرقم الذي يليه ثم الذي يليه بشرط أن يكون عدد مرات الضرب تمثل (ر)

حالات مهمة جداً :

$${}^n \text{ ق } n = 1 \quad {}^n \text{ ق } 0 = 1 \quad {}^n \text{ ق } r = {}^n \text{ ق } n$$

مثال (1) : أوجد قيمة ل :

$${}^5 \text{ ق } 2$$

الحل:

$$\text{طرق } {}^5 \text{ ق } 2 = \frac{4 \times 5}{1 \times 2} = 10$$

مثال (2) : إدارة بها 12 موظف نريد أن نختار منهم 3 لتكوين لجنة أحسب عدد طرق الإختيار ؟

الحل:

$$\text{عدد طرق الإختيار } = \frac{10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times 3} = {}^{12} \text{ ق } 3 \text{ طريقة}$$

مثال (3) : بفرض في المثال السابق اذا نص على أن مدير الإدارة لابد من اختياره احسب طرق الاختيار ؟

الحل:


$$\text{عدد طرق الإختيار } = \frac{9 \times 10 \times 11}{1 \times 2 \times 3} = {}^{11} \text{ ق } 3$$

مثال (4) : اوجد القيم التالية :  ${}^6 \text{ ق } 6$  ،  ${}^6 \text{ ق } 0$  ،  ${}^9 \text{ ق } 1$  ؟

الحل:

$${}^6 \text{ ق } 6 = 1 \quad {}^9 \text{ ق } 1 = {}^6 \text{ ق } 0$$

# ذات الحدين



قواعد مهمة في نظرية ذات الحدين :

$$(s + a)^n = +^n C_0 a^0 x s^n -$$

$$+^n C_1 a^1 x s^{n-1}$$

$$+^n C_2 a^2 x s^{n-2}$$

$$+^n C_n a^n x s^{n-n}$$

عند تفكيك ذات الحدين لابد أن يكون الحل مكون من  $(^n C_0 + \text{حد ثانى} + \text{حد أول} ^n)$

- نقطة الانطلاق في الاس لدى كل من ق والحد الثاني هي صفر ونستمر بالتصاعد حتى

نصل الى نفس قيمة الأس الموجودة بالمعادلة ( $n$ ) اما الحد الأول فيكون تحليلها بشكل عكس تبدأ من قيمة الأس ( $n$ ) وتستمر بالتنازل حتى تصل الى الصفر .

- بعد التحليل لابد أن تكون مجموع الأسسين في (الحد الأول) و (الحد الثاني) تساوي اس

المعادلة الاصلية ( $n$ )

- في النهاية نقوم بضرب نتيجة التحليل كل مرحلة على حدة ثم نجمع النتيجة

مثال (1) : اوجد مفكوكه  $(s + 2)^3$  ؟

الحل:

$$3 C_0 s^0 2 x 1 x 1 = s^3 + 3 s^2$$

$$2 C_1 s^1 2 x 3 = 6 s^2 +$$

$$1 C_2 s^2 2 x 12 = 12 s^1 +$$

$$8 = 0 C_3 s^3 2 x 3 +$$

$$8 + 12 s^1 + 6 s^2 + 3 s^3 = (s + 2)^3$$

مثال (1) : اوجد مفكوكه  $(3s - ch)^4$

الحل:

$$\begin{aligned} & q_0 s^4 + q_1 s^3 ch + q_2 s^2 ch^2 + q_3 s ch^3 + q_4 ch^4 \\ & = s^4 (3s^0 - ch)^4 \\ & = s^4 (3s^0 - ch)^2 (3s^1 - ch)^2 \\ & = s^4 (3s^0 - ch)^2 (9s^2 - ch^2)^2 \\ & = s^4 (3s^0 - ch)^2 (81s^4 - 108s^3 ch + 54s^2 ch^2 - 12s ch^3 + ch^4) \\ & = s^4 (81 - 108s^3 ch + 54s^2 ch^2 - 12s ch^3 + ch^4) \end{aligned}$$

ارشادات مهمة :

- نحل المعادلة الى  $(q + hd_2 + hd_1)$  :
- نبدأ بـ  $(3s^0, q_0, 3q_1, 3q_2, 3q_3)$  نلاحظ أننا بدأنا بالصفر للوصول الى قيمة الأس واستمررنا تصاعدياً حتى وصلنا الى قيمة الأس الأصلية الموجودة بالمعادلة .
- نبدأ بـ  $(2^0, 1^1, 2^2, 2^3)$  نلاحظ أننا بدأنا بالصفر للوصول الى قيمة الأس واستمررنا تصاعدياً حتى وصلنا الى قيمة الأس الأصلية الموجودة بالمعادلة .
- نبدأ بـ  $(s^3, s^2, s^1, s^0)$  نلاحظ أننا بدأنا بقيمة الأس الأصلية (3) واستمررنا تنازلياً حتى نصل الى الصفر .
- نبدأ بعملية الضرب ثم نجمع النتائج مع بعضها

قاعدة الحد العام لذات الحدين :

$$ح = ن ق ر (الثاني) ^r (الاول) ^n - r$$

دائماً تكون مقدار (ر) أقل من رتبة الحد بمقدار واحد

مثال (1) : اوجد الحد الخامس لمفكوكه  $(س + 3)^9$  ؟

الحل:

$$ح = 5 ، ر = 4 ، \text{ الاول} = س ، \text{ الثاني} = 3 ، ن = 9$$

$$ح = 5 ق 4^4 (س) ^3$$

$$ح = 5 س 10206$$

مثال (2) : اوجد الحد الرابع لمفكوكه  $(2س - 5ص)^7$  ؟

الحل:

$$ح = 4 ، ر = 3 ، \text{ الاول} = 2س ، \text{ الثاني} = 5ص ، ن = 7$$

$$ح = 4 ق 3^4 (5 - 2س)^3$$

$$ح = 4 ص 3 س^4 - 70000$$

ارشادات مهمة :

- نستخرج كل من رقم الحد (ح) والـ (ر) والـ (الاول) والـ (الثاني) و (ن)
- نبدأ بتطبيق قاعدة الحد العام
- نقوم بعملية ضرب الأرقام مع  $9 ق 3$  فقط

ملاحظة في عملية الضرب السابقة للحد العام يمكن لنا أن نستخدم الآلة الحاسبة وللتعويض نستخرج  $9 ق 3$  (C) هي (NCR) ثم علامة الضرب ثم 385- ثم ضرب 482 يستخدم الدالة (NCR) مثلاً : 7C3 الا (C) هي (NCR) ثم علامة الضرب ثم 385- ثم ضرب 482

**قاعدة الحد الأوسط لذات الحدين :**

ننظر للأس إن كان فردي او زوجي لكي نعرف رتبة الح :

- فردي : يكون هناك حدان اوسطان هما  $(n+1/2)$  و  $(n+3/2)$
- زوجي : يكون هناك حد اوسط واحد هو  $(n+2/2)$

مثال (1) : أوجد الحد الأوسط لمفكوكه  $(s + 5)^{11}$  ؟

**الحل:**

الأس(11) : فردي اذاً هناك حدان اوسطان

رتبة الحدين :  $7 = 2/3 + 11$      $6 = 2/1 + 11$

$$ح = 6^{11} \times 5^5 \times s^4$$

$$ح = 6^{1250} \times 462 \times s^4$$

$$ح = 577500 \times s^4$$

$$ح = 6^{11} \times 5^6 \times s^5$$

$$ح = 1250 \times 462 \times s^5$$

$$ح = 577500 \times s^5$$

مثال (2) : أوجد الحد الأوسط لمفكوكه  $(s - 2)^{10}$  ؟

**الحل:**

الأس(10) : زوجي اذاً هناك حد اوسط واحد

رتبة الحدين :  $6 = 2/2 + 10$

$$ح = 6^{10} \times 5^2 - \times s^5$$

$$ح = 32 \times 252 \times s^5$$

$$ح = 8064 - \times s^5$$

**قاعدة الحد الخالي من س لذات الحدين :**

تستخدم هذه القاعدة في حال كانت (ر) مجهمولة وغير معروفة :

- الحاد الخالي من س يعني اوجد الحد من خلال قيمة سين الخالية (صفر)
- نبدأ بتطبيق قاعدة الحد العام حتى وان كانت (ر) غير معلومة
- عند توزيع الاس في الحد الأول او الحد الثاني كما في قاعدة الحد العام قد يكون هناك قسمة مثلًا  $(\frac{4}{s})^3$  نغير اشارة اس المقام (س) فقط لتصبح س<sup>-3</sup>
- بعد الانتهاء من تطبيق قاعدة الحد العام نوجد قيمة (ر) ومن ثم رتبة الحد بتطبيق القاعدة التالية :
- (الاس المعروف على س = صفر) لأن الصفر هو الحد الخالي من س ونبدء بالتحليل

**مثال (1) : أوجد الحد الخالي من س لمفكوكة  $(s - \frac{4}{s})^{12}$  ؟**

**الحل:**

$$\text{نطبق الحد العام : } h = r^{n-r} \quad r \text{ (الثاني)} \quad n \text{ (الاول)}$$

$$h = r^{12} \quad r = \frac{4}{s} \quad n = s^{-12} \quad r = s^{-r}$$

$$h = r^{12} \quad r = s^{-r} \quad X \quad (s^{-r})^{12} \quad r = s^{-12-r}$$

$$h = r^{12} \quad r = (4s^{-r})^{12} \quad r = s^{12-2r}$$

$$\text{نستخرج الحد الخالي من س الذي هو (س)^{12-2r}}$$

$$12-2r = \text{صفر}$$

$$12 = 2r$$

$$6 = r$$

$$\text{قيمة (ر) = 6}$$

$$\text{رتبة الحد = (ر) + 1}$$

$$\text{رتبة الحد = } 1+6=7$$

لأن قيمة (ر) دائمًا أقل من رتبة الحد بمقدار واحد لهذا نضيف واحد مع ال (ر)

**قاعدة الحد المحدد باحدى خصائص ذات الحدين :**

تستخدم هذه القاعدة في حال كانت (ر) مجهولة وغير معروفة :

- الحد المحدد باحدى خصائص ذات الحدين يعني أن يوجد الحد من خلال قيمة معينة محدد مثل (س4)
- نبدأ بتطبيق قاعدة الحد العام حتى وإن كانت (ر) غير معروفة
- عند توزيع الاس في الحد الأول او الحد الثاني كما في قاعدة الحد العام قد يكون هنالك قسمة مثلاً  $(\frac{3}{s})^3$  نغير اشارة اس المقام (س) فقط لتصبح س<sup>-3</sup>
- بعد الانتهاء من تطبيق قاعدة الحد العام نوجد قيمة (ر) ومن ثم رتبة الحد بتطبيق القاعدة التالية :
- **(الاس المرفوع على س = قيمة الخاصية المذكورة بالسؤال ) ونبعد بالتحليل**
- عند الانتهاء تكون قيمة (ر) التي ظهرت + 1 هي رتبة الحد

مثال (1) : أوجد الحد الذي يحتوي على س4 لمفكوكه  $(s - \frac{4}{s})^{12}$  ؟

الحل:

$$\text{نطبق الحد العام : } h = r^n \cdot (a_1)^{n-r}$$

$$h = r^{12} \cdot (\frac{4}{s})^{12} \cdot s^{r-12}$$

$$h = r^{12} \cdot (\frac{4}{s})^{12} \cdot s^{r-12}$$

$$h = r^{12} \cdot (\frac{4}{s})^{12} \cdot s^{r-2}$$

نستخرج الحد الذي يحتوي على س4 من  $(s^{r-2})^{12}$

$$4 = 2r - 2$$

$$2r = 4 - 2$$

$$2r = 8$$

$$r = 4$$


$$\text{قيمة (ر) = 4}$$

$$\text{رتبة الحد = (ر) + 1}$$

$$\text{رتبة الحد = } 5 = 1 + 4$$

لأن قيمة (ر) دائمًا أقل من رتبة الحد بمقدار واحد لذا نضيف واحد مع ال (ر)

# المعادلات



## قواعد مهمة للمعادلات الخطية في مجهول واحد :

- $4s + 5 = s - 3$  يتم في هذه الحالة : نقل العناصر المتشابهة في طرف والأرقام في الطرف الآخر مع مراعاة تغير الأشارة ثم نبدأ بالتحليل
- $4s/5 = s/3$  يتم في هذه الحالة : في حال كانت هنالك قسمة معاذلتين احدهم باليمن والآخر باليسار يكون حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين ثم نبدأ بالتحليل
- $4s/5 + 1/3 = s/3$  يتم في هذه الحالة : في حال كانت هنالك قسمة اكثـر من معاذلة باليمن وواحدة باليسار لابد من توحيد المقامات أولاً للطرف اليمن و تكون عملية الضرب مثل كلمة ( لا ) المقام في المقام ثم المقام الأول في بسط الثاني والمقام الثاني في بس الاول ثم نعود للقاعدة الثانية حاصل ضرب الطرفين = حاصل ضرب الوسطين ثم نبدأ بالتحليل
- $(s+2)+(5+7) = (3s-11)+(12)$  يتم في هذه الحالة : في حالة كانت هنالك معاذلة بها أقواس لابد أن نبدء في فك الأقواس أولاً ثم البدء في نقل العناصر المتشابهة

**مثال (1) :** أوجد المعادلة التالية :  $s + 5 = s - 3$  ؟

**الحل:**

$$5 - 3 - s = s$$

$$8 - s = 3s$$

$$2.67 = 3/8 - s$$

**مثال (2) :** أوجد المعادلة التالية :  $3s + 5/1 + 2 = s - 3/1$  ؟

**الحل:**

$$(s+3)5 = (1-s)2$$

$$5s - 10 = 2s + 3$$

$$8 - s = s$$

$$8 = 2s$$

مثال (3) : أوجد المعادلة التالية :  $s - 3 / 1 - 2 / 7 = s - 9 / 11$  ؟

الحل:

$$s - 9 / 11 = 6 / (7 - 4s) + 2 / (5 - s)$$

$$s - 9 / 11 = 6 / 21 - 2s + 2 / 12$$

$$s - 9 / 11 = 6 / 23 - 22s$$

$$(11 - s) / 9 = (23 - 22s) / 7$$

$$11 - s = 161 - 154s$$

$$11 - 161 = 154s - s$$

$$95 = s - 100$$

$$0.95 = s - 100$$

مثال (4) : أوجد المعادلة التالية :  $2(ص + 5) + 3(ص - 7) = 12 + (11 - 3ص)$  ؟

الحل:

$$2ص + 10 + 3ص - 21 = 35$$

$$5ص - 11 = 35 + 4 - 12$$

$$5ص = 12$$

$$ص = 2 / 12$$

### قواعد مهمة المعادلات الخطية في مجهولين :

- يجب أن تكون عدد المعادلات يساوي عدد المجهولين
- أولاً خطوة يجب أن نرتب المعادلة الأحرف المتشابهة تحت بعض والأرقام تحت بعض
- نضرب معامل المعادلة الأولى في المعادلة الثانية ونضرب معامل المعادلة الثانية في المعادلة الأولى
- بعد عملية الضرب نرتب المعادلتين تحت بعض ثم نطرحهما من بعض
- بعد الطرح نحل والناتج نوضع من خلالها المعادلة الأولى
- ناتج تعويض المعادلة الأولى نوضع من خلاله بالمعادلة الثانية لنسخراج المجهول الثاني

مثال (4) : حل المعادلتين :  $5s + 2c = 12$  و  $7s - 3c = 11$  ؟

الحل:

$$35s + 14c = 84$$

$$\underline{55s - 15c = 55}$$

$$29c = 29$$

$$c = 29/29 = 1$$

بالتقسيم في المعادلة الأولى عن قيمة  $c$  :

$$5s + 2c = 12$$

$$12 = (1) 2 + 5s$$

$$12 = 2 + 5s$$

$$2 - 12 = 5s$$

$$10 = 5s$$

$$s = 10/5 = 2$$

$$s = 2 \text{ و } c = 1$$

### ارشادات مهمة :

نضرب معامل  $s$  ( 7 ) في المعادلة الثانية في المعادلة الأولى كاملة ونضرب معامل  $s$  ( 5 ) في المعادلة الأولى في المعادلة الثانية كاملة ثم نرتب المعادلتين ثم نطرحهما من بعض ثم نحل حتى نصل إلى قيمة  $c$  والتي تساوي ( 1 ) ثم نوضعها في المعادلة الأولى لتصبح  $(5s + 2c = 12)$  ثم نحللها حتى نصل إلى قيمة  $s$  والتي تساوي ( 2 ) عندما يكون الحل قيمة  $c$  ( 1 ) وقيمة  $s$  ( 2 )

### قواعد مهمة للمعادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد :

- يجب أن تحتوي المعادلة على تكعيب
- يجب أن تكون على الصورة التالية ( $As^2 + Bs + C = 0$ )
- يمكن حل المعادلة بطرقين أما بالتحليل أو باستخدام القانون العام التالي :

$$s = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

( + أو - ) معنى هذا اننا نستخرج حلين الاول بالموجب والثاني بالسالب

مثال (1) : حل المعادلة التالية :  $12s^2 + 4s - 33 = 0$  ؟

**الحل:**

$$12s^2 + 4s - 33 = 0$$

الحل باستخدام القانون :

$$A = 12, B = 4, C = -33$$


$$s = \frac{(33 - s \times 12 \times 4) - \sqrt{16}}{12 \times 2}$$

$$s = \frac{40 - (4 + s)}{24}$$

$$s = 24 / (40 + s)$$

$$s = 24 / (40 - s)$$

# المتواليات



### قواعد مهمة في المتولية العددية :

- **المتولية العددية :**  
هي متسلسلة أعداد يكون فيها الفرق بين أي حد والسابق له مقدار ثابت .
- **رموزها :**  
 $\text{الحد الاول} = \text{أ}$        $\text{المقدار الثابت(اساس المتولية)} = \text{د}$        $\text{رتبة الحد(عدد الحدود)} = \text{n}$   
 $\text{الحد الاخير} = \text{L}$        $\text{الحد العام} = \text{Hn}$        $\text{مجموع المتولية} = \text{Jn}$
- **قوانين المتولية العددية :**
  - قاعدة الحد العام للمتولية العددية :  $Hn = \text{أ} + (\text{n} - 1) \cdot \text{د}$
  - قاعدة مجموع المتولية العددية بمعلوم الحد الاخير :  $Jn = \frac{\text{n}}{2} [\text{أ} + \text{L}]$
  - قاعدة مجموع المتولية العددية بمعلوم اساس المتولية :  $Jn = \frac{\text{n}}{2} [\text{أ} + (\text{n} - 1) \cdot \text{د}]$
- **ملاحظة مهمة :**  
في المتولية العددية عندما نرغب في استخراج الاساس من الحدين نقوم بطرحهما

مثال (1) : في المتولية التالية 3 ، 7 ، 11 ، ..... أوجد التالي :

- 1 حدد نوع المتولية
  - 2 اساس المتولية
  - 3 الحد الخامس
  - 4 الحد التاسع
  - 5 مجموع العشر حدود الاولى من المتولية ؟
- الحل:

$$\text{بما أن } 11 - 7 = 4 \quad \text{و} \quad 7 - 3 = 4$$

$$\text{اذن الفرق مقدار ثابت} = 4$$

1- نوع المتولية : متولية عددية

2- اساس المتولية :  $\text{d} = 4$

3- الحد الخامس :  $H5 = \text{أ} + 4 \cdot \text{d}$

$$19 = 4 \times 4 + 3 =$$

4- الحد التاسع :  $H9 = \text{أ} + 8 \cdot \text{d}$

$$35 = 4 \times 8 + 3 =$$

5- مجموع العشر حدود الاولى من المتولية :

$$ج_{10} = \frac{n}{2} [\text{أ} + (\text{n} - 1) \cdot \text{d}]$$

$$ج_{10} = \frac{10}{2} [4 \times 9 + 3 \times 2] =$$

$$(36 + 6) \cdot 5 =$$

$$(42) \cdot 5 =$$

$$210 =$$

مثال (2) : في المتواالية التالية 70 ، 65 ، 60 ، ..... ، 25 أوجد التالي :

حدد نوع المتواالية ، اساس المتواالية ، الحد السادس ، مجموع العشر حدود الأولى من المتواالية ،  
عدد حدود المتواالية

الحل:

$$\text{بما أن } 65 - 5 = 70 \text{ و } 60 - 5 = 65 \text{ إذن الفرق مقدار ثابت} = 5$$

-1 نوع المتواالية : متواالية عددية

-2 اساس المتواالية :  $d = 5$

-3 الحد السادس :  $a_6 = 25 + 5 = 30$

$$45 = 5 - X 5 + 70 =$$

-4 مجموع العشر حدود الأولى من المتواالية :

$$J_n = n / 2 (a_1 + a_n)$$

$$(5 - X 9 + 70 X 2) 2/10 = J_{10}$$

$$(45 - 140) 5 =$$

$$(95) 5 =$$

$$475 =$$

-5 عدد حدود المتواالية : الحد الأخير  $= l = a + (n - 1)d$

$$5 - X (1 - n) + 70 = 25$$

$$5 + n - 70 = 25$$

$$n - 75 = 25$$

$$n = 25 + 75 = 50$$

$$n = 50 / 5 = 10$$

$$n = 10$$

مثال (3) : متواالية عددية مجمهوها 864 وحدتها الأولى 9 وحدتها الأخيرة 99 أوجد عدد المتواالية واساس المتواالية ؟

الحل:

عدد حدود المتواالية :

$$J_n = n / 2 (a + l)$$

$$(99 + 9) / 2 = n / 864$$

$$108 X 2 / n = 468$$

$$n = 468 / 108 = 54$$

$$n = 54 / 468$$

$$n = 16$$

اساس المتواالية : لاستخراجها نستخدم الحد الأخير

$$l = a + (n - 1)d$$

$$99 = 9 + 15d$$

$$15d = 99 - 9 = 90$$

$$d = 90 / 15 = 6$$

### قواعد مهمة في المتولية الهندسية :

#### • المتولية الهندسية :

هي متسللة أعداد خارج قسمة أي حد فيها على الحد السابق له مباشرة مقدار ثابت .

#### • رموزها :

المقدار الثابت(اساس المتولية) =  $r$       مجموع ن من الحدود =  $J_n$

الحد الاول =  $a$       الحد العام =  $a_n$       رتبة الحد(عدد الحدود) =  $n$

#### • قوانين المتولية الهندسية :

-1. قاعدة الحد العام لمتولية هندسية واحدة :  $a_n = ar^{n-1}$

-2. قاعدة مجموع عدد معين من الحدود :  $J_n = a(r^n - 1) / (r - 1)$

-3. قاعدة مجموع المتولية الى مالانهاية :  $J_{\infty} = a / (1 - r)$

#### • ملاحظة مهمة :

في المتولية الهندسية عندما نرغب في استخراج الاساس من الحدين نقوم بقسمتها

مثال (1) : في المتولية 4 ، 8 ، 16 .... أوجد الحد العاشر ومجموع العشر حدود الأولى من المتولية ؟

الحل:

$$\text{نجد أن } 8 / 4 = 2 \quad \text{و} \quad 2 = 16 / 8$$

$$\text{اذن المتولية هندسية واساسها } r = 2$$

$$\text{الحد العاشر } J_{10} = a(r^{n-1})$$

$$J_{10} = 2^9 \times 4$$

$$J_{10} = 2048$$

مجموع العشر حدود الأولى من المتولية :

$$J_{10} = a(r^{n-1}) / (r - 1)$$

$$J_{10} = 4 / (1 - 2) = 4 / (1 - 2^{10})$$

$$J_{10} = 4 / (1 - 2^{10}) = 4 / (1 - 1023)$$

$$J_{10} = 4 / (1023) = 4 / 1023$$

$$J_{10} = 1023 \times 4 = 4092$$

$$J_{10} = 4092$$

مثال (2) : في المتواالية التالية : 729 ، 243 ، 81 اوجد الحد الثامن ومجموع العشر حدود الاولى ومجموع المتواالية الى مالانهاية ؟

الحل:

$$\text{نجد أن } 3/1 = 243/81 = 729/3 \text{ و}$$

اذن المتواالية هندسية واساسها  $r = 3/1$

$$\text{الحد الثامن } h_8 = a(r^{n-1})$$

$$h_8 = 3/1 \times 729 = 8$$

$$h_8 = 0,333$$

مجموع العشر حدود الاولى من المتواالية :

$$S_n = a(r^{n-1}) / (r - 1)$$

$$S_{10} = 1 - 3/1 / (1 - 3/1)^{10} = 729$$

$$S_{10} = 1093.5$$

مجموع المتواالية الى مالانهاية :

$$S = a / (1 - r)$$

$$(3/1) - 1 / 729 = \infty \Rightarrow$$

$$S = 1093.5 = \infty \Rightarrow$$

مثال (3) : اوجد مجموع المتواالية : 199 ، 99.5 ، 49.75 ، ... الى مالانهاية ؟

الحل:

$$a = 199$$

$$r = (99.5 / 49.75) = 0.5 = (199 / 99.5)$$

اذن المتواالية هندسية واساسها  $r = 0.5$

مجموع المتواالية الى مالانهاية :

$$S = a / (1 - r) = \infty \Rightarrow$$

$$(0.5 - 1 / 199) = \infty \Rightarrow$$

$$S = 1.5 / 199 = \infty \Rightarrow$$

$$S = 132.66 = \infty \Rightarrow$$

مثال (4) : متولية هندسية حدتها الرابع 192 وحدتها السابع 12228 .. اوجد المتولية :

الحل:

نرى المعطيات المتوفرة بالسؤال :

$$12228 = a r^6$$

$$192 = a r^3$$

في المتولية الهندسية :

عندما نريد ان نستخرج اساس المتولية نقسم حدين بعكس المتولية العددية التي نطرح فيها الحدين

$$12228 = a r^6$$

$$192 = a r^3$$

تذهب الالف مع الالف ونقسم ( $r^6$ ) على ( $r^3$ ) ولأن الأساس متساوي نطرح الأساس في القسمة =  $r^3$

$$12228 \text{ على } 192 = 64$$


$$r^3 = 64$$

لأن  $r$  تكعيب نستخرج جذر 64

$$\sqrt[3]{64} = r$$

$$r = 4$$

# المحددات والمصفوفات



قواعد مهمة في المحددات :

المحددات تنقسم المحددات الى نوعين محددات :

- محددات من المرتبة الثانية : وتكون عدد الصفوف اثنين وعدد الاعمدة اثنين
- محددات من المرتبة الثالثة وتكون عدد الصفوف ثلاثة وعدد الاعمدة ثلاثة

ايجاد قيمة المحددات :

1- المرتبة الثانية :

نقوم بعملية الضرب كعلامة اكس (وسطين في طرفي) ونطرح الناتج

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

2- المرتبة الثالثة :

توزيع الإشارات على الصف الاول بالترتيب التالي :

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ 2 & 5 & 4 \\ 7 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array}$$

نتعامل مع كل رقم من ارقام الصف الاول كمحدد مستقلة من المرتبة الثانية مراعاة الاشارات التي تم توزيعها وكل رقم يأخذ الارقام التي بالاسفل ماعدا الارقام التي تكون تحته مباشرة ثم نقوم بايجاد قيمة كل محدد بالضرب كعلامة اكس ثم نطرح مثلاً نقوم به بمحددات المرتبة الثانية

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \quad \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 - \quad \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

استخدام المحددات بحل المعادلات الخطية من مجهولين :

$$5s - c = 16$$

$$5s + c = 2$$

$$\begin{vmatrix} 16 & 5 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = c \Delta \quad \begin{vmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = s \Delta \quad \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \Delta$$

نستخرج ثلاثة محددات :

المحدد العام = نأخذ معامل المجهولين س و ص

محدد س = نأخذ الناتج ثم معامل ص

محدد ص = نأخذ الناتج ثم معامل س

نقوم بالتعامل مع كل محدد كما نتعامل مع محددات المرتبة الثانية بالضرب بطريقة اكس ثم نطرح الناتج

$$1 - = \frac{7}{7} = \frac{c \Delta}{\Delta} \quad 27 = \frac{21}{7} = \frac{s \Delta}{\Delta}$$

بعد ايجاد قيمة كل محدد نقوم بتقسيم نتيجة محدد س على نتيجة المحدد العام وايضاً نتيجة محدد ص على نتيجة المحدد العام وبذلك تكون قد اوجدنا حل المعادلة الخطية في مجهولين

مثال (1) : أوجد قيمة المحدد التالي :

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 7 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\text{قيمة المحدد} = (7 \times 3) - (8 \times 5)$$

$$19 = 21 - 40 =$$

مثال (2) : أوجد قيمة المحدد التالي :

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 - \\ 6 & 4 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\text{قيمة المحدد} = (1 - \times 4) - (6 \times 3 -)$$

$$14 - = 4 + 18 - =$$

ملاحظة :

حاصل ضرب  $(1 - \times 4) = -4$  ولكن لأن هناك اشارة سالب قبل القوس تصبح موجب 4 لأن  $-4$  في سالب = 4

مثال (3) : استخدم المحددات في حل المعادلات التالية :

$$2s + 3c = 7$$

$$10 - - 2c = 4$$

الحل:

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 10 - & 4 \end{vmatrix} = c \Delta \quad \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 - & 10 - \end{vmatrix} = s \Delta \quad \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 - & 4 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$(2 \times 4) - (10 - \times 7) = c \Delta \quad (3 \times 10 -) - (2 - \times 2) = s \Delta \quad (3 \times 4) - (2 - \times 7) = \Delta$$

$$87 - = 8 - 70 - = c \Delta \quad 26 = 30 + 4 - = s \Delta \quad 26 - = 12 - 14 - = \Delta$$

الآن يمكن الحصول على قيمة  $s$  وقيمة  $c$  كماليي :

$$1 - = 26 - /26 = \Delta / s$$

$$3 = 26 - /78 - = \Delta / c$$

مثال (4) : أوجد قيمة المحدد التالي :

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 5$$

$$(0 - 7) 2 + =$$

$$7 - x - 2 + =$$

$$14 + =$$

$$(0 - 2) 4 - =$$

$$2 - x - 4 - =$$

$$8 - =$$

$$(21 - 2 -) 5 + =$$

$$21 - x - 5 + =$$

$$115 - =$$

قيمة المحدد  $= 109 - = 14 + 8 - 115 - =$

قواعد مهمة في المصفوفات :

لإجراء أي عملية جبرية على المصفوفات لابد أن تكون عناصر المصفوفتين متساوية

العمليات الجبرية :

الجمع  $A + B$  :

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} = B + A$$

في عملية الجمع نقوم بجمع كل عنصر مع العنصر الذي يقابلة من المصفوفة الأخرى

الطرح  $A - B$  :

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A - B$$

نبدأ بعملية ضرب كل عنصر من مصفوفة (A) بـ (B) ثم نطرح الناتج من مصفوفة (B)

الضرب  $A \cdot B$  :

الخطوة الأولى : نضرب عناصر الصف الأول بالمصفوفة الاولى بعناصر العمود الاول بالمصفوفة الثانية  
 الخطوة الثانية : نضرب عناصر الصف الثاني بالمصفوفة الاولى بعناصر العمود الثاني بالمصفوفة الثانية  
 الخطوة الثالثة : نجمع حاصل الضرب

تابع قواعد مهمة في المصفوفات :

مدور المصفوفة أ =

تحويل الصف الى عمود

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = / \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \quad \text{أ}$$

تعني هذه العلامة ( أ ) المائلة مدور المصفوفة يعني ان نبدل الصف لعمود والعمود لصف

مقلوب المصفوفة أ<sup>-1</sup> :

مقلوب المصفوفة = 1 / المحدد X مصفوفة المرافق المبدلة

الخطوة الثانية مصفوفة المرافق المبدلة

الخطوة الاولى محدد المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \quad \begin{array}{l} \text{تبديل اماكن عناصر القطر الرئيسي} \\ \text{تبديل اماكن عناصر القطر الرئيسي} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \quad \begin{array}{l} (5 \times 4) - (7 \times 2) = \\ 20 - 14 = \end{array} \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} = \quad \begin{array}{l} 6 - = \\ 6 - = \end{array}$$

الخطوة الثالثة تطبيق قاعدة مقلوب المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times 6 / 1 = 1$$

لتطبيق قاعدة مقلوب المصفوفة نحتاج الى ثلاثة خطوات :

الخطوة الاولى : نستخرج محدد المصفوفة وذلك كما نعرف في موضوع المحددات نضرب الطرفين والوسطيين ثم نطرحهما من بعض

الخطوة الثانية : نستخرج مصفوفة المرافق المبدلة وذلك بتبدل اماكن عناصر القطر الرئيسي اما عناصر القطر الآخر فيتم تغيير اشارات عناصرها فقط .

الخطوة الثالثة : نستطيع الان تطبيق قاعدة مقلوب المصفوفة لاننا استخرجنا محدد المصفوفة وايضا نستخرجنا مصفوفة المرافق المبدلة في الخطوات السابقة

