

(1) إذا علمت أن أحد الأساتذة يدعى توافر ثلاثة أنواع من المراجع الخاصة بمقررة ويرمز لها بالأحرف A,B,C فإن توافر المرجع الأول A فقط يرمز له :-

أ - $A \cup B \cup C$

ب - $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

ج - $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

د - $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

(2) إذا علمت أن أحد المطاعم الشهيرة يقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الوجبات A , B, C فأن توافر الوجبة C يمكن الرمز له بالرمز :-

أ - $A \cup B \cup C$

ب - $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

ج - $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$

د - $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

(3) إذا علمت أن : $P(B | A) = 0.52$ و $P(A \cap B) = 0.026$ فأن قيمة الاحتمال $P(B | A)$ تساوي :

أ - 0.05

ب - 0.5

ج - 5

د - 0.1

(4) في تجربة على نوع معين من الامراض الوراثية وجد ان احتمال اصابة احد الاشخاص بمرض A هو 0.45 واحتمال الاصابة بالمرض A و B معا هو 0.045 فما هو احتمال اصابته بالمرض B علما بأنه قد اصيب بالمرض A من قبل :

أ - 0.45

ب - 10

ج - 0.25

د - 0.1

اجب عن الفقرات (5,6,7) ب استخدام المعلومات التالية :-

في تجربة لإلقاء زهر النرد قام احد الأشخاص برمي زهر النرد خمس مرات (5 مرات) وكان مهم بظهور الوجه 6 فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع شانى الدين اوجد الاحتمالات التالية :-

(5) احتمال ظهور الوجه 6 في ثلاثة رميات من الخمس رميات :

- أ- 0.393216
- ب- 0.453437
- ج- 0.3215
- د- 0.03215

(6) القيمة المتوقعة للتوزيع المعبر عن عدد مرات ظهور الوجه 6:

- أ- 0.8333
- ب- 0.1667
- ج- 0.6
- د- 5

(7) قيمة التباين للتوزيع المعبر عن عدد الوحدات المعيبة :

- أ- 0.1667
- ب- 5
- ج- 0.8333
- د- 0.6944

اجب عن الفقرات (8,9,10) باستخدام المعلومات التالية :

احد الكليات الجامعية وجدت انه من بين كل 200 طالب هناك 40 طالب لا يتحدثون اللغة العربية كلغة اولى أخذت عينه مكونه من ستة طلاب (6 طلاب) فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع ثانوي الحدين اوجد الاحتمالات التالية :

(8) احتمال أن يكون من بينهم طالب واحد لا يتحدث اللغة العربية كلغة اولى :

- 0.393216
- 0.453437
- 0.878352
- 0.492453

(9) القيمة المتوقعة للتوزيع المعيّر عن عدد الطلاب الذين لا يتحدثون اللغة العربية كلغة اولى :

- 0.6
- 1.2
- 0.1
- 0.06
- 5

(10) قيمة التباين للتوزيع المعيّر عن عدد الوحدات المعيّنة :


- 0.6
- 0.96
- 0.79
- 0.73

(11) إذا علمت أن متوسط عدد الأخطاء التي يقع بها احد الكتاب يبلغ 5 أخطاء في الساعة احسب احتمال وقوع أربع أخطاء إذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع توزيع بواسون :

- 5
- 0.175467
- 0.006738
- 4

(12) إذا علمت أن متوسط عدد الاهداف التي تقوم إحدى الطائرات المقاتلة باصابتها هو 4 اهداف يوميا احسب احتمال اصابة ثلاثة اهداف اذا علمت ان هذه الظاهرة تتبع توزيع بواسون :

- 4
- 0.25
- 0.1954
- 1.1722



اجب عن الفقرات (13,14,15,16) باستخدام المعلومات التالية :

$$A = \{0,1,2,3,4,5\}$$

$$B = \{4,5,6,7,8\} U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$$

(13) المجموعة $(A \cup B)$ تساوي :

- أ - $\{8,7,6\}$
- ب - $\{3,2,1,0\}$
- ج - $\{5,4\}$
- د - $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

(14) المجموعة $(A \cap B)$ تساوي :

- أ - $\{8,7,6\}$
- ب - $\{0,1,2,3\}$
- ج - $\{4,5\}$
- د - $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

(15) المجموعة $(A - B)$ تساوي :

- أ - $\{8,7,6\}$
- ب - $\{3,2,1,0\}$
- ج - $\{4,5\}$
- د - $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

(16) المجموعة $(B-A)$ تساوي :

- أ - $\{8,7,6\}$
- ب - $\{3,2,1,0\}$
- ج - $\{4,5\}$
- د - $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$

أجب عن الفقرات (17,18) باستخدام المعلومات التالية :

إذا علمت أن أحد الشركات تمتلك ثلاثة سيارات لتوصيل المنتجات A,B,C تقوم السيارة الأولى بتوصيل 30% من الانتاج واما السيارة الثانية فتقوم بتوصيل 35% من الانتاج والباقي من نصيب السيارة الثالثة ف اذا كانت نسبة الانتاج الذي يفسد اثناء التوصيل على الترتيب 5% و 7% و 9% سحبت وحده واحده عشوائيا من الوحدات الموزعة على السيارات احسب الاحتمالات التالية :

(17) احتمال أن تكون الوحدة المسحوبة فاسدة :

- أ- $0.25 \times 0.96 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$
- ب- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$
- ج- $0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09$
- د- $0.70 \times 0.05 + 0.65 \times 0.07 + 0.65 \times 0.09$

(18) احتمال أن تكون الوحدة فاسدة ومن نصيب السيارة الثانية :

- أ- $\frac{0.35 \times 0.07}{0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09}$
- ب- $\frac{0.45 \times 0.04}{0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.074 + 0.35 \times 0.06}$
- ج- $\frac{0.06 \times 0.35}{0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06}$
- د- $\frac{0.30 \times 0.09}{0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09}$

اجب عن الفقرات (19,20,21) باستخدام المعلومات التالية :

في دراسة الظاهرة متوسط طول الطالب في المرحلة الجامعية وجد ان متوسط طول الطالب يبلغ 170 سم وذلك ب انحراف معياري قدره 10 سم تم اختيار احد الطلاب عشوائيا ف اذا علمت ان هذه الظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي ف اوجد :

$$P(150 < x < 190) \text{ احتمال أن ينحصر طول الطالب بين 150 سم و 190 سم (19)}$$

- أ- 68.26%
- ب- 95.45%
- ج- 99.74%
- د- 89.74%

$$P(x < 180) \text{ احتمال أن يكون الطالب اقل من 180 سم (20)}$$

- أ- 68.26%
- ب- 95.45%
- ج- 99.74%
- د- 84.13%

$$P(x > 160) \text{ احتمال أن يكون طول الطالب اكبر من 160 سم (21)}$$

- أ- 84.13%
- ب- 15.86%
- ج- 99.87%
- د- 84.13%

أجب عن الفقرات (22,23,24) باستخدام المعلومات التالية :

"إذا علمت أن متوسط سرعة السيارات على الطريق السريع الرياض مكة تمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي، وفي دراسة لهذه الظاهرة قامت هيئة الطرق بسحب عينة عشوائية من السيارات المارة في هذا الطريق و وجدت أن متوسط سرعة السيارة 120 كم في الساعة ، وذلك بانحراف معياري قدره 15 كم في الساعة ، تم اختيار احد السيارات عشوائيا اوجد:-"

(22) احتمال أن تتحصر سرعة السيارة بين 90 كم و 150 كم (p(90<x<150)) :-

- أ- 68.26%
- ب- 95.45%
- ج- 99.74%
- د- 89.74%

(23) احتمال أن تكون سرعة السيارة اقل من 150 كم : $P(x < 150)$

- أ- 97.725%
- ب- 95.45%
- ج- 99.74%
- د- 84.13%

(24) احتمال أن تكون سرعة السيارة أكثر من 105 كم : $P(x > 105)$

- أ- 84.13%
- ب- 15.87%
- ج- 99.74%
- د- 84.13%

"يدعى أحد الأسنانة أن نسبة النجاح في أحد المقررات التي يقوم بتدريسيها تبلغ 80% ، ولاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الطلاب الدارسين لهذا المقرر حجمها 50 طلب، وبدراسة نتائج الاختبارات الخاصة بالعينة وجد أن نسبة النجاح في العينة قد بلغت هي 68% ، اختبر مدى صحة ادعاء أستاذ المقرر بأن النسبة في المجتمع هي 80% مقابل الفرض البديل أن النسبة أقل من 80% وذلك بمستوى معنوية 5%"

(25) يمكن صياغة الفرض العدلي والفرض البديل على الشكل :-

- أ- $H_0 : P = 0.80$ ، $H_1 : P < 0.80$
- ب- $H_0 : P = 0.68$ ، $H_1 : P > 0.68$
- ج- $H_0 : P = 0.80$ ، $H_1 : P \neq 0.80$
- د- $H_0 : P = 0.68$ ، $H_1 : P \neq 0.68$

(26) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض يمكن(قيمة Z الجدولية 1.645):-

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- قبول الفرض البديل .
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

"إذا علمت أن تباين عدد ساعات الطيران في الخطوط السعودية لا يزيد عن 20000 ساعة طيران شهريا ، وتستخدم الشركة الآن طريقة جديدة لتسهيل خطوط الطيران الداخلي لتكون في معزل عن الخطوط الخارجية مما يتربّ عليه زيادة عدد ساعات الطيران ، سحبت عينة عشوائية من 40 طائرة فوجد تباينها عدد ساعات طيرانها تساوي 5000 5 ساعة ، بافتراض أن عدد ساعات الطيران تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بوجود زيادة معنوية في التباين عند مستوى معنوية $\alpha=0.01$ " من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية :-

(27) صياغة الفرض العدلي والفرض البديل على الشكل:-

- أ- $H_0 : \sigma^2 \leq 20000$ ، $H_1 : \sigma^2 \geq 20000$
- ب- $H_0 : \sigma^2 = 20000$ ، $H_1 : \sigma^2 \neq 20000$
- ج- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_1 > \mu_2$
- د- $H_0 : \sigma^2 > 20000$ ، $H_1 : \sigma^2 \leq 20000$

(28) قيمة إحصائي الاختبار كا2 في هذه الحالة تساوي:-

- أ- 40
- ب- 156
- ج- 9.75
- د- 5000

"إذا علمت أن تباين عدد ساعات الطيران في الخطوط السعودية لا يزيد عن 20000 ساعة طيران شهريا ، وتسخدم الشركة الان طريقة جديدة لتسبيح خطوط الطيران الداخلي لتكون في معزل عن الخطوط الخارجية مما يترب عليه زيادة عدد ساعات الطيران ، سحبت عينه عشوائية من 40 طائرة فوجد تباينها عدد ساعات طيرانها تساوي 5000 ساعة ، بافتراض أن عدد ساعات الطيران تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بوجود زيادة معنوية في التباين عند مستوى معنوية $\alpha=0.01$ " من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية :-

(29) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة كا² الجدولية تساوي 7.96) يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل.
- ب- قبول الفرض العدmi.
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

"قام أحد الباحثين بتفریغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند مستوى معنوية 5%) :

قيمة F	متوسط المربعات Means	درجات الحرية df	مجموع المربعات SS	مصدر التباين
.....	15	300	بين المجموعات Between groups
	داخل المجموعات Within groups
		20	500	الكلي (المجموع) Total

(30) قيمة إحصائي الاختبار F تساوي :-

- أ- 200
- ب- 0.5
- ج- 20
- د- 5

قيمة F	متوسط المربعات Means	درجات الحرية df	مجموع المربعات SS	مصدر التباين
0.5	20	15	300	بين المجموعات Between groups
	40	5	200	داخل المجموعات Within groups
		20	500	الكلي (المجموع) Total

" قام أحد الباحثين بتفریغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند مستوى معنوية 5%) :

قيمة F	متوسط المربعات Means	درجات الحرية df	مجموع المربعات SS	مصدر التباين
.....	15	300	بين المجموعات Between groups
	داخل المجموعات Within groups
		20	500	الكلي (المجموع) Total

(31) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة F الجدولية تساوي 4.95) يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل .
- ب- قبول كل من الفرضين.
- ج- عدم قبول أي من الفرضين.
- د- قبول الفرض العدلي.

(32) إذا علمت أن " معامل الارتباط بين ثلاث ظواهر اقتصادية قد بلغت ($r=0.85$) وكان عدد المفردات التي تم دراستها ($n=45$) ، وقد رغب الباحث في دراسة معنوية الارتباط وذلك بمستوى 5 % " فان قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي :-

- أ- 10.7
- ب- -0.2775
- ج- 0.2775
- د- 0.0794

إذا علمت انه :-

"قام أحد المراكز البحثية باختبار متوسط استهلاك البنزين في كل من مدينة جده و الدمام وذلك بصدق الوقوف على ما إذا كان هناك اختلاف في متوسط الاستهلاك في مدن المملكة العربية السعودية ، ومن ثم قامت بسحب عينه من المدينتين ومن خلال إدخال البيانات وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وعند مستوى معنوية 5% ، تم الحصول على النتائج التالية":-

Test Statistics

	SAMPLES
Mann-Whitney U	41.000
Z	-.063
Asymp . Sig . (2-tailed)	.192
Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.219

(33) الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متوسطي مجتمعين في هذه الحالة : -

- أ- كا 2.
- ب- الإشارة.
- ج- ويلكوكسون.
- د- مان ويتنى.

إذا علمت انه :-

"قام أحد المراكز البحثية باختبار متوسط استهلاك البنزين في كل من مدينة جده والدمام وذلك بصدق الوقوف على ما إذا كان هناك اختلاف في متوسط الاستهلاك في مدن المملكة العربية السعودية ، ومن ثم قامت بسحب عينه من المدينتين ومن خلال إدخال البيانات وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وعند مستوى معنوية 5% ، تم الحصول على النتائج التالية":-

Test Statistics

	SAMPLES
Mann-Whitney U	41.000
Z	-.063
Asymp . Sig . (2-tailed)	.192
Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.219

(34) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل.
- ب- قبول الفرض العدmi
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

" قام أحد الباحثين باستخدام إخبار كروسكال-والس للتعرف على مدى وجود فروق معنوية بين ثلات أنواع من الجينات الوراثية المستخدمة في تلقيح نباتات الزينة ، وذلك عند مستوى معنوية 5% ، وتم الحصول على النتائج التالية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS:-"

Test Statistics

	SAMPLES
Ci-Square	1.327
df	2
Asymp . Sig .	.291

من الجدول السابق يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل القائل بمعنى الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية.
- ب- قبول الفرض العدmi القائل بأن الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية غير معنوية .
- ج- قبول الفرض العدmi القائل بأن الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية معنوية .
- د- قبول الفرض البديل القائل بعدم معنوية الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية.

(36) إذا علمت أن " معامل الارتباط بين ثلات ظواهر اقتصادية قد بلغت ($r=0.64$) وكان عدد المفردات التي تم دراستها ($n=25$) ، وقد رغب الباحث في دراسة معنوية الارتباط وذلك بمستوى 5 % " فإن قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي :-

- أ- 0.6075
- ب- -3.9946
- ج- 6.208
- د- 3.9946

(37) إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-

T-TEST

One – Sample test

	Test Value = 160					
	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الطول	-21.006	399	0.012	-82.0480	-80.04145	-80.6815

من خلال الجدول السابق يمكن :-

- أ- قبول الفرض العدلي.
- ب- رفض كل من الفرضين.
- ج- قبول الفرض البديل.
- د- قبول كل من الفرضين.

(38) إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-

T-TEST

Paired Sample test

		Paired Difference					t	df	Sig. (2-tailed)			
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference							
					Lower	Upper						
Pair 1	Posttest Pretest	24.238	3.8372	.3837	13.765	25.861	6.763	99	.015			

من خلال الجدول السابق يمكن :-

- أ- قبول الفرض العدلي.
- ب- قبول الفرض البديل.
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

(39) إذا كانت متوسط مستوى السكر في الدم لمجموعة من الأفراد بمدينة الرياض تمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي بانحراف معياري 20 درجة، فما هو حجم العينة المناسب لتقدير متوسط مستوى السكر في الدم في هذه المدينة بحيث لا يتعذر الخطأ في تقدير متوسط مستوى السكر 4 درجات، وذلك بدرجة ثقة 99% (مع تقرير الناتج للرقم الأعلى):-

- أ- 60 مفردة
- ب- 167 مفردة**
- ج- 170 مفردة
- د- 20 مفردة

الجدول التالي يوضح نتيجة اختبار مربع كاي (Kai) عند مستوى معنوية 5% :-

	Value	df	Asymp.Sig (2-sided)
Person Chi-Square	0.06793	4	.0967
Likelihood Ratio	0.05872	4	.0987
Linear-by-Linear Association	.02873	1	.0649
N of Valid Cases	99		

اجب عن الأسئلة التالية من خلال النتائج الواردة في الجدول السابق :-

(40) قيمة احصائي الاختبار Kai 2 تساوي:-

- أ- 0.0649
- ب- 0.02873
- ج- 0.0967
- د- 0.06793**

الجدول التالي يوضح نتائج اختبار مربع كاي (كاي²) عند مستوى معنوية 5% :-

	Value	df	Asymp.Sig (2-sided)
Person Chi-Square	0.06793	4	.0967
Likelihood Ratio	0.05872	4	.0987
Linear-by-Linear Association	.02873	1	.0649
N of Valid Cases	99		

اجب عن الأسئلة التالية من خلال النتائج الواردة في الجدول السابق :-

(41) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل .
- ب- قبول الفرض العدلي
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

إذا علمت انه :-

"قام احد المراكز البحثية باختبار متوسط الإنفاق في كل من مدينة الرياض والإحساء وذلك بقصد الوقوف على ما إذا كان هناك اختلاف في متوسط الإنفاق في مدن المملكة العربية السعودية ، ومن ثم قامت بسحب عينة من المدينتين ومن خلال إدخال البيانات وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وعند مستوى معنوية 5% ، تم الحصول على النتائج التالية :-"

Test Statistics

	SAMPLES
Mann-Whitney U	38.000
Z	-.863
Asymp . Sig . (2-tailed)	.042
Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.046

اجب عن الأسئلة التالية من خلال النتائج الواردة في الجدول السابق :-

(42) الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متواسطي مجتمعين في هذه الحالة :-

- أ- كاي² .
- ب- مان ويتنى.
- ج- ويلكوكسون.
- د- الإشارة.

(43) من خلال مقارنة قيمة احصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل.
- ب- قبول الفرض العدلي.
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

"عينة عشوائية تتكون من 400 عامل من عمال احد المصانع بمدينة بالقصيم وجد أن الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليومية لعمال العينة 7.5 ساعة عمل يوميا، وبالانحراف المعياري يساوي 1.25 ساعة ، علما بان الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليومية للعمال في هذه الصناعة يبلغ 9 ساعات ، اختر أهمية الفرق المعنوي بين الوسط الحسابي لعدد ساعات عمل العمال بالعينة والوسط الحسابي لعدد ساعات العمل للعمال في الصناعة عموما".

(44) يمكن صياغة الفرض العدلي والفرض البديل على الشكل:-

- أ- $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu < \mu_0$
- ب- $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$
- ج- $H_0 : \mu > \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$
- د- $H_0 : \mu = \mu_0$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$

(45) قيمة احصائي الاختبار في هذه الحالة تساوي :-

- أ- -24
- ب- -2.94
- ج- -11.006
- د- 24

قامت إحدى شركات الأدوية بتوريد 100 كرتونة مصل الحمة الشوكية لأحد المستشفيات كل كرتونة تحتوى على 30 زجاجة مصل و لوحظ توزيع عدد زجاجات المصل المكسورة بالكرتونة ويرغب أحد الباحثين في اختبار مدى اتفاق هذه الظاهرة وتوزيع ثاني الحدين على ذلك فقد توصل إلى الجدول التالي والذي يستخدمه لحساب كا²، مع الاخذ بالاعتبار انه قام بدمج الخلايا الثلاث الأخيرة 3 و 4 و 5 كما يلي :-

عدد الزجاجات المكسورة	التكرارات المشاهدة ش	التكرارات المتوقعة ت
0	22	16.81
1	28	36.02
2	35	30.87
3-5	15	16.31
المجموع	100	100

هل يتفق هذا التوزيع مع توزيع ثاني الحدين حسب التكرار المتوقع الموضح في الجدول السابق ، اكمل الجدول السابق واجب عما يلي:-

(46) قيمة كا² المحسوبة تساوي:-

- أ- 4.12
- ب- 30
- ج- 100
- د- 11.11

(47) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة كا² الجدولية (0.0506,7.38) يمكن

-:

- أ- قبول الفرض البديل .
- ب- قبول الفرض العدلي
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

قامت إحدى الكليات بدراسة ظاهرة نجاح الطلاب في مقررات اللغة الفرنسية وقد اعتمدت الدراسة على عينه مكونة من 200 طالب ، تم إخضاعهم لثلاث اختبارات تقيس قدرات الطالب في اللغة الفرنسية ، وترغب إدارة الكلية في اختبار مدى اتفاق هذه الظاهرة وتوزيع ثالث الدين وعلى ذلك فقد تم التوصل إلى الجدول التالي والذي يوضح عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات والذي يتم استخدامه في حساب كا²:-

عدد الاختبارات التي نجح فيها الطالب	المجموع	التكارات المشاهدة ش	التكارات المتوقعة ت
0	30	10	50
1	60	50	80
2	90	80	60
3	20	60	200
المجموع		200	200		

هل يتفق هذا التوزيع مع توزيع ثالث الدين حسب التكرار المتوقع الموضح في الجدول السابق ، من خلال استكمال الجدول السابق، ثم اجب عما يلي:-

(48) قيمة كا² المحسوبة تساوي:-

- أ- 96.11
- ب- 69.92
- ج- 200
- د- 3

(49) من خلال مقارنة قيمة احصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة كا² الجدولية (0.925,21.15)

يمكن :-

- أ- قبول الفرض البديل .
- ب- قبول الفرض العدمي
- ج- رفض كل من الفرضين.
- د- قبول كل من الفرضين.

" أحد الباحثين قام بدراسة متوسط الدخل في قطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية ، واستخدم اختبار كولومجروف لاختبار جودة التوفيق لهذه الظاهرة ، وحصل على النتائج التالية :-"

NPar Tests

One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters ^{a,b}	درجات الطلاب	
	250	6800
Mean	←	→ 6800
Std-Deviation	←	→ 192.34
Most Extreme Differences		
Absolute		43
Positive		43
Negative		-12.437
Kolmogorov-Smirnov Z		.069
Asymp-Sig-(2-tailed)		.078

(50) متوسط الدخل في هذا القطاع هو :-

- أ- 250
- أ- 6800
- ب- 192.34
- ج- 0.069

(51) الانحراف المعياري لدخل الموظفين في هذا القطاع:-

- د- 250
- هـ- 6800
- أ- 192.34
- و- 0.069

(52) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض يمكن:-

- ز- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي .
- ح- قبول الفرض العدلي القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .
- ط- عدم قبول أي من الفرضين.
- ي- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .

تم سحب عينة عشوائية من مجموع مجتمع العاملين في إحدى الدوائر الحكومية بلغ حجمها 200 موظف ، فإذا كان الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات تقرير تقييم الأداء الخاص بهم ، هما على الترتيب 68 درجة و 15 درجة ، فإن فترة الثقة للوسط الحسابي لدرجات تقارير تقييم الأداء الخاص بهذه الدائرة الحكومية بدرجة ثقة 95% هي:

(53) الحد الأدنى لفترة الثقة يساوي :.

- أ- 65.92 درجة
- ب- 68 درجة
- ج- 70.08 درجة
- د- 200 درجة

(54) الحد الأدنى لفترة الثقة يساوي :.

- أ- 65.92 درجة
- ب- 68 درجة
- ج- 70.08 درجة
- د- 200 درجة

تم سحب عينة عشوائية من مجموع مجتمع الطلاب في أحد الجامعات بلغ حجمها 144 طالب، فإذا كان الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الطلاب بالعينة هما على الترتيب 85 درجة و 10 درجات ، فإن فترة الثقة للوسط الحسابي لدرجات الطلاب في هذه الجامعة بدرجة ثقة 95% هي :

(55) الحد الأدنى لفترة الثقة يساوي :

- أ- 85 درجة
- ب- 90 درجة
- ج- 83.37 درجة
- د- 86.63 درجة

(56) الحد الأعلى لفترة الثقة يساوي :

- أ- 85 درجة
- ب- 90 درجة
- ج- 83.37 درجة
- د- 86.63 درجة

(57) في دراسة لقياس تأثير أحد الأدوية على عدد دقات القلب قامت أحد شركات الأدوية باختيار عينة عشوائية من المرضى تتكون من 50 مريض، وقامت بقياس عدد دقات القلب قبل الحصول على جرعة الدواء ، ثم حصل مفردات العينة على جرعة الدواء المقترن ، وتم إخبار عدد دقات القلب بعد الحصول على الجرعة العلاجية والاختبار هل هناك ، اختلاف معنوي في مستوى دقات القلب قبل تلقي العلاج وبعده ، عند مستوى معنوية 5%， استخدمت الشركة البرنامج الإحصائي SPSS اعتماد على اختبار ويلكوكسون "Wilcoxon" وحصلنا على النتائج التالية :.

Ranks				
		N	Mean Rank	Mean Rank Sum of Ranks
AFTER-BEFORE	Negative Ranks	49	89	4540.50
	Positive Ranks	1	75	75
	Ties	0		
	Total	8		

من الجداول السابقة يمكن توضيح أن :

- أ- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية أكبر من المتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية .
- ب- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية أقل من المتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية .
- ج- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية مساوي للمتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية .
- د- لا شيء مما سبق.

"قام أحد الباحثين بتفریغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند مستوى معنوية 5%) .::"

فيمة F	متوسط المربعات Means	درجات الحرية Df	مجموعات المربعات SS	مصدر التباين
.....	10	1500	بين المجموعات Between Groups
	داخل المجموعات Within Groups
		15	2000	الكلي (المجموع) Total

(58) قيمة إحصائي الاختبار F تساوي :

- أ- 10
- ب- 150
- ج- 1.5
- د- 500

الحل كالتالي

(59) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الإختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة F الجدولية تساوي 9.35) يمكن :

- أ- قبول الفرض البديل.
- ب- قبول الفرض العدلي
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل الفرضين

"قام أحد الأساتذة بدراسة متوسط درجات مجموعة من الطلاب في مقرر التحليل الإحصائي، واستخدم اختبار كولومجروف سيميرنوف لجودة التوفيق وحصل على النتائج التالية :

NPar Tests

One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		درجات الطلاب
N		100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	82
	Std.Deviation	5.987
Most Extreme	Absolute	2
Differences	Positive	2
	Negative	.164
Kolmogorov-SmirnovZ		.0142
Asymp.Sig.(2.tailed)		.027

(60) متوسط درجات الطالب يساوي:

- أ- 50
- ب- 5.987
- ج- 82
- د- 100

(61) الانحراف المعياري لدرجات الطالب:

- أ- 100
- ب- 5.987
- ج- 82
- د- 0.027

(62) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض يمكن :

- أ- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي .
- ب- قبول الفرض العدمي القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
- ج- عدم قبول أي من الفرضين .
- د- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

(63) إذا علمت أن أحد المراكز البحثية التي تعمل في مجال تصنيف الشركات المالية قد قامت بإجراء بحث مقارن لأربع أنواع من الشركات: الأولى شركات الأغذية المحفوظة والثانية شركات العطور والثالثة شركات تصنيع لعب الأطفال والرابعة شركات مياه غازيه ، وذلك للوقوف على مدى وجود اختلافات بين ربحية الأنواع الأربع من الشركات باستخدام اختبار كروسكال – والس، عند مستوى معنوية 5% ، وتم الحصول على النتائج التالية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS :

Test Statistics

	SAMPLES
Ci-Square	12.064
Df	3
Asymp-sig	.016

من الجدول السابق يمكن:

- أ- قبول الفرض البديل القائل بمعنى الفروق بين الشركات الأربعه
- ب- قبول الفرض العددي القائل بأن الفروق بين الشركات الأربعه غير معنوية
- ج- قبول الفرض العددي القائل بأن الفروق بين الشركات الأربعه معنوية
- د- قبول الفرض البديل القائل بعدم معنوية الفروق بين الشركات الأربعه

"قام أحد الباحثين بإجراء تجربة لبيان تأثير أحد وسائل التعليمية الحديثة والمتمثلة في الصورة الإلكترونية على الطلاب وقد قام باختيار عينة عشوائية من الطلاب تتكون من 100 طالب وقام باختبار الطلاب قبل التدريس بالأسلوب الحديث ، ثم حصل الطلاب على مجموعة من المحاضرات باستخدام السبورة الإلكترونية وتم اختبار الطلاب بعد الحصول المحاضرات مره أخرى ، ولاختبار هل هناك اختلاف معنوي في مستوى التحصيل لدى الطلاب قبل تلقى المحاضرات بالأسلوب الحديث وبعده ، عند مستوى معنوية 5% ، استخدم الباحث البرنامج الإحصائي SPSS اعتمد على اختبار ويلوكسون Wilcoxon وحصلنا على النتائج التالية :

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
AFTER-BEFORE	Negative Ranks	99	69	5492
	Positive Ranks	1	82	94
	Ties	0		
	Total	100		

Test Statistics

	SAMPLES
Z	.013
Asymp.Sig.(2.tailed)	.0891

(44) من الجداول السابقة يمكن توضيح أن :

- أ- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث أكبر من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات
- ب- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث أقل من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات
- ج- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث مساوي من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات
- د- لا شيء مما سبق

(45) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :

- أ- قبول الفرض البديل
- ب- قبول الفرض العدلي
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل من الفرضين

(66) إذا كانت متوسط درجات الطلاب في مقرر التحليل الإحصائي يمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي بانحراف معياري 12 درجة ، فما هو حجم العينة المناسب لتقدير متوسط درجات الطلاب في هذا المقرر بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير المتوسط 3 درجات وذلك بدرجة ثقة 99% (مع تقرير الناتج للرقم الأعلى):

- أ- 60 مفردة
- ب- 167 مفردة
- ج- 170 مفردة
- د- 107 مفردة

(67) إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي :spss

T- TEST

One – Sample test

	Test Value=70					
	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	%95 Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
الوزن	-4.514	199	0.412	112.0480	90.04145	120.6815

من خلال البرنامج السابق يمكن :

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- رفض كل من الفرضين
- ج- قبول الفرض البديل
- د- قبول كل من الفرضين

"إذا علمت أن " أحد أصحاب الشركات لديه ثلاثة موظفين يقومون بأعمال إدارية بمكتبه و هم على الترتيب "أحمد" و "عمر" و "علي" ، يقوم أحمد بإنجاز 40% من أعمال المكتب بينما يقوم عمر بإنجاز 35% من أعمال المكتب ، أما باقي أعمال المكتب فتسند إلى "علي" فإذا علمت أن حجم الأخطاء المطبعية للموظفين الثلاثة على الترتيب هي 4% 6% 8% ، سحبت ورقة عمل إدارية واحدة عشوائياً من الأعمال الإدارية المسندة للموظفين الثلاثة " ، احسب الاحتمالات التالية :

(68) احتمال أن تكون الورقة المسحوبة بها أخطاء مطبعية :

- أ- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$
- ب- $0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94 + 0.25 \times 0.92$
- ج- $0.60 \times 0.04 + 0.65 \times 0.06 + 0.75 \times 0.08$
- د- $0.40 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.25 \times 0.09$

(69) احتمال أن تكون الورقة بها خطأ مطبعي ومن نصيب أحمد:

- أ- $\frac{0.35 \times 0.06}{0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08}$
- ب- $\frac{0.40 \times 0.04}{0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08}$
- ج- $\frac{0.25 \times 0.08}{0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08}$
- د- $\frac{0.40 \times 0.96}{0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08}$

"قام أحد الباحثين بإجراء اختبار لبحث مدى تأثير الدراسات الأجنبية الحديثة على المستوى الثقافي للطلاب فقام باختيار عينة عشوائية من طلاب إحدى الكليات بلغ حجمها 100 طالب مقسمين إلى مجموعتين كل واحد منها حجمها 50 طالب، ثم عين أحدهما بطريقة عشوائية لتكون مجموعة تجريبية وهي المجموعة التي قام بتدريسها بعض الدراسات الأجنبية الحديثة والأخرى المجموعة الضابطة وهي المجموعة التي تدرس بالطريقة التقليدية ، وفي نهاية التجربة وزع على المجموعتين استقصاء يقيس المستوى الثقافي للطلاب في كل من المجموعتين فكانت النتائج كما يلي:

المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية
$n_2 = 50$	$n_1=50$
$\bar{X}_2 = 79$	$\bar{X}_1 = 92$
$S_2^2 = 22$	$S_1^2=14$

واردنا اختبار ما كان أداء المجموعة التجريبية أفضل من أداء المجموعة الضابطة عند مستوى معنوية 5% :

(70) يمكن صياغة الفرض العدلي والفرض البديل على الشكل :

- أ- $H_0 : \mu_1 > \mu_2 , H_1 : \mu_1 < \mu_2$
- ب- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 < \mu_2$
- ج- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
- د- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 > \mu_2$

(71) قيمة الإنحراف المعياري s في هذه الحالة تساوي:

- أ- -1.6
- ب- 1.6
- ج- 4.24
- د- 18

(72) قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي

- أ- -1.6
- ب- 0.8485
- ج- 2.77
- د- 15.32

(73) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة t الجدولية تساوي 1.68) يمكن :

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- قبول الفرض البديل
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل من الفرضين

"إذا كان متوسط درجات الطالب في كلية إدارة الأعمال هو (83) درجة بانحراف معياري (5) درجات وذلك خلال عام 2010 أجرى أحد الباحثين دراسة عام 2014 لعينة قوامها (100) طالب ووجد أن متوسط درجات الطالب في العينة هو (88) درجة هل تشير الدراسة التي قام بها الباحث أن متوسط درجات الطالب في كلية إدارة الأعمال قد ارتفع عما عليه في 2010 وذلك بمستوى معنوية 5%"

(74) قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:

- أ- 10
- ب- 2.33
- ج- 83
- د- 1.96

(75) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية 1.645) :

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- قبول الفرض البديل
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل من الفرضين

"يدعى أحد الباحثين أن نسبة النجاح لأحد التجارب التي يقوم بها في المعمل 60% ، ولاختبار هذا الإدعاء تم اختيار عينة عشوائية من الحيوانات الخاضعة للتجارب في معمله حجمها 225 مفرده ، ووجد أن نسبة النجاح في العينة قد بلغت هي 72% ، اختبر مدى صحة ادعاء الباحث بأن النسبة في المجتمع هي 60% مقابل الفرض البديل أن النسبة أقل من 60% وذلك بمستوى معنوية 5%"

(76) يمكن صياغة الفرض العدلي والفرض البديل على الشكل :

- أ- $H_0 : P = 0.72 , H_1 : P < 0.72$
- ب- $H_0 : P = 0.60 , H_1 : P > 0.60$
- ج- $H_0 : P = 0.72 , H_1 : P \neq 0.72$
- د- $H_0 : P = 0.60 , H_1 : P < 0.60$

(77) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقي القبول والرفض يمكن (قيمة z الجدولية -1.645) :

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- قبول الفرض البديل
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل من الفرضين

"إذا علمت أن تباين عدد ساعات عمل المصايب الكهربائية التي تنتجهما إحدى الشركات لا تزيد عن 10000 ساعة ، وتستخدم الشركة الآن طريقة إنتاج جديدة يعتقد أنها ستزيد من تباين عدد ساعات عمل المصايب ، سحبت عينة عشوائية من 100 مصباح فوجد تباينها يساوي 1800 ، بافتراض أن عدد ساعات عمل المصايب تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بوجود زيادة معنوية في التباين عند مستوى معنوية 5% من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية :

يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :

(78) الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل:-

أ- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 > \mu_2$

ب- $H_0 : \sigma^2 = 10000 , H_1 : \sigma^2 \neq 10000$

ج- $H_0 : \sigma^2 \leq 10000 , H_1 : \sigma^2 \geq 10000$

د- $H_0 : \sigma^2 > 10000 , H_1 : \sigma^2 \leq 10000$

(79) قيمة إحصائي الاختبار K_{α} في هذه الحالة تساوي:

أ- 100

ب- 1800

ج- 550

د- 17.82

(80) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة K_{α} الجدولية تساوي 25) يمكن :

أ- قبول الفرض البديل

ب- قبول الفرض العدمي

ج- عدم قبول أي من الفرضين

د- قبول كل من الفرضين

"في دراسة لتحديد ما إذا كان هناك فروق معنوية بين نوعين من الأسمدة على أحد المحاصيل الزراعية قام أحد الباحثين بسحب عينتين من المحاصيل أحدهما اعتمد في زراعته على النوع الأول من الأسمدة والآخر اعتمد على النوع الثاني ، وقام بدراسة مدى توافر أنواع معينة من البروتينات النباتية في كلا العينتين ، وبتحليل نتائج العينتين قام الباحث بتلخيص النتائج كما يلي :

$$(n_1 = 250, \bar{x}_1 = 213, \sigma_1^2 = 50)$$

$$(n_2 = 200, \bar{x}_2 = 180, \sigma_2^2 = 65)$$

أولاً : النوع الأول من الأسمدة

ثانياً: النوع الثاني من الأسمدة

ويرغب الباحث في اختبار الفرض العددي القائل بأن متوسط حجم البروتينات الموجودة في نباتات العينة الأولى تساوي متوسط حجم البروتينات الموجودة في نباتات العينة الثانية بمستوى معنوية 5% مقابل الفرض البديل أنهما غير متساوين.

(81) يمكن صياغة الفرض العددي والفرض البديل على الشكل :

العددي والفرض البديل على الشكل:-

H₀ : μ₁=μ₂ ، H₁ : μ₁<μ₂ -٥

H₀ : μ₁=μ₂ ، H₁ : μ₁≠μ₂ -٦

H₀ : μ₁=μ₂ ، H₁ : μ₁>μ₂ -٧

H₀ : μ₁≠μ₂ ، H₁ : μ₁=μ₂ -٨

(82) قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:

أ- 45.544

ب- 33

ج- -45.544

د- 0.525

" إذا كان متوسط عدد ساعات العمل اليومي في قطاع الزراعة قد بلغ 8 ساعات عمل يومياً بإنحراف معياري 4.5 ساعة وذلك خلال عام 2012، وقد قام أحد الباحثين بإجراء دراسة لعدد ساعات العمل اليومي للعاملين في قطاع الزراعة وذلك خلال عام 2014 وقد اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية حجمها 40 عامل في هذا القطاع فوجد أن متوسط عدد ساعات العمل في هذا القطاع قد بلغ 9.1 يومياً. فهل تشير الدراسة التي قام بها الباحث أن متوسط عدد ساعات العمل في قطاع الزراعة قد أرتفع عما عليه في عام 2012 وذلك بمستوى معنوية 5% ؟"

(83) قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:

- أ- 9.1
- ب- 9.77
- ج- 15.811
- د- 1.546

(84) من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتى القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية 1.645) :

- أ- قبول الفرض العدلي
- ب- قبول الفرض البديل
- ج- عدم قبول أي من الفرضين
- د- قبول كل من الفرضين