

القانون [تم ترقيم القوانين المتشابهة فقط] تقريباً 17 قانون جميع القوانين مطالبين بحفظها	② محاضرة 14 عام 36 ف1 ④ محاضرة 14 عام 36 ف2	① الأسئلة اختبار عام 36 ف1 ③ اختبار عام 36 ف2	٤
توزع الاتحاد U على التقاطع \cap		- إذا كانت A, B, C ثلاثة حوادث فإن العلاقة $A \cup (B \cap C)$ تساوي: -A $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ -B $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ -C $(A \cup B) \cup (A \cup C)$ -D لا شيء مما سبق	1
عدم توافر أي تقاطع <u>المتمة</u> لكل نوع		- إذا علمت انه يراد شراء ثلاثة أنواع من الصحف (الكتب) C و B و A فإن : - عدم توافر أنواع الصحف (الكتب) الثلاثة يرمز لها بالرمز : -A $A \cup B \cup C$ -B $A \cap B \cap C$ -C $A \cap B \cap C$ -D لا شيء مما سبق .	2
أو $U =$ على الأقل دائما تعني اتحاد U		- توافر نوع واحد على الأقل A أو B أو C أو كلها يرمز له بالرمز : -A $A \cup B \cup C$ -B $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ -C $A \cap B \cap C$ -D لا شيء مما سبق	3
$\cap =$ و توافر يعني تقاطع		- توافر أنواع [كتب][وجبات] الثلاثة يرمز لها بالرمز : - -A $A \cup B \cup C$ -B $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ -C $A \cap B \cap C$ -D لا شيء مما سبق	4
توافر الاول (\cap) تقاطع متممة الكتاب الثاني وتقاطع متممة الكتاب الثالث		- توافر الكتاب الدراسي A فقط يمكن الرمز له بالرمز :- -A $A \cup B \cup C$ -B $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ -C $A \cap B \cap C$ -D لا شيء مما سبق	5
توافر الكتاب الاول (و) متممة الكتاب الثاني (و) متممة الكتاب الثالث (او) توافر الكتاب الثاني (و) متممة الكتاب الاول (و) متممة الكتاب الثالث (او) توافر الكتاب الثالث (و) متممة الكتاب الاول (و) متممة الكتاب الثاني		- توافر نوع واحد فقط من الكتب الدراسية يمكن الرمز له بالرمز : - -A $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ -B $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ -C $(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{B} \cap \bar{A})$ -D لا شيء مما سبق	6
توزع التقاطع \cap على الاتحاد U		- إذا كانت A, B, C ثلاث حوادث فإن العلاقة $A \cap (B \cup C)$ تساوي :- -A $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ -B $(A \cap B) \cap (A \cap C)$ -C $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ -D لا شيء مما سبق	7
عدم توافر أي تقاطع <u>المتمة</u> توفر أي تقاطع		إذا علمت أن أحد المطاعم الشهيرة يقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الوجبات A, B, C - فإن توافر الوجبة C يمكن الرمز له بالرمز -A $A \cup B \cup C$ -B $A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ -C $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$ -D $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$	8
اتحاد U أي المشترك بين المجموعتين	$A = \{0,1,2,3,4,5\}$ $B = \{4,5,6,7,8\}$ $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$	- اجب عن الفقرات () باستخدام المعلومات التالية : - المجموعة $(A \cup B)$ تساوي : -A $\{8,7,6\}$ -B $\{3,2,1,0\}$ -C $\{5,4\}$ -D $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$	9
تقاطع \cap أي المتشابهة فقط بين المجموعتين		- المجموعة $(A \cap B)$ تساوي : -A $\{8,7,6\}$ -B $\{0,1,2,3\}$ -C $\{4,5\}$ -D $\{8,7,6,5,4,3,2,1,0\}$	10

الفرق $(A-B)$ شيل من A اللي موجود في B	<p>- المجموعة $(A - B)$ تساوي :</p> <p>-A {8,7,6}</p> <p>-B {3,2,1,0}</p> <p>-C {4,5}</p> <p>-D {8,7,6,5,4,3,2,1,0}</p>	11	
الفرق $(B-A)$ شيل من B اللي موجود في A	<p>- المجموعة $(B - A)$ تساوي :-</p> <p>-A {8,7,6}</p> <p>-B {3,2,1,0}</p> <p>-C {4,5}</p> <p>-D {8,7,6,5,4,3,2,1,0}</p>	12	
اتحاد U أي المشترك بين المجموعتين	<p>- اجب عن الفقرات () باستخدام المعلومات التالية :</p> <p>$A = \{13,15,17, a, e, m\}$ $B = \{14,16,17,h,e,d\}$ $U = \{13,14,15,16,17,18,a,h,m,e,d,f\}$</p> <p>- المجموعة $(A \cup B)$ تساوي :</p> <p>-A {13, 14, 15, 16, 17, a, h, m, e, d}</p> <p>-B {13, 15, a, m}</p> <p>-C {14, 16, 18, d, h, f}</p> <p>-D {13, 15, 18, a, m, f}</p>	13	
تقاطع \cap أي المتشابهة فقط بين المجموعتين	<p>- المجموعة $(A \cap B)$ تساوي :</p> <p>-A {13, 14, 15, 16, 17, a, h, m, e, d}</p> <p>-B {13, 15, a, m}</p> <p>-C {14, 16, 18, h, d, f}</p> <p>-A {17, e}</p>	14	
الفرق $(A-B)$ شيل من A اللي موجود في B	<p>- المجموعة $(A - B)$ تساوي :</p> <p>-A {13, 14, 15, 16, 17, a, h, m, e, d}</p> <p>-B {13, 15, a, m}</p> <p>-C {14, 16, 18, h, d, f}</p> <p>-D {13, 15, 18, a, m, f}</p>	15	
الفرق $(B-A)$ شيل من B اللي موجود في A	<p>- المجموعة $(B - A)$ تساوي :-</p> <p>-A {13, 14, 15, 16, 17, a, h, m, e, d}</p> <p>-B {13, 15, a, m}</p> <p>-C {14, 16, h, d}</p> <p>-D {17, e}</p>	16	
مكمل (\bar{A}) أي الموجود في مجموعة (U) وغير موجود في مجموعة (A)	<p>- المجموعة (\bar{A}) تساوي :-</p> <p>-A {13, 14, 15, 16, 17, a, h, m, e, d}</p> <p>-B {3, 5, a, m}</p> <p>-C {14, 16, 18, h, d, f}</p> <p>-D {3, 5, 8, a, m, f}</p>	17	
نضرب جميع الاحتمالات في معيبيها	<p>إذا علمت مصنع لانتاج لعب الاطفال يمتلك ثلاث آلات A و B و C ، تنتج الآلة الأولى 25% من الانتاج والآلة الثانية 40% والباقي من انتاج الآلة الثالثة فإذا كانت نسبة المعيب في الآلات الثلاثة على الترتيب هو 3% و 4% و 6% سحبت وحدة واحدة عشوائيا من انتاج المصنع " احسب الاحتمالات التالية :-</p> <p>- احتمال ان تكون الوحدة المسحوبة معيبة :</p> <p>-A $0.25 \times 0.97 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$</p> <p>-B $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>-C $0.75 \times 0.03 + 0.60 \times 0.04 + 0.65 \times 0.06$</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>	18	المحاضرة الثانية
احتمال معيب الآلة المطلوبة ضرب نسبة انتاجها على كل المعيب	<p>- احتمال ان تكون الوحدة المسحوبة معيبة ومن انتاج الآلة الثالثة :-</p> <p>-A $\frac{0.94 \times 0.35}{0.94 \times 0.35 + 0.96 \times 0.40 + 0.97 \times 0.25}$</p> <p>-B $\frac{0.04 \times 0.40}{0.06 \times 0.35 + 0.04 \times 0.40 + 0.03 \times 0.25}$</p> <p>-C $\frac{0.06 \times 0.35}{0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06}$</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>	19	

نضرب جميع الاحتمالات في معيبيها	<p>إذا علمت أن احد الشركات تمتلك ثلاث سيارات لتوصيل المنتجات A,B,C تقوم السيارة الاولى بتوصيل % 30 من الانتاج واما السيارة الثانية فتقوم بتوصيل %35 من الانتاج والباقي من نصيب السيارة الثالثة ف اذا كانت نسبة الانتاج الذي يفسد اثناء التوصيل على الترتيب % 5 و % 7 و % 9 سحبت وحده واحده عشوائيا من الوحدات الموزعة على السيارات احسب الاحتمالات التالية :</p> <p>- احتمال أن تكون الوحدة المسحوبة فاسدة :</p> <p>A- $0.25 \times 0.96 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$</p> <p>B- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>C- $0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09$</p> <p>D- $0.70 \times 0.05 + 0.65 \times 0.07 + 0.65 \times 0.09$</p>	20
احتمال المعيب المطلوب ضرب نسبة انتاجها على كل المعيب	<p>-احتمال أن تكون الوحدة فاسدة ومن نصيب السيارة الثانية :</p> <p>A- 0.35×0.07</p> <p>B- $0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09$</p> <p>C- 0.45×0.04</p> <p>D- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.074 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>E- 0.06×0.35</p> <p>F- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>G- 0.30×0.09</p> <p>H- $0.30 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.35 \times 0.09$</p>	21
نضرب جميع الاحتمالات في معيبيها	<p>"إذا علمت أن " أحد أصحاب الشركات لدية ثلاث موظفين يقومون بأعمال إدارية بمكتبه و هم على الترتيب "احمد " و"عمر" و"علي" ، يقوم أحمد بإنجاز 40% من أعمال المكتب بينما يقوم عمر بإنجاز 35% من أعمال المكتب ، أما باقي أعمال المكتب فتسند إلى "علي" فإذا علمت أن حجم الأخطاء المطبعية للموظفين الثلاثة على الترتيب هي % 4 ، % 6 ، % 8 ، سحبت ورقة عمل إدارية واحده عشوائياً من الأعمال الإدارية المسندة للموظفين الثلاثة " ، احسب الاحتمالات التالية :</p> <p>- احتمال أن تكون الورقة المسحوبة بها أخطاء مطبعية :</p> <p>A- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$</p> <p>B- $0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94 + 0.25 \times 0.92$</p> <p>C- $0.60 \times 0.04 + 0.65 \times 0.06 + 0.75 \times 0.08$</p> <p>D- $0.40 \times 0.05 + 0.35 \times 0.07 + 0.25 \times 0.09$</p>	22
احتمال المعيب المطلوب ضرب نسبة انتاجها على كل المعيب	<p>- احتمال أن تكون الورقة بها خطأ مطبعي ومن نصيب أحمد:</p> <p>A- 0.35×0.06</p> <p>B- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$</p> <p>C- 0.40×0.04</p> <p>D- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$</p> <p>E- 0.25×0.08</p> <p>F- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$</p> <p>G- 0.40×0.96</p> <p>H- $0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06 + 0.25 \times 0.08$</p>	23
نضرب جميع الاحتمالات في معيبيها	<p>إذا علمت أنه: " مصنع لإنتاج لعب الأطفال يمتلك ثلاث آلات A وB وC، تنتج الآلة الأولى %25 من الإنتاج والآلة الثانية %40 من الإنتاج والباقي من إنتاج الآلة الثالثة فإذا كانت نسبة المعيب في الآلات الثلاثة على الترتيب هو %3 و %4 و %6 ، سحبت وحدة واحدة عشوائياً من إنتاج المصنع "، احسب الاحتمالات التالية: -</p> <p>-احتمال أن تكون الوحدة المسحوبة معيبة: -</p> <p>A- $0.25 \times 0.97 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$</p> <p>B- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>C- $0.75 \times 0.03 + 0.60 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	24
نضرب جميع احتمالات الإنتاج في النسبة الجيد لكل آلة (النسبة الجيدة نستخرجها من المكمل لنسبة المعيب)	<p>-احتمال أن تكون الوحدة المسحوبة جيدة: -</p> <p>A- $0.25 \times 0.97 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$</p> <p>B- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>C- $0.75 \times 0.03 + 0.60 \times 0.04 + 0.65 \times 0.06$</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	25
احتمال المعيب المطلوب ضرب نسبة انتاجها على كل المعيب	<p>-احتمال أن تكون الوحدة معيبة ومن إنتاج الآلة الثالثة: -</p> <p>A- 0.94×0.35</p> <p>B- $0.25 \times 0.97 + 0.40 \times 0.96 + 0.35 \times 0.94$</p> <p>C- 0.40×0.04</p> <p>D- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>E- 0.35×0.06</p> <p>F- $0.25 \times 0.03 + 0.40 \times 0.04 + 0.35 \times 0.06$</p> <p>G- لا شيء مما سبق</p>	26

<p>تقاطع الاثنين على الاخير</p> $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	<p>- إذا علمت أن : $P(A) = 0.52$ و $P(A \cap B) = 0.026$ فإن قيمة الاحتمال $P(B A)$ تساوي :</p> <p>0.05 -A 0.5 -B 5 -C 0.1 -D</p>	27																				
<p>تقاطع الاثنين على الاخير</p> $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	<p>في تجريبه على نوع معين من الامراض الوراثية وجد ان احتمال اصابة احد الاشخاص بمرض A هو 0.45 واحتمال الاصابة بالمرض A و B معا هو 0.045 فما هو احتمال اصابته بالمرض B علما بأنه قد اصيب بالمرض A من قبل :</p> <p>0.45 -A 10 -B 0.25 -C 0.1 -D</p>	28																				
<p>مجموع احتمال المطلوب على المجموع الكلي</p>	<p>الجدول التالي يمثل توزيع مجموعة من الطلاب والطالبات حسب التخصص الدقيق بكلية إدارة الأعمال:</p> <table border="1" data-bbox="718 600 1114 772"> <thead> <tr> <th>المجموع</th> <th>طالبات</th> <th>طلاب</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>14</td> <td>10</td> <td>محاسبة</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>28</td> <td>16</td> <td>نظم</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>إدارة</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>54</td> <td>46</td> <td>المجموع</td> </tr> </tbody> </table> <p>تم اختيار أحد الدارسين من الجدول السابق بطريقة عشوائية، أحسب الاحتمالات التالية: -</p> <p>-احتمال أن يكون طالب:- 0.54 -A 0.46 -B 0.24 -C D- لا شيء مما سبق</p>	المجموع	طالبات	طلاب		24	14	10	محاسبة	44	28	16	نظم	32	12	20	إدارة	100	54	46	المجموع	29
المجموع	طالبات	طلاب																				
24	14	10	محاسبة																			
44	28	16	نظم																			
32	12	20	إدارة																			
100	54	46	المجموع																			
<p>مجموع احتمال المطلوب على المجموع الكلي</p>	<p>-احتمال أن تكون طالبة:- 0.54 -A 0.46 -B 0.24 -C D- لا شيء مما سبق</p>	30																				
<p>مجموع احتمال المطلوب على المجموع الكلي</p>	<p>-احتمال أن يكون من قسم المحاسبة:- 0.54 -A 0.46 -B 0.24 -C D- لا شيء مما سبق</p>	31																				
<p>نأخذ التقاطع لوجود (و) ولاتها أحداث غير متنافية</p>	<p>-احتمال أن يكون من قسم المحاسبة وطالب:- 0.24 -A 0.10 -B 0.46 -C D- لا شيء مما سبق</p>	32																				
<p>أحداث غير متنافية نجعل الاحتمالات ناقص التقاطع بينهم</p>	<p>-أن يكون طالبة أو من قسم المحاسبة:- 0.64 -A 0.78 -B 0.54 -C D- لا شيء مما سبق</p>	33																				
<p>أحداث غير متنافية نجعل الاحتمالات ناقص التقاطع بينهم</p>	<p>-أن يكون من قسم الإدارة أو طالب:- 0.78 -A 0.32 -B 0.58 -C D- لا شيء مما سبق</p>	34																				
<p>تقاطع الاثنين على الاخير</p> $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	<p>-احتمال أن يكون من قسم المحاسبة بشرط أن تكون طالبة:- $\frac{7}{27}$ -A $\frac{24}{100}$ -B $\frac{54}{100}$ -C D- لا شيء مما سبق</p>	35																				

<p>تقاطع الاثنين على الاخير</p> $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	<p>-احتمال أن يكون طالب بشرط أنه من قسم الإدارة:</p> <p>$\frac{32}{100}$ -A</p> <p>$\frac{5}{8}$ -B</p> <p>$\frac{20}{100}$ -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>قانون رقم : 1</p> $nCr \times p^x \times (1-p)^{n-x}$ <p>طريقة تطبيقه واستخدام الآلة الحاسبة : اختيار زر nCr بالضغط على زر shift بعدها زر ÷ وبالمعطيات : n,p,p-1=q</p>	<p>إذا كان احتمال حياة شخص عند العمر 30 هو 60% تم إختيار 5 أشخاص عند تمام العمر 30 أوجد :-</p> <p>-إحتمال حياة 4 أشخاص</p> <p>0.2304 -A</p> <p>0.2592 -B</p> <p>0.86256 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>قانون رقم : 2</p> $\mu = n \times p$	<p>-القيمة المتوقعة (الوسط الحسابي) :-</p> <p>5 -A</p> <p>0.60 -B</p> <p>3 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>قانون رقم : 3</p> <p>استخراج جذر التباين</p> $\sqrt{\sigma^2} = n \times p \times q$	<p>-الانحراف المعياري :-</p> <p>5 -A</p> <p>0.60 -B</p> <p>0.40 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق (1.095)</p>
<p>$nCx \times p^x \times (1-p)^{n-x}$</p>	<p>إذا علمت أنه: "أحد المصانع وجد أنه من بين كل 1000 وحدة هناك 150 وحدة معيبة، أخذت عينة مكونة من خمس وحدات، فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع ثنائي الحدين " أوجد الاحتمالات التالية: -</p> <p>-احتمال أن تكون الوحدات المختارة كلها سليمة: -</p> <p>0.5563 -A</p> <p>0.4437 -B</p> <p>0.8352 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>$nCx \times p^x \times (1-p)^{n-x}$</p>	<p>-احتمال وجود وحدة على الأكثر معيبة: -</p> <p>0.4437 -A</p> <p>0.3915 -B</p> <p>0.8352 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>$nCx \times p^x \times (1-p)^{n-x}$</p>	<p>-احتمال وجود وحدتان معيبتان على الأقل: -</p> <p>0.8325 -A</p> <p>0.1648 -B</p> <p>0.8500 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>$\mu = n \times p$</p>	<p>-القيمة المتوقعة للتوزيع المعبر عن عدد الوحدات المعيبة: -</p> <p>0.15 -A</p> <p>5 -B</p> <p>0.75 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>قانون رقم : 4</p> $\sigma^2 = n \times p \times q$	<p>-قيمة التباين للتوزيع المعبر عن عدد الوحدات المعيبة: -</p> <p>0.6375 -A</p> <p>0.8536 -B</p> <p>0.7984 -C</p> <p>-D لا شيء مما سبق</p>
<p>$nCx \times p^x \times (1-p)^{n-x}$</p>	<p>أحد الكليات الجامعية وجدت انه من بين كل 200 طالب هناك 40 طالب لا يتحدثون اللغة العربية كلغة أولى أخذت عينه مكونه من ستة طلاب (6 طلاب) فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع ثنائي الحدين اوجد الاحتمالات التالية</p> <p>- احتمال أن يكون من بينهم طالب واحد لا يتحدث اللغة العربية كلغة أولى</p> <p>0.393216 -A</p> <p>0.453437 -B</p> <p>0.878352 -C</p> <p>0.492453 -D</p>

$\mu = n \times p$	القيمة المتوقعة للتوزيع المعبر عن عدد الطلاب الذين لا يتحدثون اللغة العربية كلغة أولى : A- 0.6 B- 1.2 C- 0.1 D- 0.06	46	—
$\sigma^2 = n \times p \times q$	قيمة التباين للتوزيع المعبر عن عدد الوحدات المعيبة : A- 0.6 B- 0.96 C- 0.79 D- 0.73	47	—
$nCx \times p^x \times (1-p)^{n-x}$	في تجربة لإلقاء زهر النرد قام احد الأشخاص برمي زهر النرد خمس مرات (5 مرات) وكان مهتم بظهور الوجه 6 فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع ثنائي الحدين اوجد الاحتمالات التالية :- احتمال ظهور الوجه 6 في ثلاث رميات من الخمس رميات : A- 0.393216 B- 0.453437 C- 0.3215 D- 0.03215	48	—
$\mu = n \times p$	القيمة المتوقعة للتوزيع المعبر عن عدد مرات ظهور الوجه 6: A- 0.8333 B- 0.1667 C- 0.6 D- 5	49	—
$\sigma^2 = n \times p \times q$	قيمة التباين للتوزيع المعبر عن عدد الوحدات المعيبة : A- 0.1667 B- 5 C- 0.8333 D- 0.6944	50	—
قانون رقم : 5 $P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$ طريقة تطبيقه واستخدام الآلة الحاسبة: إشارة الكسر ثم shift ثم ln لإستخراج e ولإستخراج المضروب shift ثم x^{-1}	إذا علمت أن عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة من سلعة معينة خلال الشهر تتبع توزيع بواسون بمتوسط 3 وحدات شهريا، إذا عرف المتغير العشوائي x بأنه عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة خلال الشهر من هذه السلعة :- -إحتمال أن الأسرة تستهلك وحدتين خلال الشهر يساوي :- A- 0.0498 B- 0.2240 C- 0.4983 D- لا شيء مما سبق	51	المحاضرة الرابعة
$c.v = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$	-معامل الاختلاف النسبي للتوزيع السابق يساوي :- A- 100% B- 57.7% C- 90% D- لا شيء مما سبق	52	—
$P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$	إذا علمت أنه: " إذا كان من المعلوم أن عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة من سلعة معينة خلال الشهر تتبع توزيع بواسون بمتوسط 3 وحدات شهريا، إذا عرف المتغير العشوائي x بأنه عدد الوحدات التي تستهلكها الأسرة خلال الشهر من هذه السلعة " ما نوع المتغير العشوائي :- A- متغير وصفي B- متغير كمي متصل C- متغير كمي منفصل D- لا شيء مما سبق	53	—
$P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$	-احتمال أن الأسرة تستهلك وحدتين خلال الشهر يساوي :- A- 0.0498 B- 0.2240 C- 0.4983 D- لا شيء مما سبق	54	—

$P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$	- احتمال أن أسرة ما تستهلك 3 وحدات على الأكثر خلال الشهر: - A- 0.4983 B- 0.2240 C- 0.6474 D- لا شيء مما سبق	55
قانون رقم : 6	- القيمة المتوقعة للتوزيع السابق: - A- 3 B- 9 C- 1 D- لا شيء مما سبق	56
$\sigma^2 = \mu$ التباين في بواسون = المتوسط	- قيمة الانحراف المعياري للتوزيع السابق تساوي: - A- 3 B- 1.732 C- 0.0498 D- لا شيء مما سبق	57
$c.v = \frac{\sigma}{\mu} * 100$ الانحراف المعياري قسمة الوسط الحسابي ضرب 100	- معامل الاختلاف النسبي للتوزيع السابق يساوي: - A- 100% B- 57.7% C- 90% D- لا شيء مما سبق	58
	- شكل التوزيع السابق: - A- توزيع سالب الالتواء B- توزيع متماثل C- توزيع موجب الالتواء D- لا شيء مما سبق	59
$P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$	- إذا علمت أن متوسط عدد الأخطاء التي يقع بها أحد الكتاب يبلغ 5 أخطاء في الساعة احسب احتمال وقوع أربع أخطاء إذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع توزيع بواسون : A- 5 B- 0.175467 C- 0.006738 D- 4	60
$P_x = \frac{e^{-\mu} \times \mu^x}{x!}$	- إذا علمت أن متوسط عدد الأهداف التي تقوم إحدى الطائرات المقاتلة بإصابتها هو 4 أهداف يوميا احسب احتمال إصابة ثلاث أهداف إذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع توزيع بواسون : A- 4 B- 0.25 C- 0.1954 D- 1.1722	61
قانون رقم : 7	في دراسة الظاهرة متوسط طول الطالب في المرحلة الجامعية وجد أن متوسط طول الطالب يبلغ 170 سم وذلك بانحراف معياري قدرة 10 سم تم اختيار أحد الطلاب عشوائيا فإذا علمت أن هذه الظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي فوجد احتمال أن ينحصر طول الطالب بين 150 سم و 190 سم ($P(150 < x < 190)$) A- 68.26% B- 95.45% C- 99.74% D- 89.74%	62
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ القيمة - المتوسط / الانحراف المعياري [والإجابة من قيم الوسط الحسابي لتوزيع الطبيعي (حفظ)]	- احتمال أن يكون الطالب أقل من 180 سم ($P(x < 180)$) A- 68.26% B- 95.45% C- 99.74% D- 84.13%	63
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	- احتمال أن يكون طول الطالب أكبر من 160 سم : ($P(x > 160)$) A- 84.13% B- 15.86% C- 99.87% D- 84.13%	64

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>"إذا علمت أن متوسط سرعة السيارات على الطريق السريع الرياض مكة تمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي، وفي دراسة لهذه الظاهرة قامت هيئة الطرق بسحب عينة عشوائية من السيارات المارة في هذا الطريق ووجدت أن متوسط سرعة السيارة 120 كم في الساعة ، وذلك بانحراف معياري قدرة 15 كم في الساعة ، تم اختيار احد السيارات عشوانيا اوجد:-</p> <p>- احتمال أن تنحصر سرعة السيارة بين 90 كم و 150 كم $p(90 < x < 150)$:-</p> <p>A- 68.26% B- 95.45% C- 99.74% D- 89.74%</p>	65	—
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>-احتمال أن تكون سرعة السيارة أقل من 150 كم $P(x < 150)$</p> <p>A- 97.725% B- 95.45% C- 99.74% D- 84.13%</p>	66	—
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>- احتمال أن تكون سرعة السيارة أكثر من 105 كم $P(x > 105)$</p> <p>A- 84.13% B- 15.87% C- 99.74% D- 84.13%</p>	67	—
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>إذا علمت أن متوسط وزن الرسائل البحرية على إحدى السفن المارة بقناة السويس هو 360 كجم بانحراف معياري 20كجم ، تم اختيار احد الرسائل عشوانيا ، فإذا علمت ان هذه الظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي فأوجد :-</p> <p>-إحتمال أن ينحصر وزن الرسالة بين 320 كجم و 400 كجم $p(320 < x < 400)$:-</p> <p>A- 68.26% B- 95.45% C- 99.74% D- لا شئ مما سبق</p>	68	—
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>-إحتمال أن يكون وزن الرسالة أكبر من 300 كجم $p(x > 300)$:-</p> <p>A- 84.13% B- 15.87% C- 99.87% D- لا شئ مما سبق</p>	69	—
$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$	<p>-إحتمال أن يكون وزن الرسالة أقل من 320 كجم $p(x < 320)$:-</p> <p>A- 2.275% B- 99.45% C- 4.55% D- لا شئ مما سبق</p>	70	—
$\mu = n \times p$	<p>أجب عن الفقرات () و () باستخدام المعلومات التالية :</p> <p>-إذا علمت أن نسبة الحصول على احدى الوحدات المعيبة لانتاج احد المصانع 6% تم اختيار وحدتين ، أوجد :-</p> <p>- الوسط الحسابي لهذه الظاهرة يساوي :-</p> <p>A- 0.1272 B- 0.12 C- 0.1128 D- لا شئ مما سبق</p>	71	—
$\sigma^2 = n \times p \times q$	<p>- التباين المعبر عن هذه الظاهرة يساوي :-</p> <p>A- 0.1272 B- 0.12 C- 0.1128 D- لا شئ مما سبق</p>	72	—

	<p>في أسلوب..... يتم جمع البيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع.:-</p> <p>A- المعاينة</p> <p>B- الحصر الشامل</p> <p>C- العينة المحتمعية</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p> <p>- في..... يتم تقسيم المجتمع إلى طبقتين على الأقل ثم نختار العينة من كل منهما.:-</p> <p>A- العينة العمدية</p> <p>B- العينة المنتظمة</p> <p>C- العينة العنقودية</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p> <p>في..... يتم تقسيم المجتمع إلى مساحات أو أجزاء ثم نختار عشوائيا بعض هذه المساحات، ثم نختار جميع عناصرها بالعينة :-</p> <p>A- العينة الطبقيية</p> <p>B- العينة المنتظمة</p> <p>C- العينة العنقودية</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p> <p>في..... يتم تقسيم المجتمع إلى أجزاء ثم نختار العينة من كل جزء من أجزاء المجتمع وفقا للنسب المحددة</p> <p>A. العينة العمدية</p> <p>B. العينة الحصية</p> <p>C. العينة العنقودية</p> <p>D. لا شيء مما سبق</p>	73	المحاضرة الخامسة: نظرية																		
	<p>عرف كل من المصطلحات التالية: -</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>أسلوب الحصر الشامل</td> <td>وفيه تجمع البيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع، وهذا الأسلوب لا يتبع عادة إلا في حالة التعدادات التي تجريها الدول وتدعمها بإمكانيات ضخمة مثل تعدادات السكان والتعدادات الصناعية والتعدادات الزراعية.</td> </tr> <tr> <td>أسلوب المعاينة</td> <td>وفيه يتم جمع البيانات عن جزء من مفردات المجتمع يختار بطريقة أو بأخرى ويطلق عليه عينه (Sample) ثم بعد ذلك يتم تعميم نتائج الدراسة على المجتمع بأكمله.</td> </tr> <tr> <td>العينة العشوائية</td> <td>وهي العينة التي تكون لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس فرصة الاختيار في العينة</td> </tr> <tr> <td>العينة المنتظمة</td> <td>نختار نقطة بداية من المجتمع ثم نختار العنصر الموجود على بعد ثابت من هذه النقطة.</td> </tr> <tr> <td>العينة العنقودية</td> <td>يقسم المجتمع إلى مساحات أو أجزاء ثم نختار عشوائيا بعض هذه المساحات، ثم نختار جميع عناصرها بالعينة.</td> </tr> <tr> <td>العينة الطبقيية</td> <td>يقسم المجتمع إلى طبقتين على الأقل ثم نختار العينة من كل منهما.</td> </tr> <tr> <td>العينة الصدفة</td> <td>يتم اختيارها عن طريق الصدفة.</td> </tr> <tr> <td>العينة العمودية</td> <td>يتم اختيار أفراد العينة تحت شروط معينة لتحقيق الهدف من التجربة.</td> </tr> <tr> <td>العينة الحصية</td> <td>يقسم المجتمع إلى أجزاء ثم نختار العينة من كل جزء من أجزاء المجتمع وفقا للنسب المحددة.</td> </tr> </tbody> </table>	أسلوب الحصر الشامل	وفيه تجمع البيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع، وهذا الأسلوب لا يتبع عادة إلا في حالة التعدادات التي تجريها الدول وتدعمها بإمكانيات ضخمة مثل تعدادات السكان والتعدادات الصناعية والتعدادات الزراعية.	أسلوب المعاينة	وفيه يتم جمع البيانات عن جزء من مفردات المجتمع يختار بطريقة أو بأخرى ويطلق عليه عينه (Sample) ثم بعد ذلك يتم تعميم نتائج الدراسة على المجتمع بأكمله.	العينة العشوائية	وهي العينة التي تكون لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس فرصة الاختيار في العينة	العينة المنتظمة	نختار نقطة بداية من المجتمع ثم نختار العنصر الموجود على بعد ثابت من هذه النقطة.	العينة العنقودية	يقسم المجتمع إلى مساحات أو أجزاء ثم نختار عشوائيا بعض هذه المساحات، ثم نختار جميع عناصرها بالعينة.	العينة الطبقيية	يقسم المجتمع إلى طبقتين على الأقل ثم نختار العينة من كل منهما.	العينة الصدفة	يتم اختيارها عن طريق الصدفة.	العينة العمودية	يتم اختيار أفراد العينة تحت شروط معينة لتحقيق الهدف من التجربة.	العينة الحصية	يقسم المجتمع إلى أجزاء ثم نختار العينة من كل جزء من أجزاء المجتمع وفقا للنسب المحددة.	74	
أسلوب الحصر الشامل	وفيه تجمع البيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع، وهذا الأسلوب لا يتبع عادة إلا في حالة التعدادات التي تجريها الدول وتدعمها بإمكانيات ضخمة مثل تعدادات السكان والتعدادات الصناعية والتعدادات الزراعية.																				
أسلوب المعاينة	وفيه يتم جمع البيانات عن جزء من مفردات المجتمع يختار بطريقة أو بأخرى ويطلق عليه عينه (Sample) ثم بعد ذلك يتم تعميم نتائج الدراسة على المجتمع بأكمله.																				
العينة العشوائية	وهي العينة التي تكون لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس فرصة الاختيار في العينة																				
العينة المنتظمة	نختار نقطة بداية من المجتمع ثم نختار العنصر الموجود على بعد ثابت من هذه النقطة.																				
العينة العنقودية	يقسم المجتمع إلى مساحات أو أجزاء ثم نختار عشوائيا بعض هذه المساحات، ثم نختار جميع عناصرها بالعينة.																				
العينة الطبقيية	يقسم المجتمع إلى طبقتين على الأقل ثم نختار العينة من كل منهما.																				
العينة الصدفة	يتم اختيارها عن طريق الصدفة.																				
العينة العمودية	يتم اختيار أفراد العينة تحت شروط معينة لتحقيق الهدف من التجربة.																				
العينة الحصية	يقسم المجتمع إلى أجزاء ثم نختار العينة من كل جزء من أجزاء المجتمع وفقا للنسب المحددة.																				
<p>قانون رقم : 8</p> $\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ <p>قانون الوسط الحسابي للمجتمع</p> <p>\bar{x} = وسط العينة</p> <p>n = حجم العينة</p> <p>z = درجة الثقة (حفظ)</p> <p>σ = الإنحراف المعياري</p>	<p>- " في دراسة لظاهرة متوسط وزن الأطفال في سن الروضة ، أخذت عينة عشوائية من المجتمع مكونة من 64 طفل فوجد ان الوسط الحسابي لوزن الطفل في هذه العينة هو 20 كجم وذلك بانحراف معياري قدره 8 كجم " فإن فترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع بدرجة ثقة 95% هي :-</p> <p>A. (18.35 ، 21.56) كجم</p> <p>B. (18.04 ، 21.96) كجم</p> <p>C. (17.15 ، 22.58) كجم</p> <p>D. لا شيء مما سبق</p>	75	المحاضرة السادسة																		
$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>إن فترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع بدرجة ثقة 90 % هي :-</p> <p>A- (18.35 ، 21.65) كجم.</p> <p>B- (18.04 ، 21.96) كجم.</p> <p>C- (17.15 ، 22.58) كجم.</p> <p>D- لا شيء مما سبق.</p>	76																			
$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>إن فترة الثقة للوسط الحسابي للمجتمع بدرجة ثقة 99 % هي :-</p> <p>A- (18.35 ، 21.65) كجم.</p> <p>B- (18.04 ، 21.96) كجم.</p> <p>C- (17.15 ، 22.58) كجم.</p> <p>D- لا شيء مما سبق.</p>	77																			

$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>تم سحب عينة عشوائية من مجموع مجتمع العاملين في إحدى الدوائر الحكومية بلغ حجمها 200 موظف ، فإذا كان الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات تقرير تقييم الأداء الخاص بهم ، هما على الترتيب 68 درجة و 15 درجة، فإن فترة الثقة للوسط الحسابي لدرجات تقارير تقييم الأداء الخاص بهذه الدائرة الحكومية بدرجة ثقة 95% هي: -الحد الأدنى لفترة الثقة يساوي:.</p> <p>A- 65.92 درجة B- 68 درجة C- 70.08 درجة D- 200 درجة</p>	78
$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>- الحد الأعلى لفترة الثقة يساوي:.</p> <p>A- 65.92 درجة B- 68 درجة C- 70.08 درجة D- 200 درجة</p>	79
$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>تم سحب عينة عشوائية من مجموع مجتمع الطلاب في أحد الجامعات بلغ حجمها 144 طالب، فإذا كان الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الطلاب بالعينة هما على الترتيب 85 درجة و 10 درجات ، فإن فترة الثقة للوسط الحسابي لدرجات الطلاب في هذه الجامعة بدرجة ثقة 95% هي : -الحد الأدنى لفترة الثقة يساوي :</p> <p>A- 85 درجة B- 90 درجة C- 83.37 درجة D- 86.63 درجة</p>	80
$\mu = \bar{x} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<p>- الحد الأعلى لفترة الثقة يساوي :</p> <p>A- 85 درجة B- 90 درجة C- 83.37 درجة D- 86.63 درجة</p>	81
<p>قانون رقم 9:</p> $n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$ <p>z = درجة الثقة ، e = أقصى خطأ مسموح به ، σ^2 = تباين المجتمع (أو مربع الانحراف المعياري)</p>	<p>يرغب احد مديري المدارس الأهلية في تقدير متوسط عدد الوجبات التي يتم صرفها للطلاب في مدرسته خلال شهر بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير متوسط عدد الوجبات خلال الشهر الواحد عن 5 وجبات و بدرجة ثقة 95% ، ويعلم المدير من خبرته ان الانحراف المعياري هو 10 وجبات " <u>والمطلوب تقدير حجم العينة المطلوب لهذه الدراسة مقرباً الناتج الى الرقم الأعلى :-</u></p> <p>A- 11 عينة B- 16 عينة C- 33 عينة D- لا شيء مما سبق</p>	82
$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$	<p>-إذا كانت متوسط مستوى السكر في الدم لمجموعة من الأفراد بمدينة الرياض تمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي بانحراف معياري 20 درجة، فما هو حجم العينة المناسب لتقدير متوسط مستوى السكر في الدم في هذه المدينة بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير متوسط مستوى السكر 4 درجات، وذلك بدرجة ثقة 99% (مع تقريب الناتج للرقم الأعلى):-</p> <p>A- 60 مفردة B- 167 مفردة C- 170 مفردة D- 20 مفردة</p>	83
$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$	<p>- إذا كانت متوسط درجات الطلاب في مقرر التحليل الإحصائي يمثل ظاهرة تتبع التوزيع الطبيعي بانحراف معياري 12 درجة ، فما هو حجم العينة المناسب لتقدير متوسط درجات الطلاب في هذا المقرر بحيث لا يتعدى الخطأ في تقدير المتوسط 3 درجات وذلك بدرجة ثقة 99% (مع تقريب الناتج للرقم الأعلى):</p> <p>A- 60 مفردة B- 167 مفردة C- 170 مفردة D- 107 مفردة</p>	84

$$\mu = x \pm t \frac{S}{\sqrt{n}}$$

شروط توزيع t :

ويمكن تحديد الشروط الثلاثة لاستخدام توزيع t كما يلي:

أن يكون المجتمع المسحوبة منه العينة له توزيع طبيعي.

والانحراف المعياري للمجتمع غير معروف (أو مجهول).

والعينة صغيرة (حجمها أقل من 30 مفردة).

S = الانحراف المعياري للعينة ،

n = حجم العينة ،

x = متوسط ناتج العينة،

و قيمة t (الجدوليه) يتم استخراجها من

الجدول المرفق بالسؤال

" سحبت عينة عشوائية مكونة من 25 طالب من الطلاب الدارسين لمقرر الإحصاء في الإدارة فوجد أن متوسط درجاتهم 80 درجة وذلك بانحراف معياري للعينة S = 5 ومن المعروف أن درجات الطلاب موزعة طبقاً للتوزيع الطبيعي ، مما سبق يمكن إيجاد حدي الثقة لدرجات الطلاب عند درجة ثقة 95% تساوي :-

درجات الحرية	0.5	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
5	0.000	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
24	0.000	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.000	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787

A- (82.060 ، 77.94) درجة.

B- (81.711 ، 78.289) درجة.

C- (82.064 ، 77.936) درجة.

D- لا شيء مما سبق.

85

- "ان رفض الفرض العدمي بينما هو صحيح" يسمى

A- خطأ من النوع الأول

B- خطأ من النوع الثاني

C- الخطأ المعياري

D- لا شيء مما سبق

86

"في دراسة لتحديد ما إذا كان هناك فروق معنوية بين نوعين من الأسمدة على أحد المحاصيل الزراعية قام أحد الباحثين بسحب عينتين من المحاصيل أحدهما اعتمد في زراعته على النوع الأول من الأسمدة والآخر اعتمد على النوع الثاني ، وقام بدراسة مدى توافر أنواع معينة من البروتينات النباتية في كلا العينتين ، وتحليل نتائج العينتين قام الباحث بتلخيص النتائج كما يلي

أولاً : النوع الأول من الأسمدة	ثانياً: النوع الثاني من الأسمدة
$n_1=250$	$n_2=200$
$x_1 = 213$	$x_2 = 180$
$\sigma_1^2 = 50$	$\sigma_2^2 = 65$

ويرغب الباحث في اختبار الفرض العدمي القائل بأن متوسط حجم البروتينات الموجودة في نباتات العينة الأولى تساوي متوسط حجم البروتينات الموجودة في نباتات العينة الثانية بمستوى معنوية 5% مقابل الفرض البديل أنهما غير متساويين.

- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :

A- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 < \mu_2$

B- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu \neq \mu_2$

C- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 > \mu_2$

D- $H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 = \mu_2$

87

قانون رقم 10:

$$z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

كل المطلوب بالقانون سيكون واضح جداً بالسؤال بتكون مدرجة جاهزة فقط التعويض

- قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:

A- 45.544

B- 33

C- -45.544

D- 0.525

88

في دراسة لتحديد ما إذا كان هناك فروق معنوية بين بين المستوى الدراسي لكلا من الطلاب والطالبات الباحثين بسحب عينتين من المحاصيل أحدهما من الطلاب والآخرى من الطالبات الدارسين لمقرر التحليل الإحصائي ، وتحليل نتائج العينتين قام الباحث بتلخيص النتائج كما يلي :

أولاً : النوع الأول الطلاب	ثانياً: النوع الثاني الطالبات
$n_1=150$	$n_2=180$
$x_1 = 75$	$x_2 = 80$
$\sigma_1^2 = 50$	$\sigma_2^2 = 40$

ويرغب الباحث في اختبار الفرض العدمي القائل بأن متوسط درجات الطلاب تساوي متوسط درجات الطالبات في مقرر التحليل الإحصائي بمستوى معنوية 5% مقابل الفرض البديل أنهما غير متساويين.

- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :

A- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 < \mu_2$

B- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu \neq \mu_2$

C- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 > \mu_2$

D- $H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 = \mu_2$

89

$z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	<p>(18) قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:</p> <p>75 -A 6.7082 -B 5 -C -6.7082 -D</p> <p>90</p>
	<p>إذا علمت أنه: - البيانات التالية تمثل نتائج عينتين عشوائيتين مستقلتين مسحوبتين من منطقتين لمقارنة متوسط عمر الناخب فيهما حيث $n_1 = 100$ ، $n_2 = 80$ ، $X_1 = 35$ ، $X_2 = 29$. اختر الفرض العدمي: أن متوسط عمر الناخب في المنطقة الأولى يساوي متوسط عمر الناخب في المنطقة الثانية بمستوى معنوية 5% مقابل الفرض البديل أنهما غير متساويين إذا علمت أن: $\sigma_1^2 = 60$ ، $\sigma_2^2 = 32$. يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -</p> <p>-A $H_0 \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ -B $H_0 \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_1 < \mu_2$ -C $H_0 \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_2 \neq \mu_1$ -D لا شيء مما سبق</p> <p>91</p>
$z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	<p>قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي: -</p> <p>60 -A 6 -B 0.20 -C لا شيء مما سبق -D</p> <p>92</p>
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن: -</p> <p>-A قبول الفرض العدمي -B قبول الفرض البديل -C عدم قبول أي من الفرضين -D لا شيء مما سبق</p> <p>93</p>
	<p>عينة عشوائية حجمها 49 شخصاً اختيرت من أفراد دولة ما، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الأفراد الأسبوعية في العينة هو 75 ريال . كيف يمكن اختبار الفرض الصفري بأن متوسط الدخل الأسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 ريال مقابل الفرض البديل أنه لا يساوي 72 وذلك بمستوى معنوية 5% إذا علمت أن الانحراف المعياري لدخول الأفراد يساوي 14 ريال . يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -</p> <p>-A $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu < 72$ -B $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu > 72$ -C $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu \neq 72$ لا شيء مما سبق -D</p> <p>94</p>
<p>قانون رقم 11:</p> $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ <p>X = متوسط العينة m = متوسط المجتمع، n = حجم العينة، Q = الانحراف المعياري</p>	<p>- قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي :-</p> <p>3 -A 0.75 -B 1.5 -C لا شيء مما سبق -D</p> <p>95</p>
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية +1.96 و -1.96) -</p> <p>-A قبول الفرض العدمي -B قبول الفرض البديل -C عدم قبول أي من الفرضين -D لا شيء مما سبق</p> <p>96</p>
	<p>إذا علمت أنه: - عينة عشوائية حجمها 49 شخصاً اختيرت من أفراد دولة ما، فإذا كان الوسط الحسابي لدخول الأفراد الأسبوعية في العينة هو 75 ريال. ونرغب في اختيار الفرض العدمي بأن متوسط الدخل الأسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي 72 ريال مقابل الفرض البديل أنه لا يساوي 72 بمستوى معنوية 1% إذا علمت أن الانحراف المعياري لدخول الأفراد يساوي 14 ريال. " يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -</p> <p>-A $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu < 72$ -B $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu > 72$ -C $H_0 : \mu = 72$ ، $H_1 : \mu \neq 72$ -D لا شيء مما سبق</p> <p>97</p>

$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	<p>- قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي: -</p> <p>A- 3 B- 0.75 C- 1.5 D- لا شيء مما سبق</p>	
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن: -</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	
$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	<p>"إذا كان متوسط درجات الطالب في كلية إدارة الأعمال هو (83) درجة بانحراف معياري (5) درجات وذلك خلال عام 2010 أجرى أحد الباحثين دراسة عام 2014 لعينة قوامها (100) طالب ووجد أن متوسط درجات الطالب في العينة هو (88) درجة هل تشير الدراسة التي قام بها الباحث أن متوسط درجات الطالب في كلية إدارة الأعمال قد ارتفع عما عليه في 2010 وذلك بمستوى معنوية 5% - قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي:</p> <p>A- 10 B- 2.33 C- 83 D- 1.96</p>	
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية 1.645)</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- قبول كل من الفرضين</p>	
<p>قانون رقم 12:</p> $z_p = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}}$ <p>يستخدم هذا القانون عندما يطلب بالسؤال تقدير لنسبة المجتمع (وتكون لعينة مسحوية من المجتمع) .. ودائما في السؤال ادعاء من شخص اما يبحث او تجربة أو ترشيح على انتخابات .. وعبرة نسبة المجتمع P = نسبة العينة من المجتمع ، Z = معامل الثقة (حفظ مسبق) وتكون على حسب درجة الثقة ، n = حجم العينة</p>	<p>- يدعي أحد المرشحين في الانتخابات أنه سيحصل على نسبة 70% من أصوات الناخبين عندما تجري الانتخابات. ولاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الناخبين حجمها 100 ناخب، ووجد أن نسبة من يؤيدون المرشح في العينة هي 60% اختبر مدى صحة ادعاء المرشح بأن النسبة في المجتمع هي 70% مقابل الفرض البديل أن النسبة أقل من 70% وذلك بمستوى معنوية 5%. - يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل التالي :-</p> <p>A- $H_0 : P = 0.70$ ، $H_1 : P < 0.70$ B- $H_0 : P = 0.70$ ، $H_1 : P > 0.70$ C- $H_0 : P = 0.70$ ، $H_1 : P \neq 0.70$ D- لا شيء مما سبق</p>	
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية -1.645)</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	
$z_p = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}}$	<p>"يدعي أحد الباحثين أن نسبة النجاح لأحد التجارب التي يقوم بها في المعمل 60% ، ولاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الحيوانات الخاضعة للتجارب في معمله حجمها 225 مفردة ، ووجد أن نسبة النجاح في العينة قد بلغت هي 72% ، اختبر مدى صحة ادعاء الباحث بأن النسبة في المجتمع هي 60% مقابل الفرض البديل أن النسبة أقل من 60% وذلك بمستوى معنوية 5% - يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :</p> <p>A- $H_0 : P = 0.72$ ، $H_1 : P < 0.72$ B- $H_0 : P = 0.60$ ، $H_1 : P > 0.60$ C- $H_0 : P = 0.72$ ، $H_1 : P \neq 0.72$ D- $H_0 : P = 0.60$ ، $H_1 : P < 0.60$</p>	
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة z الجدولية -1.645)</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- قبول كل من الفرضين</p>	

$z_p = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}}$	<p>"يدعي أحد الأساتذة أن نسبة النجاح في احد المقررات التي يقوم بتدريسها تبلغ 80% ، ولاختبار هذا الادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الطلاب الدارسين لهذا المقرر حجمها 50 طالب، وبدراسة نتائج الاختبارات الخاصة بالعينة وجد أن نسبة النجاح في العينة قد بلغت هي 68% ،اختبر مدى صحة ادعاء أستاذ المقرر بأن النسبة في المجتمع هي 80% مقابل الفرض البديل أن النسبة أقل من 80% وذلك بمستوى معنوية 5% "</p> <p>- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :-</p> <p>A- $H_0 : P = 0.80$ ، $H1 : P < 0.80$</p> <p>B- $H_0 : P = 0.68$ ، $H1 : P > 0.68$</p> <p>C- $H_0 : P = 0.80$ ، $H1 : P \neq 0.80$</p> <p>D- $H_0 : P = 0.68$ ، $H1 : P < 0.68$</p>	106
	<p>-من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن(قيمة Z الجدولية -1.645):-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي</p> <p>B- قبول الفرض البديل</p> <p>C- رفض كل من الفرضين.</p> <p>D- قبول كل من الفرضين.</p>	107
$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	<p>إذا كان متوسط استهلاك الفرد السعودي من الدجاج حسب تقارير وزارة الصحة هو (12) كيلوجرام بانحراف معياري (6) كيلوجرامات لفترة السبعينات الميلادية. أجرى أحد الباحثين دراسة في عام 2003م من عينة قوامها (49) فرداً ووجد أن متوسط الاستهلاك للفرد هو (14) كيلوجرام. هل تشير الدراسة الحالية أن متوسط الاستهلاك ارتفع عما عليه في السبعينات وذلك بمستوى معنوية 5% -</p> <p>- قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي :-</p> <p>A- 2</p> <p>B- 2.33</p> <p>C- 0.33</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	108
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية 1.645)</p> <p>A- قبول الفرض العدمي</p> <p>B- قبول الفرض البديل</p> <p>C- عدم قبول اي من الفرضين</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	109
	<p>" عينة عشوائية تتكون من 400 عامل من عمال احد المصانع بمدينة بالقصيم وجد أن الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليومية لعمال العينة 7.5 ساعة عمل يوميا، وبالاتحراف المعياري يساوي 1,25 ساعة ، علما بان الوسط الحسابي لعدد ساعات العمل اليومية للعمال في هذه الصناعة يبلغ 9 ساعات ، اختبر أهمية الفرق المعنوي بين الوسط الحسابي لعدد ساعات عمل العمال بالعينة والوسط الحسابي لعدد ساعات العمل للعمال في الصناعة عموماً"</p> <p>- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل:-</p> <p>A- $H_0 : \mu = \mu_0$ ، $H1 : \mu < \mu_0$</p> <p>B- $H_0 : \mu = \mu_0$ ، $H1 : \mu > \mu_0$</p> <p>C- $H_0 : \mu > \mu_0$ ، $H1 : \mu \neq \mu_0$</p> <p>D- $H_0 : \mu = \mu_0$ ، $H1 : \mu \neq \mu_0$</p>	110
$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$ <p>تم استخدام قانون t لتقدير قيمة إحصائي الإختبار لأنه تم مقارنة بين متوسط الحسابي للعينة والوسط الحسابي للمجتمع وشبيه بقانون التقدير الحسابي للمجتمع z</p> <p>$X =$ متوسط العينة ،</p> <p>$m =$ متوسط المجتمع ،</p> <p>$n =$ حجم العينة ،</p> <p>$Q =$ الإنحراف المعياري</p>	<p>- قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة تساوي :-</p> <p>A- -24</p> <p>B- -2.94</p> <p>C- -11.006</p> <p>D- 24</p>	111
$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	<p>" إذا كان متوسط عدد ساعات العمل اليومي في قطاع الزراعة قد بلغ 8 ساعات عمل يومياً بانحراف معياري 4.5 ساعة وذلك خلال عام 2012، وقد قام أحد الباحثين بإجراء دراسة لعدد ساعات العمل اليومي للعاملين في قطاع الزراعة وذلك خلال عام 2014 وقد اعتمدت الدراسة على عينة عشوائية حجمها 40 عامل في هذا القطاع فوجد أن متوسط عدد ساعات العمال في هذا القطاع قد بلغ 9.1 يوماً. فهل تشير الدراسة التي قام بها الباحث أن متوسط عدد ساعات العمل في قطاع الزراعة قد ارتفع عما عليه في عام 2012 وذلك بمستوى معنوية 5% "</p> <p>- تساوي Z: قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة</p> <p>A- 9.1</p> <p>B- 9.77</p> <p>C- 15.811</p> <p>D- 1.546</p>	112

	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة Z الجدولية 1.645) :</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- قبول كل من الفرضين</p>	113	
	<p>إذا علمت أنه: - " إذا كان متوسط استهلاك الفرد السعودي من الدجاج حسب تقارير وزارة الصحة هو (12) كيلو جرام بانحراف معياري (60) كيلوجرامات لفترة السبعينات الميلادية، أجرى أحد الباحثين دراسة في عام 2013م من عينة قوامها (49) فرداً ووجد أن متوسط الاستهلاك للفرد هو (14) كيلو جرام، هل تشير الدراسة الحالية أن متوسط الاستهلاك ارتفع عما عليه في السبعينات. "</p> <p>يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -</p> <p>A- $H_0: \mu = 12$ ، $H_1: \mu > 12$ B- $H_0: \mu = 12$ ، $H_1: \mu < 12$ C- $H_0: \mu = 12$ ، $H_1: \mu \neq 12$ D- لا شيء مما سبق</p>	114	
$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	<p>-قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة Z تساوي: -</p> <p>A- 2 B- 2.33 C- 0.33 D- لا شيء مما سبق</p>	115	
	<p>-من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن: -</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	116	
	<p>إذا علمت أنه: - " لو كانت لدينا عينة عشوائية تتكون من 250 طالب وجد أن الوسط الحسابي لأطوال العينة 155.95 سم، والانحراف المعياري = 2.94 سم، علماً بأن الوسط الحسابي لأطول طلاب الجامعة يبلغ 158 سم، أختبر أهمية الفرق المعنوي بين الوسط الحسابي لأطوال طلاب العينة والوسط الحسابي لأطوال طلاب الجامعة</p> <p>يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -</p> <p>A- $H_0: \mu = \mu_0$ ، $H_1: \mu < \mu_0$ B- $H_0: \mu = \mu_0$ ، $H_1: \mu > \mu_0$ C- $H_0: \mu = \mu_0$ ، $H_1: \mu \neq \mu_0$ D- لا شيء مما سبق</p>	117	
	<p>-يسمى إحصائي الاختبار في هذه الحالة: -</p> <p>A- Z B- t C- H D- لا شيء مما سبق</p>	118	
$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	<p>-قيمة إحصائي الاختبار في هذه الحالة تساوي: -</p> <p>A- 2.0 B- 2.94 C- 11.006 D- لا شيء مما سبق</p>	119	
	<p>-من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن: -</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	120	

" قام أحد الباحثين بإجراء اختبار ليبحث مدى تأثير الدراسات الأجنبية الحديثة على المستوى الثقافي للطلاب فقام باختيار عينة عشوائية من طلاب إحدى الكليات بلغ حجمها 100 طالب مقسمين إلى مجموعتين كل واحد منهما حجمها 50 طالب، ثم عين أحدهما بطريقة عشوائية لتكون مجموعة تجريبية وهي المجموعة التي قام بتدريسها بعض الدراسات الأجنبية الحديثة والأخرى المجموعة الضابطة وهي المجموعة التي تدرس بالطريقة التقليدية، وفي نهاية التجربة وزع على المجموعتين استقصاء يقيس المستوى الثقافي للطلاب في كل من المجموعتين فكانت النتائج كما يلي:

المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية
$n_2 = 50$	$n_1 = 50$
$\bar{X}_2 = 79$	$\bar{X}_1 = 92$
$S_2 = 22$	$S_1 = 14$

وأردنا اختبار ما كان أداء المجموعة التجريبية أفضل من أداء المجموعة الضابطة عند مستوى معنوية 5% :
- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :

$$H_0 : \mu_1 > \mu_2 , H_1 : \mu_1 < \mu_2 \quad -A$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 < \mu_2 \quad -B$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad -C$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 > \mu_2 \quad -D$$

121

قانون رقم : 13

$$s = \frac{n_1 - 1 (S_1^2) + n_2 - 1 (S_2^2)}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s^2 = \sqrt{s^2}$$

كل المطلوب بالقانون يكون مذكور بالسؤال بشكل واضح فقط التعويض

- قيمة الانحراف المعياري s في هذه الحالة تساوي:

$$1.6 \quad -A$$

$$1.6 \quad -B$$

$$4.24 \quad -C$$

$$18 \quad -D$$

122

قانون رقم : 14

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

- قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي

$$-1.6 \quad -A$$

$$0.8485 \quad -B$$

$$2.77 \quad -C$$

$$15.32 \quad -D$$

123

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة t الجدولية تساوي 1.68) يمكن :

-A قبول الفرض العدمي

-B قبول الفرض البديل

-C عدم قبول أي من الفرضين

-D قبول كل من الفرضين

124

إذا علمت أنه - " أراد باحث أن يعرف أثر استخدام نظم مساندة القرارات على كفاءة القرارات التي تتخذها الإدارة بمساعدة تلك النظم، فوزع 50 مديراً لمنشآت صناعية عشوائياً في مجموعتين، ثم عين أحدهما بطريقة عشوائية لتكون مجموعة تجريبية والأخرى ضابطة، وفي نهاية التجربة وزع على المجموعتين استقصاء يقيس درجة فاعلية القرار وكفاءته عندما يتم اتخاذه باستخدام نظم مساندة القرارات بدلاً من الطريقة التقليدية فكانت النتائج كما يلي: -

المجموعة الضابطة	المجموعة التجريبية
$n_2 = 25$	$n_1 = 25$
$\bar{X}_2 = 6$	$\bar{X}_1 = 7.6$
$s_2^2 = 1.78$	$s_1^2 = 2.27$

وأردنا اختبار ما إذا كان أداء المجموعة التجريبية أفضل من أداء المجموعة الضابطة عند مستوى معنوية 5% :
- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل: -

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 > \mu_2 \quad -A$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 < \mu_2 \quad -B$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 , H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad -C$$

$$-D \quad \text{لا شيء مما سبق}$$

125

$$Df = n - 2$$

-درجات الحرية تساوي: -

$$50 \quad -A$$

$$49 \quad -B$$

$$48 \quad -C$$

-D لا شيء مما سبق

126

$$s = \frac{n_1 - 1 (S_1^2) + n_2 - 1 (S_2^2)}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

-قيمة الانحراف المعياري S في هذه الحالة تساوي: -

$$2.04 \quad -A$$

$$-2.04 \quad -B$$

$$2.4 \quad -C$$

-D لا شيء مما سبق

127

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

-قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي: -

$$-1.6 \quad -A$$

$$1.6 \quad -B$$

$$2.77 \quad -C$$

-D لا شيء مما سبق

128

	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة t الجدولية تساوي 1.68) يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول أي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	129																																						
<p>قانون رقم : 15</p> $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$	<p>أراد باحث أن يعرف أثر برنامج التدريب الصيفي في الميدان على أداء الطلاب وتحصيلهم في كلية العلوم الإدارية، ولغرض تحقيق ذلك قام الباحث باختبار الطلاب قبل وبعد البرنامج التدريبي، ولكون نفس الطلاب أخذوا الاختبارين، فإن الباحث يتوقع معامل ارتباط موجب بين تحصيل الطلبة في كلا القياسين. ولغرض اختبار مدى دلالة الفرق بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي، لابد على الباحث أن يتأكد من قيمة الارتباط بين الاختبارين والتي كانت $r = 0.46$ ، وقد كانت النتائج التي تم التوصل إليها كما يلي :</p> <table border="1" data-bbox="740 495 1091 622"> <thead> <tr> <th>الاختبار القبلي</th> <th>الاختبار البعدي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$n_1 = 100$</td> <td>$n_2 = 100$</td> </tr> <tr> <td>$X_1 = 54.28$</td> <td>$X_2 = 58.66$</td> </tr> <tr> <td>$S_1^2 = 49$</td> <td>$S_2^2 = 64$</td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الإجابة على الأسئلة التالية نرغب في التوصل ما إذا كانت هذه البيانات تدل على ان أداء الطلاب التحصيلي في الكتابة بعد أخذ البرنامج التدريبي قد اختلف عن ادائهم قبل البرنامج عند مستوى معنوية 5%:</p> <p>- يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على اشكل التالي :-</p> <p>A- $HO : \mu_1 = \mu_2 , HI : \mu_1 > \mu_2$ B- $HO : \mu_1 = \mu_2 , HI : \mu_1 < \mu_2$ C- $HO : \mu_1 = \mu_2 , HI : \mu_1 \neq \mu_2$ D- لا شيء مما سبق</p>	الاختبار القبلي	الاختبار البعدي	$n_1 = 100$	$n_2 = 100$	$X_1 = 54.28$	$X_2 = 58.66$	$S_1^2 = 49$	$S_2^2 = 64$	130																														
الاختبار القبلي	الاختبار البعدي																																							
$n_1 = 100$	$n_2 = 100$																																							
$X_1 = 54.28$	$X_2 = 58.66$																																							
$S_1^2 = 49$	$S_2^2 = 64$																																							
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة t الجدولية 1.980)</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول اي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	131																																						
	<p>إذا قدمت اليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-</p> <table border="1" data-bbox="580 1055 1251 1211"> <thead> <tr> <th colspan="7">T - test One – Sample test</th> </tr> <tr> <th colspan="7">Test Value = 160</th> </tr> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">T</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig.(2-tailed)</th> <th rowspan="2">Mean Difference</th> <th colspan="2">95% Confidence Interval of the difference</th> </tr> <tr> <th>Lower</th> <th>Upper</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الطول</td> <td>-11.006</td> <td>249</td> <td>0.000</td> <td>-2.0480</td> <td>-2.04145</td> <td>-1.6815</td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الجدول السابق يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول اي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	T - test One – Sample test							Test Value = 160								T	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the difference		Lower	Upper	الطول	-11.006	249	0.000	-2.0480	-2.04145	-1.6815	132								
T - test One – Sample test																																								
Test Value = 160																																								
	T	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the difference																																			
					Lower	Upper																																		
الطول	-11.006	249	0.000	-2.0480	-2.04145	-1.6815																																		
	<p>إذا قدمت اليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-</p> <table border="1" data-bbox="549 1402 1275 1581"> <thead> <tr> <th colspan="8">T- TEST Paired Sample test</th> </tr> <tr> <th colspan="8">Paired Difference</th> </tr> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Mean</th> <th rowspan="2">Std. Deviation</th> <th rowspan="2">Std. Error Mean</th> <th colspan="2">95% Confidence Interval of the Difference</th> <th rowspan="2">t</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig. (2-tailed)</th> </tr> <tr> <th>Lower</th> <th>Upper</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pair1</td> <td>Posttest pretest</td> <td>4.3800</td> <td>7.8570</td> <td>.7857</td> <td>2.8210</td> <td>5.9390</td> <td>5.57599</td> <td></td> <td>.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الجدول السابق يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- عدم قبول اي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	T- TEST Paired Sample test								Paired Difference										Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)	Lower	Upper	Pair1	Posttest pretest	4.3800	7.8570	.7857	2.8210	5.9390	5.57599		.000	133
T- TEST Paired Sample test																																								
Paired Difference																																								
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)																															
					Lower	Upper																																		
Pair1	Posttest pretest	4.3800	7.8570	.7857	2.8210	5.9390	5.57599		.000																															

	<p>- إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-</p> <table border="1" data-bbox="454 190 1388 369"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">T-TEST- Paired Sample test</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">Paired Difference</th> <th rowspan="2">t</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig. 2-tailed</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Mean</th> <th>Std. Deviation</th> <th>Std. Error Mean</th> <th colspan="2">95% Confidence Interval of the Difference</th> </tr> <tr> <th>Pair1</th> <th>Posttest Pretest</th> <td>24.238</td> <td>3.8372</td> <td>.3837</td> <th>Lower</th> <th>Upper</th> <td>6.763</td> <td>99</td> <td>.015</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.765</td> <td>25.861</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الجدول السابق يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي. B- قبول الفرض البديل . C- رفض كل من الفرضين. D- قبول كل من الفرضين.</p>			T-TEST- Paired Sample test										Paired Difference				t	df	Sig. 2-tailed			Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		Pair1	Posttest Pretest	24.238	3.8372	.3837	Lower	Upper	6.763	99	.015						13.765	25.861			
		T-TEST- Paired Sample test																																													
		Paired Difference				t	df	Sig. 2-tailed																																							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference																																										
Pair1	Posttest Pretest	24.238	3.8372	.3837	Lower	Upper	6.763	99	.015																																						
					13.765	25.861																																									
	<p>- إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-</p> <table border="1" data-bbox="470 571 1364 705"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">T-TEST One – Sample test</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Test Value = 160-</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th rowspan="2">t</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig.(2-tailed)</th> <th rowspan="2">Mean Difference</th> <th colspan="2">95% Confidence Interval of the Difference</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Lower</th> <th>Upper</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الطول</td> <td></td> <td>-21.006</td> <td>399</td> <td>0.012</td> <td>-82.0480</td> <td>-80.04145</td> <td>-80.6815</td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الجدول السابق يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي. B- رفض كل من الفرضين. C- قبول الفرض البديل . D- قبول كل من الفرضين.</p>			T-TEST One – Sample test								Test Value = 160-								t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference				Lower	Upper	الطول		-21.006	399	0.012	-82.0480	-80.04145	-80.6815										
		T-TEST One – Sample test																																													
		Test Value = 160-																																													
		t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference																																									
						Lower	Upper																																								
الطول		-21.006	399	0.012	-82.0480	-80.04145	-80.6815																																								
	<p>- إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي spss:</p> <table border="1" data-bbox="494 896 1340 1030"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">T- TEST One – Sample test</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Test Value=70</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th rowspan="2">t</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig.(2-tailed)</th> <th rowspan="2">Mean Difference</th> <th colspan="2">% 95 Confidence Interval of the Difference</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Lower</th> <th>Upper</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الوزن</td> <td></td> <td>-4.514</td> <td>199</td> <td>0.412</td> <td>112.0480</td> <td>90.04145</td> <td>120.6815</td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال البرنامج السابق يمكن :</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- رفض كل من الفرضين C- قبول الفرض البديل D- قبول كل من الفرضين</p>			T- TEST One – Sample test								Test Value=70								t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	% 95 Confidence Interval of the Difference				Lower	Upper	الوزن		-4.514	199	0.412	112.0480	90.04145	120.6815										
		T- TEST One – Sample test																																													
		Test Value=70																																													
		t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	% 95 Confidence Interval of the Difference																																									
						Lower	Upper																																								
الوزن		-4.514	199	0.412	112.0480	90.04145	120.6815																																								
	<p>- إذا قدمت إليك النتائج التالية كمخرجات للبرنامج الإحصائي SPSS :-</p> <table border="1" data-bbox="486 1220 1340 1400"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">T- TEST Paired Sample test</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">Paired Difference</th> <th rowspan="2">t</th> <th rowspan="2">df</th> <th rowspan="2">Sig. (2-tailed)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Mean</th> <th>Std. Deviation</th> <th>Std. Error Mean</th> <th colspan="2">% 95 Confidence Interval of the Difference</th> </tr> <tr> <th>Pair 1</th> <th>Posttest pretest</th> <td>4.3800</td> <td>7.8570</td> <td>.7857</td> <th>Lower</th> <th>Upper</th> <td>0.8546</td> <td>99</td> <td>.376</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.3765</td> <td>5.9390</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>من خلال الجدول السابق يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض العدمي B- قبول الفرض البديل C- رفض كل من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>			T- TEST Paired Sample test										Paired Difference				t	df	Sig. (2-tailed)			Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	% 95 Confidence Interval of the Difference		Pair 1	Posttest pretest	4.3800	7.8570	.7857	Lower	Upper	0.8546	99	.376						.3765	5.9390			
		T- TEST Paired Sample test																																													
		Paired Difference				t	df	Sig. (2-tailed)																																							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	% 95 Confidence Interval of the Difference																																										
Pair 1	Posttest pretest	4.3800	7.8570	.7857	Lower	Upper	0.8546	99	.376																																						
					.3765	5.9390																																									
<p>داخل المجموعات = المجموع الكلي – بين المجموعات متوسط المربعات = مجموع المربعات ÷ درجات الحرية قيمة F = المتوسط بين المجموعات ÷ المتوسط داخل</p>	<p>قام أحد الباحثين بتفريغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند معنوية 5%):</p> <table border="1" data-bbox="558 1601 1268 1758"> <thead> <tr> <th>مصدر التباين</th> <th>مجموع المربعات SS</th> <th>درجات الحرية df</th> <th>متوسط المربعات Means</th> <th>قيمة F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بين المجموعات</td> <td>200</td> <td>5</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>داخل المجموعات</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>الكلي (المجموع)</td> <td>280</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- قيمة إحصائي الاختبار F تساوي :</p> <p>A- 10 B- 5 C- 80 D- لا شيء مما سبق</p>	مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية df	متوسط المربعات Means	قيمة F	بين المجموعات	200	5	داخل المجموعات	الكلي (المجموع)	280	15																												
مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية df	متوسط المربعات Means	قيمة F																																											
بين المجموعات	200	5																																											
داخل المجموعات																																											
الكلي (المجموع)	280	15																																													

	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (قيمة F الجدولية تساوي 7.88)</p> <p>A- قبول الفرض البديل B- قبول الفرض العدمي C- عدم قبول أي من الفرضين D- لا شيء مما سبق</p>	139																					
<p>داخل المجموعات = المجموع الكلي - بين المجموعات متوسط المربعات = مجموع المربعات ÷ درجات الحرية قيمة F = المتوسط بين المجموعات ÷ المتوسط داخل</p>	<p>قام أحد الباحثين بتفريغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند مستوى معنوية 5%):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>مصدر التباين</th> <th>مجموع المربعات SS</th> <th>درجات الحرية df</th> <th>متوسط لمربعات Means</th> <th>قيمة F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بين المجموعات</td> <td>300</td> <td>15</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>داخل المجموعات</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>الكلي (المجموع) Total</td> <td>500</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- قيمة إحصائي الاختبار F تساوي :- A- 200 B- 0.5 C- 20 D- 5</p>	مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية df	متوسط لمربعات Means	قيمة F	بين المجموعات	300	15	داخل المجموعات	الكلي (المجموع) Total	500	20			140	
مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية df	متوسط لمربعات Means	قيمة F																			
بين المجموعات	300	15																			
داخل المجموعات																			
الكلي (المجموع) Total	500	20																					
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة F الجدولية تساوي 4.95) يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض البديل . B- قبول كل من الفرضين. C- عدم قبول أي من الفرضين. D- قبول الفرض العدمي.</p>	141																					
<p>داخل المجموعات = المجموع الكلي - بين المجموعات متوسط المربعات = مجموع المربعات ÷ درجات الحرية قيمة F = المتوسط بين المجموعات ÷ المتوسط داخل</p>	<p>"قام أحد الباحثين بتفريغ ما تم الحصول عليه من معلومات في جدول تحليل التباين كالتالي (عند مستوى معنوية 5%)"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>مصدر التباين</th> <th>مجموع المربعات SS</th> <th>درجات الحرية Df</th> <th>متوسط المربعات Means</th> <th>قيمة F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بين المجموعات</td> <td>1500</td> <td>10</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>داخل المجموعات</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>الكلي (المجموع) Total</td> <td>2000</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- قيمة إحصائي الاختبار F تساوي : A- 10 B- 150 C- 1.5 D- 500</p>	مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية Df	متوسط المربعات Means	قيمة F	بين المجموعات	1500	10	داخل المجموعات	الكلي (المجموع) Total	2000	15			142	
مصدر التباين	مجموع المربعات SS	درجات الحرية Df	متوسط المربعات Means	قيمة F																			
بين المجموعات	1500	10																			
داخل المجموعات																			
الكلي (المجموع) Total	2000	15																					
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة F الجدولية تساوي 9.35) يمكن :</p> <p>A- قبول الفرض البديل. B- قبول الفرض العدمي C- عدم قبول أي من الفرضين D- قبول كل الفرضين</p>	143																					
قانون رقم : 16	<p>- أن معامل الارتباط بين ثلاث ظواهر اقتصادية قد بلغت ($r = 0.91$) وكان عدد المفردات التي تم دراستها ($n=10$) وقد رغب الباحث في دراسة معنوية الارتباط وذلك بمستوى 5% " فان قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي :-</p> <p>A- 0.06208 B- -0.06208 C- 6.208 D- لا شيء مما سبق</p>	144	المحاضرة العاشرة																				
$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$	<p>- إذا علمت أن " معامل الارتباط بين ثلاث ظواهر اقتصادية قد بلغت ($r=0.85$) وكان عدد المفردات التي تم دراستها ($n=45$) ، وقد رغب الباحث في دراسة معنوية الارتباط وذلك بمستوى 5% " فان قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي :-</p> <p>A- 10.7 B- -0.2775 C- 0.2775 D- 0.0794</p>	145																					
$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$																							

$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$	<p>إذا علمت أن " معامل الارتباط بين ثلاث ظواهر اقتصادية قد بلغت (r=0.64) وكان عدد المقدرات التي تم دراستها (n=25) ، وقد رغب الباحث في دراسة معنوية الارتباط وذلك بمستوى 5% " فإن قيمة إحصائي الاختبار t في هذه الحالة تساوي :-</p> <p>146 —</p> <p>A - 6.075 B - 3.9946 C - 6.208 D - 3.9946</p>																																																						
<p>عبارة عن مجموع المربعات الأعمدة الزوجية 2 و 4 و 6 ناقص مجموع x الأعمده الفردية 1 و 3 و 5 تربيع على عدد مقدرات العينة ضرب عدد المجموعات</p> $Total..SS = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{(n_g)(k)}$ $= 879 - \frac{(105)^2}{15} = 144$	<p>إذا علمت أنه: " إذا كان لدينا ثلاث منتجات لإحدى الشركات الصناعية، وتم تقييمها من قبل مجموعة من المستهلكين وحصلنا على النتائج التالية (عند مستوى معنوية 5%) :-</p> <table border="1" data-bbox="651 450 1177 678"> <thead> <tr> <th colspan="2">المنتج الأول</th> <th colspan="2">المنتج الثاني</th> <th colspan="2">المنتج الثالث</th> </tr> <tr> <th>X₁</th> <th>X₁²</th> <th>X₂</th> <th>X₂²</th> <th>X₃</th> <th>X₃²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>49</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100</td> <td>6</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>100</td> <td>7</td> <td>49</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>121</td> <td>9</td> <td>81</td> <td>7</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>144</td> <td>9</td> <td>81</td> <td>6</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>514</td> <td>35</td> <td>263</td> <td>20</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td colspan="6">المجموع</td> </tr> </tbody> </table> <p>مجموع المربعات الكلي يساوي: -</p> <p>147</p> <p>A - 879 B - 105 C - 144 D - لا شيء مما سبق</p>	المنتج الأول		المنتج الثاني		المنتج الثالث		X ₁	X ₁ ²	X ₂	X ₂ ²	X ₃	X ₃ ²	7	49	4	16	2	4	10	100	6	36	2	4	10	100	7	49	3	9	11	121	9	81	7	49	12	144	9	81	6	36	50	514	35	263	20	102	المجموع					
المنتج الأول		المنتج الثاني		المنتج الثالث																																																			
X ₁	X ₁ ²	X ₂	X ₂ ²	X ₃	X ₃ ²																																																		
7	49	4	16	2	4																																																		
10	100	6	36	2	4																																																		
10	100	7	49	3	9																																																		
11	121	9	81	7	49																																																		
12	144	9	81	6	36																																																		
50	514	35	263	20	102																																																		
المجموع																																																							
$Between..SS = \sum \frac{(\sum x_g)^2}{n_g} - \frac{(\sum x)^2}{(n_g)(k)}$ $= \frac{(50)^2}{5} + \frac{(35)^2}{5} + \frac{(20)^2}{5} - \frac{(105)^2}{15} = 90$	<p>مجموع المربعات بين المجموعات يساوي: -</p> <p>148</p> <p>A - 90 B - 105 C - 35 D - لا شيء مما سبق</p>																																																						
<p>مجموع المربعات الكلي - مجموع المربعات بين المجموعات</p> <p>54=90 - 144 =</p>	<p>مجموع المربعات داخل المجموعات: -</p> <p>149</p> <p>A - 22 B - 54 C - 18 D - لا شيء مما سبق</p>																																																						
$(n \times k - 1)$ $5 \times 3 - 1 = 14$	<p>درجات الحرية الكلية تساوي: -</p> <p>150</p> <p>A - 2 B - 12 C - 14 D - لا شيء مما سبق</p>																																																						
<p>أولا نحسب التباين بين المجموعات وهو مجموع المربعات بين المجموعات 90 على k-1 أي 90/2= 45 ثم نحسب التباين داخل المجموعات عبارة عن مجموع المربعات داخل المجموعات 54 على درجات الحرية داخل المجموعات 12 أي 54/12=4.5</p> $F = \frac{Between..groups..mean..square}{Within..groups..mean..square} = \frac{45}{4.5} = 10$	<p>قيمة إحصائي الاختبار F تساوي: -</p> <p>151</p> <p>A - 45 B - 10 C - 15 D - لا شيء مما سبق</p>																																																						
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة F الجدولية تساوي 3.88) يمكن: -</p> <p>152</p> <p>A - قبول الفرض البديل B - قبول الفرض العدمي C - عدم قبول أي من الطرفين D - لا شيء مما سبق</p>																																																						

إراد احد الباحثين اختبار معنوية توفيق منتظم لتوزيع مجموعة من موظفي احدى الشركات حسب فئات الدخل الشهري والجدول التالي يوضح التكرارات المشاهدة والمتوقعة لتوزيع الدخل :

فئات الدخل الشهري	التكرارات المشاهدة	التكرارات المتوقعة
100 -	12	20
200 -	15	20
300 -	22	20
400 -	35	20
500 -600	16	20
المجموع	100	100

- قيمة χ^2 المحسوبة تساوي :

A- 100

B- 16.7

C- 334

D- لا شيء مما سبق

153

أولاً: عمود 4 =
(ش - ت) ²
تربيع (المشاهدة - المتوقعة)

ثانياً: عمود 5 =
(ش - ت) ² ÷ ت
نتائج التربيع ÷ المتوقعة

ثالثاً: مجموع العمود 5 = قيمة χ^2

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (إذا علمت ان قيمتي χ^2 الجدولية (0.484 ، 11.1) يمكن :-

A- قبول الفرض البديل

B- قبول الفرض العدمي

C- عدم قبول اي من الفرضين

D- لا شيء مما سبق

154

قامت إحدى شركات الأدوية بتوريد 100 كرتونه مصلى الحمة الشوكية لأحد المستشفيات كل كرتونة تحتوي على 30 زجاجة مصلى و لوحظ توزيع عدد زجاجات المصلى المكسورة بالكرتونة ويرغب احد الباحثين في اختبار مدى اتفاق هذه الظاهرة وتوزيع ثنائي الحدين على ذلك فقد توصل الى الجدول التالي والذي يستخدمه لحساب χ^2 ، مع الأخذ بالاعتبار انه قام بدمج الخلايا الثلاث الاخيرة 3 و 4 و 5 كما يلي :-

عدد الزجاجات المكسورة	التكرارات المشاهدة	التكرارات المتوقعة
0	22	16.81
1	28	36.02
2	35	30.87
3-5	15	16.31
المجموع	100	100

هل يتفق هذا التوزيع مع توزيع ثنائي الحدين حسب التكرار المتوقع الموضح في الجدول السابق ، اكمل الجدول السابق واجب عما يلي:-

- قيمة χ^2 المحسوبة تساوي:-

A- 4.12

B- 30

C- 100

D- 11.11

155

أولاً: عمود 4 =
(ش - ت) ²
تربيع (المشاهدة - المتوقعة)

ثانياً: عمود 5 =
(ش - ت) ² ÷ ت
نتائج التربيع ÷ المتوقعة

ثالثاً: مجموع العمود 5 = قيمة χ^2

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة χ^2 الجدولية (7.38 ، 0.0506) يمكن :-

A- قبول الفرض البديل

B- قبول الفرض العدمي

C- رفض كل من الفرضين.

D- قبول كل من الفرضين

156

قامت إحدى الكليات بدراسة ظاهرة نجاح الطلاب في مقررات اللغة الفرنسية وقد اعتمدت الدراسة على عينه مكونه من 200 طالب ، تم إخضاعهم لثلاث اختبارات تقيس قدرات الطالب في اللغة الفرنسية ، وترغب إدارة الكلية في اختبار مدى اتفاق هذه الظاهرة وتوزيع ثنائي الحدين وعلى ذلك فقد تم التوصل إلى الجدول التالي والذي يوضح عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات والذي يتم استخدامه في حساب χ^2 :-

عدد الزجاجات المكسورة	التكرارات المشاهدة	التكرارات المتوقعة
0	30	10
1	60	50
2	90	80
3	20	60
المجموع	200	200

هل يتفق هذا التوزيع مع توزيع ثنائي الحدين حسب التكرار المتوقع الموضح في الجدول السابق ، من خلال استكمال الجدول السابق، ثم اجب عما يلي:-

- قيمة χ^2 المحسوبة تساوي:-

A- 96.11

B- 69.92

C- 200

D- 3

157

أولاً: عمود 4 =
(ش - ت) ²
تربيع (المشاهدة - المتوقعة)

ثانياً: عمود 5 =
(ش - ت) ² ÷ ت
نتائج التربيع ÷ المتوقعة

ثالثاً: مجموع العمود 5 = قيمة χ^2

	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة كا2 الجدولية (21.15 ، 0.925) يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض البديل . B- قبول الفرض العدمي C- رفض كل من الفرضين. D- قبول كل من الفرضين.</p>	158																				
<p>أولاً نحسب التكرار المتوقع :- مجموع الصف * مجموع العمود / المجموع الكلي ثانياً نكرر نفس الطريقة بحالة الفشل مع الثلاث صفوف ثالثاً نكمل الجدول عمود (ش-ت)² رابعاً: نكمل عمود (ش-ت) ² بـ ت خامساً قيمة كا2 = المجموع الكلي لعمود (ش-ت) ² بـ ت</p>	<p>اراد احد الباحثين اختبار معنوية توفيق منتظم لتوزيع مجموعة من موظفي احدى الشركات حسب فئات الدخل الشهري والجدول التالي يوضح التكرارات المشاهدة والمتوقعة لتوزيع الدخل :</p> <table border="1" data-bbox="699 405 1129 533"> <thead> <tr> <th>النتيجة القسم</th> <th>فشل</th> <th>نجاح</th> <th>المجموع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الغزل</td> <td>15</td> <td>65</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>النسيج</td> <td>8</td> <td>62</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>الطباعة</td> <td>12</td> <td>38</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>المجموع</td> <td>35</td> <td>165</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>ما اذا كانت قدرات المتدربين متقاربة في الاقسام الثلاثة بدرجة ثقة 95% واجب عن الاسئلة التالية:- A- 3.337 B- 200 C- 12.847 D- لا شئ مما سبق</p>	النتيجة القسم	فشل	نجاح	المجموع	الغزل	15	65	80	النسيج	8	62	70	الطباعة	12	38	50	المجموع	35	165	200	159
النتيجة القسم	فشل	نجاح	المجموع																			
الغزل	15	65	80																			
النسيج	8	62	70																			
الطباعة	12	38	50																			
المجموع	35	165	200																			
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن (إذا علمت ان قيمتي كا² الجدولية 0.01 ، 10.6) يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض البديل B- قبول الفرض العدمي C- عدم قبول اي من الفرضين D- لا شئ مما سبق</p>	160																				
<p>قانون رقم 17: $X^2 = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$ S2 = تباين الاول قبل سحب العينة Q2 = التباين الثاني بعد سحب العينة N = حجم العينة .</p>	<p>إذا علمت أن تباين درجات الطلاب في جامعة الملك فيصل لا تقل عن 10 درجة، وتستخدم الجامعة الآن طريقة جديدة في التدريس يعتقد أنها ستقلل من تباين درجات الطلاب ، سحبت عينة عشوائية من 12 طالب فوجد تباينها يساوي 24 . بافتراض أن درجات الطلاب تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بانخفاض معنوية التباين عند مستوى معنوية $\alpha = 0.01$. من خلال الاجابة عن الاسئلة التالية :- - يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على اشكل التالي :- A- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ B- $H_0 : \sigma^2 = 15$ ، $H_1 : \sigma^2 \neq 15$ C- $H_0 : \sigma^2 \geq 10$ ، $H_1 : \sigma^2 < 10$ D- لا شئ مما سبق</p>	161																				
<p>قانون رقم 17: $X^2 = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$ S2 = تباين الاول قبل سحب العينة Q2 = التباين الثاني بعد سحب العينة N = حجم العينة .</p>	<p>- قيمة إحصائي الاختبار كا² في هذه الحالة يمكن :- A- 12 B- 11.25 C- 26.4 D- لا شيء مما سبق</p>	162																				
	<p>"إذا علمت أن تباين عدد ساعات عمل المصاييح الكهربائية التي تنتجها إحدى الشركات لا تزيد عن 10000 ساعة ، وتستخدم الشركة الآن طريقة إنتاج جديدة يعتقد أنها ستزيد من تباين عدد ساعات عمل المصاييح ، سحبت عينة عشوائية من 100 مصباح فوجد تباينها يساوي 1800 ، بافتراض أن عدد ساعات عمل المصاييح تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بوجود زيادة معنوية في التباين عند مستوى معنوية 5% من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية : يمكن صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل :</p> <p>A- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ B- $H_0 : \sigma^2 = 10000$ ، $H_1 : \sigma^2 \neq 10000$ C- $H_0 : \sigma^2 \leq 10000$ ، $H_1 : \sigma^2 \geq 10000$ D- $H_0 : \sigma^2 > 10000$ ، $H_1 : \sigma^2 \leq 10000$</p>	163																				
<p>$X^2 = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$</p>	<p>-قيمة إحصائي الاختبار كا2 في هذه الحالة تساوي: A- 100 B- 1800 C- 550 D- 17.82</p>	164																				
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض (إذا علمت أن قيمة كا2 الجدولية تساوي 25) يمكن :- A- قبول الفرض البديل B- قبول الفرض العدمي C- عدم قبول أي من الفرضين D- قبول كل من الفرضين</p>	165																				

	<p>"إذا علمت أن تباين عدد ساعات الطيران في الخطوط السعودية لا يزيد عن 20000 ساعة طيران شهريا ، وتستخدم الشركة الآن طريقة جديدة لتسيير خطوط الطيران الداخلي لتكون في معزل عن الخطوط الخارجية مما يترتب عليه زيادة عدد ساعات الطيران ، سحبت عينه عشوائية من 40 طائرة فوجد تباينها عدد ساعات طيرانها تساوي 5000 ساعة ، بافتراض أن عدد ساعات الطيران تتبع التوزيع المعتدل ، اختبر الفرض القائل بوجود زيادة معنوية في التباين عند مستوى معنوية $\alpha=0.01$ من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية :-</p> <p>- صياغة الفرض العدمي والفرض البديل على الشكل:-</p> <p>-A $H_0 : \sigma^2 \leq 20000$ ، $H1 : \sigma^2 \geq 20000$</p> <p>-B $H_0 : \sigma^2 = 20000$ ، $H1 : \sigma^2 \neq 20000$</p> <p>-C $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ، $H1 : \mu_1 > \mu_2$</p> <p>-D $H_0 : \sigma^2 > 20000$ ، $H1 : \sigma^2 \leq 20000$</p>	166																											
$X^2 = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$	<p>- قيمة إحصائي الاختبار كا2 في هذه الحالة تساوي:-</p> <p>-A 40</p> <p>-B 156</p> <p>-C 9.75</p> <p>-D 5000</p>	167																											
	<p>" احد الباحثين قام بدراسة متوسط الدخل في قطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية ، واستخدم اختبار كولومجروف لاختبار جودة التوفيق لهذه الظاهرة ، وحصل على النتائج التالية</p> <table border="1" data-bbox="651 645 1182 875"> <thead> <tr> <th colspan="3">NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td></td> <td>250</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Normal Parameters a,b</td> <td>Mean</td> <td>6800</td> </tr> <tr> <td>Std-Deviation</td> <td>192.34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Most Extreme Differences</td> <td>Absolute</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Positive</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Negative</td> <td>-12.437</td> </tr> <tr> <td>Kolmogorov-Smirnov Z</td> <td></td> <td>.069</td> </tr> <tr> <td>Asymp-Sig-(2-tailed)</td> <td></td> <td>.078</td> </tr> </tbody> </table> <p>- متوسط الدخل في هذا القطاع هو :-</p> <p>-A 250</p> <p>-B 6800</p> <p>-C 192.34</p> <p>-D 0.069</p>	NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			N		250	Normal Parameters a,b	Mean	6800	Std-Deviation	192.34			Most Extreme Differences	Absolute	43	Positive	43		Negative	-12.437	Kolmogorov-Smirnov Z		.069	Asymp-Sig-(2-tailed)		.078	168
NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test																													
N		250																											
Normal Parameters a,b	Mean	6800																											
	Std-Deviation	192.34																											
Most Extreme Differences	Absolute	43																											
	Positive	43																											
	Negative	-12.437																											
Kolmogorov-Smirnov Z		.069																											
Asymp-Sig-(2-tailed)		.078																											
	<p>- الانحراف المعياري لدخل الموظفين في هذا القطاع:-</p> <p>-A 250</p> <p>-B 6800</p> <p>-C 192.34</p> <p>-D 0.069</p>	169																											
<p>قاعدة: دائما في جداول spss ناخذ قيمة sig من الجدول ونطرح منها 5% (Sig – 0.05) >تقرأ من اليسار إذا كان الناتج اشارته موجب أي أكبر من 5% :نقبل العدمي وإذا كان الناتج اشارته سالب أي أصغر من 5% :نقبل البديل</p>	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن:-</p> <p>-A قبول الفرض البديل القائل بان البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي .</p> <p>-B قبول الفرض العدمي القائل بان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .</p> <p>-C عدم قبول أي من الفرضين.</p> <p>-D قبول الفرض البديل القائل بان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .</p>	170																											
	<p>" قام أحد الأساتذة بدراسة متوسط درجات مجموعة من الطلاب في مقرر التحليل الإحصائي، واستخدم اختبار كولومجروف سيمرنوف لجودة التوفيق وحصل على النتائج التالية</p> <table border="1" data-bbox="651 1420 1182 1682"> <thead> <tr> <th colspan="3">NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td></td> <td>درجات الطلاب</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Normal Parameters a,b</td> <td>Mean</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Std-Deviation</td> <td>5.987</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Most Extreme Differences</td> <td>Absolute</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Positive</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Negative</td> <td>.164</td> </tr> <tr> <td>Kolmogorov-Smirnov Z</td> <td></td> <td>.0142</td> </tr> <tr> <td>Asymp-Sig-(2-tailed)</td> <td></td> <td>.027</td> </tr> </tbody> </table> <p>- متوسط درجات الطلاب يساوي:-</p> <p>-A 50</p> <p>-B 5.987</p> <p>-C 82</p> <p>-D 100</p>	NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			N		درجات الطلاب	Normal Parameters a,b	Mean	100	Std-Deviation	5.987			Most Extreme Differences	Absolute	2	Positive	2		Negative	.164	Kolmogorov-Smirnov Z		.0142	Asymp-Sig-(2-tailed)		.027	171
NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test																													
N		درجات الطلاب																											
Normal Parameters a,b	Mean	100																											
	Std-Deviation	5.987																											
Most Extreme Differences	Absolute	2																											
	Positive	2																											
	Negative	.164																											
Kolmogorov-Smirnov Z		.0142																											
Asymp-Sig-(2-tailed)		.027																											
	<p>- الانحراف المعياري لدرجات الطلاب:-</p> <p>-A 100</p> <p>-B 5.987</p> <p>-C 82</p> <p>-D 0.027</p>	172																											

	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن:-</p> <p>A- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي .</p> <p>B- قبول الفرض العدمي القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .</p> <p>C- عدم قبول أي من الفرضين.</p> <p>D- قبول الفرض البديل القائل بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي .</p>	173																									
	<p>قام أحد الباحثين بدراسة على متوسط عدد الزبائن لأحد المطاعم الشهيرة واستخدم اختبار كولومجروف سيمرنوف لجودة التوفيق وحصل على النتائج التالية :-</p> <table border="1" data-bbox="651 367 1182 607"> <thead> <tr> <th colspan="3">NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td></td> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Normal Parameters a,b</td> <td>Mean</td> <td>15.26</td> </tr> <tr> <td>Std-Deviation</td> <td>6.782</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Most Extreme Differences</td> <td>Absolute</td> <td>.081</td> </tr> <tr> <td>Positive</td> <td>.081</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Negative</td> <td>-.069</td> </tr> <tr> <td>Kolmogorov-Smirnov Z</td> <td></td> <td>.573</td> </tr> <tr> <td>Asymp-Sig-(2-tailed)</td> <td></td> <td>.898</td> </tr> </tbody> </table> <p>- قيمة إحصائي الاختبار كولومجروف سيمرنوف لجودة المطابقة هو :-</p> <p>A- .069</p> <p>B- .573</p> <p>C- .898</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			N		50	Normal Parameters a,b	Mean	15.26	Std-Deviation	6.782	Most Extreme Differences	Absolute	.081	Positive	.081		Negative	-.069	Kolmogorov-Smirnov Z		.573	Asymp-Sig-(2-tailed)		.898	174
NPar Tests One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test																											
N		50																									
Normal Parameters a,b	Mean	15.26																									
	Std-Deviation	6.782																									
Most Extreme Differences	Absolute	.081																									
	Positive	.081																									
	Negative	-.069																									
Kolmogorov-Smirnov Z		.573																									
Asymp-Sig-(2-tailed)		.898																									
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن</p> <p>A- قبول الفرض البديل .</p> <p>B- قبول الفرض العدمي .</p> <p>C- عدم قبول أي من الفرضين .</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>	175																									
	<p>قام أحد المراكز البحثية باختبار متوسط استهلاك البنزين في كلا من مدينة جدة والدمام وذلك بصدد الوقوف على ما إذا كان هناك اختلاف في متوسط الاستهلاك في مدن المملكة العربية السعودية ، ومن ثم قامت بسحب عينه من المدينتين ومن خلال إدخال البيانات وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وعند مستوى معنوية 5% ، تم الحصول على النتائج التالية:-</p> <table border="1" data-bbox="651 1003 1177 1171"> <thead> <tr> <th colspan="2">Test Statistics</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SAMPLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mann-Whitney U</td> <td>41.000</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>-.063</td> </tr> <tr> <td>Asymp . Sig . (2-tailed)</td> <td>.192</td> </tr> <tr> <td>Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]</td> <td>.219</td> </tr> </tbody> </table> <p>- الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متوسطي مجتمعين في هذه الحالة :-</p> <p>A- كا² .</p> <p>B- الإشارة.</p> <p>C- ويلكوكسون.</p> <p>D- مان ويتني.</p>	Test Statistics			SAMPLES	Mann-Whitney U	41.000	Z	-.063	Asymp . Sig . (2-tailed)	.192	Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.219	176													
Test Statistics																											
	SAMPLES																										
Mann-Whitney U	41.000																										
Z	-.063																										
Asymp . Sig . (2-tailed)	.192																										
Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.219																										
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض البديل .</p> <p>B- قبول الفرض العدمي</p> <p>C- رفض كل من الفرضين.</p> <p>D- قبول كل من الفرضين.</p>	177																									
	<p>" قام أحد الباحثين بمقارنة عينة من درجات الطلاب في مادة المحاسبة بكلية إدارة الأعمال جامعة الملك فيصل بأخرى من جامعة الدمام وذلك بصدد الوقوف على ما إذا كان هناك اختلاف في متوسط الدرجات وذلك عند مستوى معنوية 5%، وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS حصلنا على النتائج التالية " :-</p> <table border="1" data-bbox="719 1532 1110 1715"> <thead> <tr> <th colspan="2">Test Statistics</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SAMPLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mann-Whitney U</td> <td>44.000</td> </tr> <tr> <td>Wilcoxon W</td> <td>99.000</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>-.457</td> </tr> <tr> <td>Asymp .Sig . (2-tailed)</td> <td>.648</td> </tr> <tr> <td>Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]</td> <td>.684</td> </tr> </tbody> </table> <p>- الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متوسطي مجتمعين في هذه الحالة :-</p> <p>A- كا² .</p> <p>B- الإشارة.</p> <p>C- ويلكوكسون.</p> <p>D- مان ويتني.</p>	Test Statistics			SAMPLES	Mann-Whitney U	44.000	Wilcoxon W	99.000	Z	-.457	Asymp .Sig . (2-tailed)	.648	Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.684	178											
Test Statistics																											
	SAMPLES																										
Mann-Whitney U	44.000																										
Wilcoxon W	99.000																										
Z	-.457																										
Asymp .Sig . (2-tailed)	.648																										
Exact Sig .[2*(1-tailed Sig.)]	.684																										
	<p>- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-</p> <p>A- قبول الفرض البديل .</p> <p>B- قبول الفرض العدمي</p> <p>C- رفض كل من الفرضين.</p> <p>D- قبول كل من الفرضين.</p>	179																									

قام أحد الباحثين بمقارنة عينة من مرتبات موظفي القطاع الحكومي من مدينة الرياض بأخرى من مدينة جدة وذلك بصدد الوقوف على ما إذا كان هناك إختلاف في متوسط المرتبات وذلك عند مستوى معنوية 5%، وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS حصلنا على النتائج التالية :-

Test Statistics	
	SAMPLES
Mann-Whitney U	55.000
Wilcoxon W	95.000
Z	-.037
Asymp .Sig. (2-tailed)	.028
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.034

- الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متوسطي مجتمعين في هذه الحالة :-
A- كا 2

- B- مان ويتني
C- كولموجروف سميرونوف
D- لا شيء مما سبق

180

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن

- A- قبول الفرض البديل
B- قبول الفرض العدمي
C- عدم قبول اي من الفرضين
D- لا شيء مما سبق

181

إذا علمت انه: " قام احد المراكز البحثية باختبار متوسط الإنفاق في كلا من مدينة الرياض والإحساء وذلك بصدد الوقوف على ما إذا كان هناك إختلاف في متوسط الإنفاق في مدن المملكة العربية السعودية ، ومن ثم قامت بسحب عينة من المدينتين ومن خلال إدخال البيانات وباستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وعند مستوى معنوية 5% ، تم الحصول على النتائج التالية :-

Test Statistics	
	SAMPLES
Mann-Whitney U	38.000
Z	-.863
Asymp . Sig. (2-tailed)	.042
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.046

-الاختبار المستخدم لدراسة الفرق بين متوسطي مجتمعين في هذه الحالة :-
A- كا 2 .

- B- مان ويتني.
C- ويلكوكسون.
D- الإشارة.

182

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-

- A- قبول الفرض البديل .
B- قبول الفرض العدمي
C- رفض كل من الفرضين.
D- قبول كل من الفرضين.

183

قام أحد الباحثين باستخدام إخبار كروسكال- والس للتعرف على مدى وجود فروق معنوية بين ثلاث أنواع من الجينات الوراثية المستخدمة في تلقيح نباتات الزينة ، وذلك عند مستوى معنوية 5%، وتم الحصول على النتائج التالية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS:-

Test Statistics	
	SAMPLES
Ci-Square	1.327
df	2
Asymp . Sig .	.291

-من الجدول السابق يمكن :-

- A- قبول الفرض البديل القائل بمعنوية الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية.
B- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية غير معنوية
C- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية معنوية
D- قبول الفرض البديل القائل بعدم معنوية الفروق بين الأنواع الثلاثة للجينات الوراثية.

184

- إذا علمت أن أحد المراكز البحثية التي تعمل في مجال تصنيف الشركات المالية قد قامت بإجراء بحث مقارن لأربع أنواع من الشركات:الأولى شركات الأغذية المحفوظة والثانية شركات العطور والثالثة شركات تصنيع لعب الأطفال والرابعة شركات مياه غازية ، وذلك للوقوف على مدى وجود اختلافات بين ربحية الأنواع الأربعة من الشركات باستخدام اختبار كروسكال - والس، عند مستوى معنوية 5% ، وتم الحصول على النتائج التالية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS :

Test Statistics	
	SAMPLES
Ci-Square	12.064
Df	3
Asymp-sig	.016

من الجدول السابق يمكن:

- A- قبول الفرض البديل القائل بمعنوية الفروق بين الشركات الأربعة
B- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الشركات الأربعة غير معنوية
C- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الشركات الأربعة معنوية
D- قبول الفرض البديل القائل بعدم معنوية الفروق بين الشركات الأربعة

185

- قام أحد الباحثين بدراسة درجات مجموعة من الطلاب في مادة التحليل الإحصائي في ثلاث جامعات هي: جامعة الملك فيصل - جامعة الدمام - جامعة الملك سعود ، وذلك لدراسة مدى وجود اختلاف بين مستوى الطلاب في الجامعات الثلاثة السابقة باستخدام اختبار كروسكال- والس، وذلك عند مستوى معنوية 5%، تم الحصول على النتائج التالية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS

Test Statistics	
	SAMPLES
Ci-Square	.706
df	2
Asymp . Sig	.025

من الجدول السابق يمكن :-

- A- قبول الفرض البديل القائل بمعنوية الفروق بين الجامعات الثلاثة .**
B- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الجامعات الثلاثة غير معنوية .
C- قبول الفرض العدمي القائل بأن الفروق بين الجامعات الثلاثة معنوية .
D- لا شيء مما سبق .

186

الجدول التالي يوضح نتيجة اختبار مربع كاي (كا²) عند مستوى معنوية 5%

	Value	df	Asymp.Sig (2-sided)
Person Chi-Square	2.437	4	.656
Likelihood Ratio	2.459	4	.652
Linear-by-Linear Association	.298	1	.585
N of Valid Cases	72		

قيمة إحصائي الاختبار كا² تساوي :-

A- 2.437

B- 2.459

C- 0.289

D- لا شيء مما سبق

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن

- A- قبول الفرض البديل**
B- قبول الفرض العدمي
C- عدم قبول أي من الفرضين
D- لا شيء مما سبق

187

الجدول التالي يوضح نتيجة اختبار مربع كاي (كا²) عند مستوى معنوية 5% :-

	Value	df	Asymp.Sig (2-sided)
Person Chi-Square	0.06793	4	.0967
Likelihood Ratio	0.05872	4	.0987
Linear-by-Linear Association	.02873	1	.0649
N of Valid Cases	99		

اجب عن الأسئلة التالية من خلال النتائج الواردة في الجدول السابق :-

- قيمة إحصائي الاختبار كا² تساوي :-

A- 0.0649

B- 0.02873

C- 0.0967

D- 0.06793

-من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-

- A- قبول الفرض البديل .**
B- قبول الفرض العدمي
C- رفض كل من الفرضين.
D- قبول كل من الفرضين.

189

الجدول التالي يوضح نتيجة اختبار مربع كاي (كا²) عند مستوى معنوية 5% :-

	Value	df	Asymp.Sig (2-sided)
Person Chi-Square	1.9496	3	.0437
Likelihood Ratio	1.9672	3	.0434
Linear-by-Linear Association	.2384	1	.0390
N of Valid Cases	32		

-قيمة إحصائي الاختبار كا²تساوي:-

A- .2384

B- 1.9672

C- 1.9496

D- لا شيء مما سبق

-من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :-

- A- قبول الفرض البديل**
B- قبول الفرض العدمي
C- عدم قبول أي من الفرضين
D- لا شيء مما سبق

191

192

-في دراسة لقياس تأثير أحد الأمصال على عدد دقات القلب قامت أحد شركات الأدوية باختبار عينة عشوائية من المرضى تتكون من 50 مريض، وقامت بقياس عدد دقات القلب قبل الحصول على جرعة الدواء ، ثم حصل مفردات العينة على جرعة الدواء المقترح ، وتم إخبار عدد دقات القلب بعد الحصول على الجرعة العلاجية والاختبار هل هناك ، اختلاف معنوي في مستوى دقات اعتماد على اختبار SPSS القلب قبل تلقي العلاج وبعده ، عند مستوى معنوية 5%، استخدمت الشركة البرنامج الإحصائي وحصلنا على النتائج التالية: Wilcoxon ويلكوكسون

Ranks				
		N	Mean Rank	Mean Rank Sum of Ranks
AFTER-BEFORE	Negative Ranks	49	89	4540.50
	Positive Ranks	1	75	75
	Ties	0		
	Total	8		

من الجداول السابقة يمكن توضيح أن :

- A- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية أكبر من المتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية
B- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية أقل من المتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية
C- متوسط دقات القلب قبل الحصول على الجرعة الدوائية مساوي للمتوسط بعد الحصول على الجرعة الدوائية
D- لا شيء مما سبق.

193

" لدراسة تأثير أحد البرامج التدريبية على مجموعة من الطلاب تم اختبار مجموعة من الطلاب قبل البرنامج التدريبي على عينة من 8 طلاب و اختبار الطلاب بعد الحصول على البرنامج التدريبي ولاختبار هل هناك اختلاف معنوي في مستوى تحصيل الطلاب ، عند مستوى معنوية 5% ، استخدم الباحث البرنامج الإحصائي spss باستخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon و حصلنا على النتائج التالية:

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
AFTER-BEFORE	Negative Ranks	7	2.36	43.50
	Positive Ranks	1	3.54	3.54
	Ties	0		
	Total	8		

Test Statistics

AFTER-BEFORE	
Z	-.313
Asymp. Sig. (2-tailed)	.421

من الجداول السابقة يمكن توضيح أن: -

- A- مستوى الطلاب قبل الحصول على البرنامج التدريبي أفضل من المستوى بعد الحصول على البرنامج.
B- مستوى الطلاب بعد الحصول على البرنامج التدريبي أفضل من المستوى قبل الحصول على البرنامج.
C- مستوى الطلاب قبل الحصول على البرنامج التدريبي مساوي لمستوى بعد الحصول على البرنامج.
D- لا شيء مما سبق.

194

لدراسة تأثير ممارسة الرياضة على إنقاص الوزن تم دراسة الوزن قبل ممارسة الرياضة على عينة من 8 اشخاص والوزن بعد ممارسة الرياضة ولاختبار هل هناك إختلاف معنوي في الوزن بسبب ممارسة الرياضة ، عند مستوى معنوية 5%، استخدم الباحث البرنامج الإحصائي SPSS باستخدام اختبار ويلكوكسون Wilcoxon و حصلنا على النتائج التالية :-

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
AFTER-BEFORE	Negative Ranks	7	4.93	34.50
	Positive Ranks	1	1.50	1.50
	Ties	0		
	Total	8		

Test Statistics

AFTER-BEFORE	
Z	-2.313
Asymp. Sig. (2-tailed)	.021

- من الجداول السابقة يمكن توضيح أن :-

- A- متوسط الوزن قبل ممارسة الرياضة أكبر من متوسط الوزن بعد ممارسة الرياضة
B- متوسط الوزن قبل ممارسة الرياضة أقل من متوسط الوزن بعد ممارسة الرياضة
C- متوسط الوزن قبل ممارسة الرياضة تساوي مع متوسط الوزن بعد ممارسة الرياضة
D- لا شيء مما سبق

195

- من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن

- A- قبول الفرض البديل .
B- قبول الفرض العدمي .
C- عدم قبول أي من الفرضين .
D- لا شيء مما سبق .

196

	<p>قام أحد الباحثين بإجراء تجربة لبيان تأثير أحد وسائل التعليمية الحديثة والمتمثلة في الصورة الإلكترونية على الطلاب وقد قام باختبار عينة عشوائية من الطلاب تتكون من 100 طالب وقام باختبار الطلاب قبل التدريس بالأسلوب الحديث ، ثم حصل الطلاب على مجموعة من المحاضرات باستخدام السبورة الإلكترونية وتم اختبار الطلاب بعد الحصول المحاضرات مره أخرى ، واختبار هل هناك اختلاف معنوي في مستوى التحصيل لدى الطلاب قبل تلقي المحاضرات بالأسلوب الحديث وبعده ، عند مستوى معنوية 5% ، استخدم الباحث البرنامج الإحصائي SPSS اعتماد على اختبار ويلوكسون Wilcoxon وحصلنا على النتائج التالية :</p> <table border="1" data-bbox="555 280 1279 414"> <thead> <tr> <th></th> <th>N</th> <th>Mean Rank</th> <th>Sum of Ranks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFTER-BEFORE</td> <td>99</td> <td>69</td> <td>5492</td> </tr> <tr> <td>Negative Ranks</td> <td>1</td> <td>82</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Positive Ranks</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ties</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Ranks -Test Statistics</p> <table border="1" data-bbox="555 443 1279 526"> <thead> <tr> <th colspan="2">SAMPLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z</td> <td>.013</td> </tr> <tr> <td>Asymp.Sig.(2.tailed)</td> <td>.0891</td> </tr> </tbody> </table> <p>من الجداول السابقة يمكن توضيح أن :</p> <p>A- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث أكبر من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات</p> <p>B- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث أقل من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات</p> <p>C- متوسط درجات الطلاب قبل الحصول على المحاضرات بالأسلوب الحديث مساوي من المتوسط بعد الحصول على المحاضرات</p> <p>D- لا شيء مما سبق</p>		N	Mean Rank	Sum of Ranks	AFTER-BEFORE	99	69	5492	Negative Ranks	1	82	94	Positive Ranks	0			Ties	0			Total	100			SAMPLES		Z	.013	Asymp.Sig.(2.tailed)	.0891	197
	N	Mean Rank	Sum of Ranks																													
AFTER-BEFORE	99	69	5492																													
Negative Ranks	1	82	94																													
Positive Ranks	0																															
Ties	0																															
Total	100																															
SAMPLES																																
Z	.013																															
Asymp.Sig.(2.tailed)	.0891																															
	<p>من خلال مقارنة قيمة إحصائي الاختبار بقيمة حدود منطقتي القبول والرفض يمكن :</p> <p>A- قبول الفرض البديل</p> <p>B- قبول الفرض العدمي</p> <p>C- عدم قبول أي من الفرضين</p> <p>D- قبول كل من الفرضين</p>	198																														

تم بتوفيق من الله .. ❁❁ والتمس منكم العذر والسموحة إن كان هناك خطأ.. ❁❁ بالتوفيق والتيسير للجميع ٨٨

الحمد لله عدد ما أحصى كتابه **Bsoomh** الحمد لله ملء ما أحصى كتابه
الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء