

(١) يمكن تحسين تواصل الأطفال متعدد الإعاقات من خلال ..

- (أ) كثرة القراءة الجهرية
- (ب) أساليب التواصل البديل والمساند
- (ج) التواصل البصري وتعبيرات الوجه
- (د) قراءة الشفاه.

(٢) من نتائج الإعاقات المتعددة على المستوى العقلي للفرد ..

- (أ) صعوبات التفاعل الاجتماعي مع الآخرين
- (ب) صعوبات في عملية التواصل مع الذات والأسرة
- (ج) صعوبات في الإدراك والتمييز والحفظ والتذكر
- (د) صعوبات في التوافق مع الذات والآخرين النفسي والاجتماعي

(٣) من الحاجات الفطرية البيولوجية التي تستثار عند الخمول..

- (أ) الحاجة إلى النوم
- (ب) الحاجة إلى الطعام
- (ج) الحاجة إلى الشراب
- (د) الحاجة إلى الراحة

(٤) إعطاء الطفل حرية من التصرف والاعتماد على الذات..

- (أ) حماية زائدة من مقدمي الرعاية
- (ب) اعتمادية على الآخرين
- (ج) استقلالية واعتماد على النفس في التصرف المناسب
- (د) تعزيز مادي من الوالدين

(٥) شعور الطفل بالأمن النفسي يحقق له التوافق ..

- (أ) البيولوجي
- (ب) النفسي الاجتماعي
- (ج) الدراسي
- (د) المهني في المستقبل

(٦) توافر قدر من حب وحنان الوالدين للطفل يجعله..

- (أ) منبود من الآخرين
- (ب) منعزل وانطوائي على النفس
- (ج) على درجة عالية من التقبل الاجتماعي
- (د) فوضوي وعدواني

(٧) حب الاستطلاع لدى الطفل دليل على تحسن نموه ..

- (أ) الجسمي
- (ب) العقلي المعرفي
- (ج) الانفعالي
- (د) الاجتماعي



wondershare™

PDF Editor

(٨) تحدث هشاشة العظام لدى بعض الأطفال ..

- (أ) بسبب عوامل وراثية ✓
- (ب) بسبب كثرة التعرض للحوادث
- (ج) بسبب التلوث الغذائي
- (د) بسبب عوامل لم يكشف عنها العلم

(٩) من حاجات النمو الاجتماعي للأطفال متعدد الإعاقة..

- (أ) الحاجة إلى الانتماء إلى جماعة
- (ب) الحاجة الرعائية الصحية
- (ج) الحاجة إلى الحرية والاستقلال السلوكي ✓
- (د) الحاجة إلى الاستطلاع والاستكشاف

(١٠) الشلل الدماغي اضطراب حركى يرتبط بـ ...

- (أ) المخيخ في مؤخرة الرأس
- (ب) الدماغ ✓
- (ج) النخاع الشوكي في الظهر
- (د) الفص الجبهي من الجهاز العصبي المركزي

(١١) أي مما يلى يعتبر من الإعاقات المتعددة..

- (أ) الصمم وكف البصر. ✓
- (ب) أمراض القلب وضغط الدم
- (ج) فرط النشاط وأضطراب الانتباه
- (د) الصمم والبكم.

(١٢) من الأفضل تسكين الأطفال ذوى الإعاقات المتعددة فى برامج..

- (أ) الدمج الأكاديمي والاجتماعي .
- (ب) الفصول الملحقة.
- (ج) مراكز خاصة ✓
- (د) العزل داخل المنازل

(١٣) تعتبر الإعاقات المتعددة من حيث نسب الانتشار ..

- (أ) أكثر من الإعاقة العقلية.
- (ب) أكثر من الإعاقة البصرية.
- (ج) أكثر من حالات التوحد.
- (د) أقل إعاقات انتشارا. ✓

(١٤) يصنف الطفل ذو الإعاقة العقلية المتوسطة ضمن..

- (أ) ذوى صعوبات التعلم الأكademie
- (ب) ذوى الإعاقات المتعددة.
- (ج) ذوى الإعاقات الحسية.
- (د) ذوى الإعاقة العقلية. ✓

(١٥) عند تشخيص حالة طفل ذو إعاقة متعددة نعتمد على ..

- (أ) رأى التشخيص الطبي فقط
- (ب) رأى فريق متعدد التخصصات
- (ج) رأى معلم التربية الخاصة
- (د) رأى الأخذائي النفسي. والاجتماعي

(١٦) من الخصائص المعرفية للأطفال متعددي الإعاقة..

- (أ) القدرة على حل المشكلات.
- (ب) سرعة حفظ التعليمات.
- (ج) سرعة الانتقال من مهارة إلى أخرى.
- (د) انخفاض واضح في العمليات المعرفية (الانتباه-الإدراك- التذكر).

(١٧) من الخصائص الأكademية للأطفال متعددي الإعاقة..

- (أ) العجز عن تعلم القراءة والكتابة.
- (ب) القدرة على إجراء العمليات الحسابية البسيطة
- (ج) هجاء الحروف وكتابتها
- (د) اجتياز الاختبارات التحصيلية.

(١٨) من الخصائص الجسمية للأطفال متعددي الإعاقة ..

- (أ) سرعة الحركة عند ممارسة الأنشطة
- (ب) صعف تناسق التأزرر الحركي البصري لكثرة التشو هات الجسمية
- (ج) لعب كرة القدم .
- (د) تشابه النمو الجسمى مع أقرانه من العاديين

(١٩) يعتبر التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال متعددي الإعاقة..

- (أ) غير موجود ومن العسير تعلمه
- (ب) مرتفع ويحدث بشكل تلقائي
- (ج) متوسط ويحدث بشكل مقبول
- (د) ضعيف. ويعتمد على مستوى التدريب والبرامج المقدمة لهم

(٢٠) تظهر اضطرابات الكلام واللغة لمتعددي الإعاقة في..

- (أ) مشكلات في النطق والكلام. مثل التشويه-الحذف- الإبدال- والإضافة
- (ب) استخدام لغة الإشارة الوصفية.
- (ج) استخدام الهجاء الإصبعي.
- (د) اللغة التعبيرية الانفعالية.



PDF Editor